

31536/B

C 89

472050
GUILIELMI HENRICI KRAMER.

SAXONIS DRESDENSIS,
PHILOSOPHIAE ET MEDICINAE DOCTORIS

ELENCHVS
VEGETABILIVM
ET
ANIMALIVM

PER
AVSTRIAM INFERIOREM
OBSERVATORVM.

SISTENS EA IN
CLASSES ET ORDINES
GENERA ET SPECIES
REDACTA.



VIENNÆ, PRAGÆ, ET TERGESTI,

Typis IOANNIS THOMÆ TRATTNER, Cæs. Reg.
Aulæ Typographj & Bibliopolæ, MDCCLVI.

29. 4



Omnia, quæ in usus hominum cedunt, ex Naturalibus hisce cuncta desumuntur; hinc *Oeconomia Mineralis* seu Metallurgia; *Vegetabilis* seu Agricultura, & Horticultura; *Animalis* seu Res pecuaria, Venatus, Piscatura. Verbo: Scientia Naturalis fundamentum est omnis œconomiae, opificiorum, commerciorum, diætæ, Medicinæ &c. Ex ea homines in statu sano conservantur, a morbo præservantur, & ab ægroto restituuntur, ita ut delectus Naturalium summe necessarius sit. Hinc necessitas Scientiæ Naturalis per se patet.

LINNÆVS

Observationes in regna tria
Naturæ §. 9.

ILLVSTRISSIMO

AC

CELEBERRIMO

VIRO

GERARDO

L. B. VAN SWIETEN

AVGVSTISS. IMPERATORIS

ET IMPERATRICIS

CONSILIARIO

ARCHIATRORVM COMITI

PVBLICÆ IMPERIALIS BIBLIOTHECÆ

PRÆFECTO

INCLYTÆ VIENNENSIS FACVLTATIS MEDICÆ

PRÆSIDI PERPETVO

ACADEMIARVM REG. SCIENT. ET CHIRVRG.

PARIS. PETROPOLITAN. ET NATVR. CV-

RIOS. INST. BONON. ET LITER. IN-

COGNIT. MEMBRO.

ILLVSTRISIME

ATQVE

CELEBERRIME VIR.

Tandem pauper Flora Austriaca MAGNI NOMINIS Tui indigna ex paludosis campis, tenebrosisque fylvis, ubi unacum Authore suo inter Pastores delituerat, in forum Academicum prodit TIBI, VIR ILLVSTRISIME AC CELEBERRIME, Elenchum Vegetabilium hunc pauca & inculta adhuc historiæ naturalis fragmenta continentem humillime interim præsentatura, ipsius Lapponicæ merito pedissequa; quoniam nec largiter effuso a principibus ære, nec societatis scientiarum cujusdam impensis thesauros suos orbi litterato ostentat,
verum

verum inopis medicinæ practici privata
industria undique collectos tantum ma-
nipulos offert, quæ fors neque hodie
lucem petere ausa fuisset, nisi Æsculapii
templum Viennæ restauratum, Dioscori-
demque in Austriam revocatum sciret.
Medio itinere Fauna Austriaca omnino
a fortuna derelicta, & omni librorum
suppellectile ruri inter colonos habitans
destituta passus associavit rustica hæc sua
muscula quæ repente compilare potuit
TIBI Historiæ Naturalis Zelosissime FAV-
TOR pariter sacrificatura. Quemadmo-
dum vero soli SAPIENTIÆ TVÆ ambæ
hæ natalia sua debent, dum, quod PRÆ-
SIDIS officium est, subdita Facultatis
membra ad imitationem, & studia stimu-
las, ita non longe mihi conquirenda sunt
argumenta, quibus demonstrem, quare
Tvo

TVO IMMORTALI NOMINI præsentem
Elenchum inscribere exoptaverim. Sus-
cipe precor , primum hunc progem-
mantis ingenii mei fructum , hoc grati-
tudinis meæ exiguum monumentum : ful-
goremque, quo opusculum hoc alias ca-
reret, SPLENDIDISSIMO NOMINE TVO
accerferi clementer concede ; Et cum nil
magis fotu indigeat quam teneræ plan-
tæ , & neonata animalcula, Floræ, Fau-
næque meæ embryones & primordia a
frigido adversariorum Aquilone benigne
protegere , gratia TVA fovere , mihi que
favere non dedignare.

Devotissimus Cliens,

Guilielmus Henricus Kramer.

LECTORI

S.

AUTHOR.

Juvenis & inops Medicinæ Practicus ; parvulæ Leytæpontanæ urbis nec necessaria ad rerum naturalium scrutatricem vitam prolongandam subministrantis physicus ; naturalium numero terrefactus historiæ naturalis devotissimus quidem cultor ; ast extra omne commercium litterarium positus, nec sufficienti librorum suppellectile instructus tyro **MAGNIS** ex Scientia **VIRIS** humillime supplicat commissos & citra intentionem forsan perpetratos errores condonent, sibi similes rogat, ut si quæ correctu digna observaverint in emolumentum scientiæ clementer communicent. Zoilis sibi que pacem exoptans, fatetur : illi quidem relatum fuisse unum alterumve botanicorum conscribendis Austriæ plantis studere, sed primo tunc dum opusculum hoc fere finiverat, quare inchoatum jamjam laborem nihilominus ad finem perducere, elenchumque hunc typis mandare vel ideo libuit, quia rei Botanicæ expertis patet eo certius


tius omnes Austriæ plantas detegi, & innotescere, quo plures iisdem colligendis operam navarent excursus suos botanicos ad diversos Austriæ montes, diversamque planitiei partem extendentes. Methodum Linnæanam omnium hactenus editarum minime imperfectam elegit, quia hæc ad methodum naturalem proxime accedens genera affinitatem quandam inter se habentia omnium minime disjungit, quod patet dum *Sorbum alpinam* J. Bauhini. *Sorbum torminalem* Camerarii. *Oxyacantham* Dodonæi. *Aucupariam* Rivini. *Sorbum legitimam*. Clusii *Mespilum*. Dodonæi. *Uvam Ursi*. Dalechampii *Diospyrum* J. Bauhini. *Chamæmespilum* Cordi. *Cotoneastrum* Gefneri. *Pyrum* C. Bauhinii. *Malum* Dodonæi. *Cotoneam* Lobelii, & alibi (cætera ut taceam) *Adonidis*, *Ranunculi*, *Trollii*, *Isopyri*, *Hellebori*, *Calthæ* genera aspectu pulcherrime uno quasi filo connexa exhibet. Plantas Austriacas cum enumeraret, animalium nonnulla addidit, quæ sola recensere tam ob exiguum eorum numerum, quam semilitteratorum largas exprobrationes haud præsumfisset, illa tamen aromaticis, fragrantibusque herbis condita horum palato gratiora fore speravit; cum eo commune ac barbarum eorum odium in Zoologiam

giam sæviat, ut dum mineralium ex infimis terræ visceribus erutorum species sani, atque incolumes sine Botanicæ adminiculo possidere non possunt, huic quidem Historiæ Naturalis parti inter scientias locum concedant, Zoologiam tamen ex numero illarum excludere non erubescant; Et si vel levis amoris scintilla superest contingit quatenus lautas mensas parat, fastumque ornat. Atque hæc Zoologiæ fors cultores ejus pariter opprimit, quibus tota die inutilitatem studii, levitatemque ingenii cachinnantes obtrudunt. An non sufficit eandem tot, tantisque difficultatibus premi? *Quippe sylvis (ut Linnæi verbis utar) se abscondunt Quadrupedia, avolant aves, abyssum petunt Pisces, latebras quærunt Serpentes, Insecta denique cursu, saltu, volatu sese subtrahunt nostris oculis; verbo: hominis adspectum refugit omne animal, nec lapidum instar & plantarum fixis hæret sedibus.* An calumniis adhuc impediendus est ejus progressus, & despiciatui habendi sunt illi, qui reditus & vitam in indagandis creatoris vivis operibus consumunt? Nam si Zoologiæ principum nonnulli fame (differente tamen a Mida fato) periire, quorum relictæ scriptotenus memoriæ undique nunc auro obvolvuntur, non studii culpa est; nec ideo insons

con-

condemnanda, quia non omnium adhuc animalium,
& præcipue insectorum usus satis constat. Quis
primo lapidi, quem superbus se centrum uni-
versi putans homo magni fecit, valorem inscrip-
sit? Unde primo evulsæ plantæ virtus innotuit?
An pulveris pyrii Germanis, Chinenfibusque no-
tus usus, Magnetisque olim ut magici effectus
repudiata cum antipode qualitas, omnibus sta-
tim patuit? Nonne successiva experientia robo-
rata antecessorum industria hæc patefecit? Sic
*fortasse seris nepotibus concedetur luce meridiana
clarioribus facibus & eos pervestigare Naturæ mæ-
andros, in quibus hodie tenebricosa caligine cir-
cumdati palpando viam inquirimus.* Linnæus præ-
fat. Faun. Suec. Ubi & utile honesto præpo-
nens, ac non nisi transactis pluribus lustris a tor-
rente Scholastico approbatis, etiam sine ratione
sufficiente illi numero, consentiens plebea, igno-
rantix fida soror, audacia eo perveniet, ut hæc
sibi commodissima agnoscat, quæ hucusque ele-
vato supercilio spernere præsumit.

PLAN-



PLANTARVM CLASSIS I.

MONANDRIA MONOGYNIA.

CANNA.

- I. **C**ANNA foliis ovatis utrinque acuminatis nervosis. *Lin.*
Sp. pl. 1. Fl. Zeyl. 1. Hort. Ups. 1.
Canna spatulis bifloris. Hort. Cliff. 1.
Canna Indica. Riv. monop. irr.
Cann - Acorus latifolius vulgaris. Tournef. inst. 367.
Canna Indica. Clus. hist. 2. p. 81.
Arundo Indica. Baub. pin. 19.
- β. *Canna foliis ovatis petiolatis nervosis, spatulis monofloris, corollis punctatis.*
Canna Indica flore luteo punctato. Riv. monop. irr.
Cann - Acorus flore luteo punctato. Tournef. inst. 367.
Boerhaav. Lugdb. 2. p. 127.

Hospitatur in hortis & ante fenestras curiosorum passim vero hodie colitur in Stolzendorff a rusticis ubi radices in fine autumnus eruunt, & in locis temperatis per hyemem custodiunt, vere autem iterum plantant, ut ejus semine corollas marianas componant. β. vero æstate in area meridionali, hyeme in frigidario arcis Leytæpontanæ Excellentissimi Comitum Ernesti ab Harrach ab indefesso & erudito hortulano suo Domino Mohr culta. An varietas, an diversa Species?

DIGYNIA.

BLITVM.

1. **BLITVM** capitellis spicatis terminalibus. *Hort. Ups.* 3.
 Blitum foliis triangularibus dentatis, calycibus baccatis,
 capitulis summis nudis. *Virid. Cliff.* 1.
 Blitum foliis triangularibus dentatis. *Hort. Cliff.* 28.
 Chenopodio - Morus major: *Boerhaav. Lugdb.* 2. p. 91.
 Morocarpos major. *Hall. Jen. Rupp.* 337.
 Atriplex, Mori fructu major, seu fragifera major. *Mor-*
ris. hist. 2. p. 606.
 Atriplex baccifera. *Raj. hist.* 197.
 Habitat in locis gramineis in medio horto olim Favoritæ Vi-
 densis, nunc Gymnasii Theresiani Viennæ; minus fre-
 quens, olim culta.

CLASSIS II.

DIANDRIA
MONOGYNIA.

JASMINVM.

1. **JASMINVM** foliis oppositis pinnatis. *Hort. Ups.* 5.
 Jasminum vulgatus flore albo. *Baub. pin.* 397.
 Jasminum. *Dodom. pempt.* 409.
 Hospitatur passim æstate in hortis, hyeme in frigidariis, præ-
 sertim Leytæponti in Arce Excellentissimi Comitis Erne-
 sti ab Harrach.
 2. **JASMINVM** foliis alternis ternatis pinnatisque, ramis an-
 gulatis. *Hort. Ups.* 5.
 Jasminum foliis alternis ternatis acuminatis. *Hort. Cliff.* 6.
 Jasminum humile luteum. *Baub. pin.* 397.
 Jasminum s. Gelsiminum luteum. *Baub. hist.* 2. p. 102.
 Hospitatur hyeme in frigidario, æstate in area horti S. P. de
 Schwarzenberg Viennæ, alibique in hortis nobilium, &
 curiosorum.
 3. **JASMINVM** foliis alternis ternatis simplicibusque, ramis an-
 gulatis. *Hort. Ups.* 5.

Jasminum luteum vulgo dictum bacciferum. *Bauh. pin.* 398.

Trifolium fruticans. *Dodon. pempt.* 571.

Hospitatur cum prioribus passim in hortis nobilium, & curiosorum.

L I G V S T R V M.

1. LIGVSTRUM. *Fl. Suec.* 4.

Ligustrum germanicum. *Bauh. pin.* 475.

Phillyrea. *Dodon. pempt.* 775.

Habitat ubique in sylvis, & nemoribus præsertim in Insulis Danubialibus, & Fischamentæ.

O L E A.

1. OLEA foliis lanceolatis. *Linn. Sp. pl.* 8.

Olea foliis lanceolatis, ramis teretiusculis. *Hort. Cliff.* 4.

Mat. med. 10. *Roy. Lugdb.* 398.

Olea Sativa. *Bauh. pin.* 472.

Hospitatur passim in hortis nobilium æstate in area, hyeme in frigidario præsertim Viennæ in horto S. P. de Schwarzenberg, & Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

S Y R I N G A.

1. SYRINGA foliis ovato cordatis. *Hort. Cliff.* 6. *Hort. Ups.* 6.

Syringa cærulea. *Bauh. pin.* 398.

Lilac. *Tournefort. inst.* 601.

β. *Lilac. flore albo.* *Tournef. inst.* 601.

γ. *Lilac. flore saturate purpureo.* *Vaill. Paris.* 116.

Hospitatur in omnibus fere hortis sub dio.

2. SYRINGA foliis lanceolatis. *Linn. Spec. pl.* 9.

Syringa foliis lanceolatis integris. *Hort. Cliff.* 6. *Hort. Ups.* 6:

Lilac ligustri folio. *Tournef. inst.* 602.

Hospitatur passim in hortis sub dio præsertim Viennæ in horto Videnſi Domini de Göz.

C I R C Æ A.

1. CIRCÆA caule erecto, racemis pluribus. *Linn. Sp. pl.* 9.

Circæa Fl. Suec. 5. *Hort. Cliff.* 7.

Circæa lutetiana. *Lob. icon.* 266. *Vaill. Paris.* 38. *Boerhaav. Lugdb.* 1. p. 78.

Circæa lutetiana Ger. *Lob. Lutetiana major* Park.
Raj. hist. 1. p. 401.

Solanifolia *Circæa dicta major*. *Baub. pin.* 168.

Ocymastrum verrucarium. *Baub. hist.* 2. p. 977.

Habitat copiosè in Tabor, pratoque Murobacensi.

VERONICA.

1. VERONICA spicis terminalibus, foliis oppositis lanceolatis ferratis acuminatis. *Linn. Sp. pl.* 10. *Hort. Ups.* 7.

Veronica spicata latifolia. *Baub. pin.* 246.

Veronica l. erectior latifolia. *Clus. hist.* 1. p. 346.

β. *Veronica spicata longifolia altera*. *Amnuth.* 26.

Habitat passim in Sylvis Montanis. β. supra Burckersdorff in
fine superiori rubeti non procul a via regia.

2. VERONICA spica terminali foliis oppositis crenatis obtusis, caule adscendente simplicissimo. *Linn. Sp. pl.* 10.

Veronica spicata minor. *Baub. pin.* 247.

Habitat supra lapidicinam Dornbacensem, copiosius vero auf
der Sürfenschanz, non procul a lapidicina Weinhausensi.

3. VERONICA spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis, caule procumbente. *Linn. Sp. pl.* 11. *Mat. med.* 11.

Veronica floribus spicatis, foliis oppositis, caule procumbente. *Fl. Suec.* 8.

Veronica mas supina & vulgatissima. *Baub. pin.* 246.

Habitat in sylvis circa Dornbach, Grinzing, Leytæpon-
tum, & in prati Murobacensis locis opacis ad fontem Sa-
maritanæ inter arbores.

4. VERONICA spicis lateralibus foliis oppositis pinnatifidis, caule suberecto.

Veronica Austriaca foliis tenuissime laciniatis. *Tournef. inst.* 144.

Chamædris Austriaca foliis tenuissime laciniatis. *Baub. pin.* 248. *Brodr.* 117.

Chamædris spuria tenuissime laciniata. *Baub. hist.* 3. p. 287.

Habitat in Vallo Suburbico Viennensi præsertim inter hortum
olim S. P. Eugenii, & Suburbium Viden sito minus frequens.

5. VERONICA racemis lateralibus foliis lanceolatis ferratis, caule erecto. *Fl. Suec.* 10.

Vero-

Veronica foliis oppositis lævibus crenatis floribus laxè spicatis ex alis. *Gron. Virg. 4.*

Anagallis aquatica major (minorque) folio subrotundo. *Baub. pin. 252.*

Beccabunga officinarum.

Habitat *supra* Weidling, circa Leytæpontum, & Burkersdorff ad rivulos.

6. VERONICA racemis lateralibus pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. *Fl. Suec. 9.*

Veronica foliis lineari-lanceolatis integris, racemis laxefloriferis. *Fl. Lapp. 9. Hort. Cliff. 10.*

Veronica aquatica angustifolia scutellata. *Baub. pin. 252.*

Habitat *supra* Burckersdorff ad inundatum pedem montis, in quo rubetum situm est alibique.

7. VERONICA racemis lateralibus foliis ovatis rugosis dentatis caule debili. *Linn. Sp. pl. 13.*

Veronica foliis oppositis plicatis dentatis scupis ex alis inferioribus laxè spicatis. *Hort. Cliff. 9.*

Veronica latifolia pratensis. *Riv. mon. irr.*

Chamædrys spuria minor rotundifolia. *Baub. pin. 249.*

Habitat *passim* in pratis & ad agrorum margines circa Dornbach, Murobacium, Neustift, & Leytæpontum.

8. VERONICA corymbo terminali, Scapo nudo. *Linn. Sp. pl. 11.*

Veronica alpina pumila caule aphylo. *Bocc. Mus. 2. p. 17. t. 1.*

Veronica parva Saxatilis cauliculi nudis. *Raj. hist. 846. Scheuchz. it. alp. 47.*

Chamædrys alpina minima hirsuta. *Baub. pin. 247.*

Teucrium minimum. *Clus. Hist. 350.*

Habitat in Monte s. Alpe Schneeberg, & in locis petrosis circa Medling & Baden.

9. VERONICA racemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris crenatis. *Linn. Sp. pl. 12.*

Veronica floribus solitariis subcorymbosis, foliis ovatis glabris crenatis. *Fl. Suec. 14.*

Veronica foliis inferioribus oppositis ovatis, superioribus alternis lanceolatis, floribus solitariis. *Hort. Cliff. 9. Gron. Virg. 4.*

Veronica pratensis serpillifolia. *Baub. pin. 247.*

Habitat ad rivum Weidlingensem.

10. VERONICA floribus solitariis, foliis cordatis incisissimis pedunculo brevioribus. *Linn. Sp. pl. 13. Fl. Suec. 17.*

Veronica foliis alternis cordatis crenatis, floribus solitariis. *Hort. Cliff.* 9.

Veronica foliis cordatis crenatis, floribus solitariis pedunculatis. *Roy. Lugdb.* 303.

Alfina chamædyfolia, flosculis pediculis oblongis insidentibus. *Bauh. pin.* 250.

Habitat in arvis & hortis circa Leytæpontum, & Döbling alibique.

II. *VERONICA* floribus solitariis, foliis cordatis planis quinque lobis. *Fl. Suec.* 18. *Sp. pl.* 13.

Veronica foliis alternis cordatis quinque lobis, floribus solitariis. *Hort. Cliff.* 9. *Roy. Lugdb.* 303.

Alfina hederulæ folio. *Bauh. pin.* 250.

Habitat in mæniis Viennensibus præsertim inter portam Carinthiacam, & Stubensem, sicut etiam in Vallo Suburbico Viennensi ad hortum olim S. P. Eugenii, & Nosocomium ad S. Marcum, alibique in ruderatis.

12. *VERONICA* floribus solitariis, foliis digitato-partitis pedunculo brevioribus. *Fl. Suec.* 19. *Linn. Sp. pl.* 14.

Veronica foliis alternis: inferioribus quinque partitis; superioribus tripartitis, floribus solitariis. *Hort. Cliff.* 9. *Roy. Lugdb.* 302.

Veronica triphyllos cærulea. *Bauh. pin.* 250.

Habitat in agris passim præsertim ante Döbling & circa Leytæpontum.

J V S T I T I A.

I. *JVSTITIA* arborea foliis lanceolato-ovatis, bracteis ovatis persistentibus, corollarum galea concava. *Fl. Zeyl.* 16. *Hort. Ups.* 7.

Justitia foliis ovato-lanceolatis, spicis foliosis, florum galea concava. *Hort. Cliff.* 9. *Roy. Lugdb.* 291.

Adhatoda Zeylanensium. *Herm. Lugdb.* 642. t. 643. *Tournef. inst.* 175.

Ecbolium. *Riv. mon. irr.*

Hospitatur in frigidario privati hortulani in Suburbio Leopoldino Viennæ.

G R A T I O L A.

I. *GRATIOLA* floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ferratis. *Linn. Sp. pl.* 17. *Mat. med.* 18.

Gratiola. Riv. mon. irr. Baub. hist. 3. p. 434. Hall. Jen. Rupp. 243. Dod. pempt. 362.

Gratiola centauroides. Baub. pin. 279. Vaill. Paris. 95.

Digitalis minima gratiola dicta. Moris. hist. 2. p. 479. Tournef. inst. 165.

Habitat ad Danubium in Tabor statim trans primum pontem, sicut etiam ad rivum pagi proximi Rodaun per quem ad sylvam Viennensem progreditur.

PINGVICULA.

I. PINGVICULA nectareo cylindraceo longitudine petali. Fl. Lapp. 11. Fl. Suec. 21.

Pinguicula Gesneri. Baub. hist. 3. p. 546. Tournef. inst. 167.

Habitat copiose in fruticeto paludoso sito inter viam regiam Badensem & Petersdorff, sicut etiam in prato uliginoso pagi Fischamentensis vulgo **die gemein Wiese**; nec non in Monte Schneeberg.

VERBENA.

I. VERBENA tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multi fido-laciniatis, caule solitario. Linn. Sp. pl. 20.

Verbena foliis multifido-laciniatis, spicis filiformibus. Hort. Cliff. 11. Fl. Suec. 26.

Verbena communis flore cæruleo. Baub. pin. 269.

Verbena recta. Dodon. pempt. 150.

Habitat passim ad mœnia, & ruderata, præcipue in mœniis & vallo Suburbico Viennæ, sicut etiam passim ad agrorum margines & vias publicas Leytæpontum inter & Rohrau.

LYCOPUS.

I. LYCOPUS foliis sinuato-ferratis. Linn. Sp. pl. 21.

Lycopus foliis indivisis. Fl. Suec. 27.

Lycopus. Hort. Cliff. 11.

Lycopus palustris glaber. Tournef. inst. 191.

Pseudo-Marrubium palustre. Riv. mon. irr.

Marrubium palustre glabrum. Baub. pin. 230.

Habitat ad rivulum statim supra Grinzing, ad fossam Leopoldinæ versus Tabor, circa Neopolim Aultriæ, & circa Lilienfeld in ripis humentibus.

ROSMARINVS.

- I. ROSMARINVS. *Hort. Cliff.* 14. *Hort. Ups.* 11.

Rosmarinus spontaneus latiore folio. *Baub.* pin. 217.

β Rosmarinus hortensis angustiore folio. *Baub.* pin. 217.

Hospitatur passim in omnibus hortis æstate in areis, hyeme in frigidariis, nec rusticis deest frigidario carentibus, qui eum per hyemen in cellariis conservant.

SALVIA.

- I. SALVIA foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis. *Hort. Cliff.* 12. *Hort. Ups.* 10.

Salvia major. *Baub.* pin. 237.

β Salvia minor aurita, & non aurita. *Baub.* pin. 237.

Hospitatur ubique in hortis sub dio.

2. SALVIA foliis cordato-lanceolatis acutis, bracteis coloratis flore brevioribus. *Linn. Sp. pl.* 24.

Horminum sylvestre salvifolium majus maculatum. *Baub.* pin. 239.

Horminum Sylvestre V. *Clus. hist.* 2. p. 31.

Horminum Sylvestre salvifolium minus. *Baub.* pin. 239.

Habitat copiose circa Viennam & Leytæpontum in agrorum & vinearum marginibus, in vallo Suburbico Viennensi, præsertim inter Hernals & Lichtenthal, circa Döbling, Grinzing, & Nussdorf, ad viam regiam Fischamentam inter & Elend, alibique passim.

3. SALVIA foliis cordato-oblongis crenatis: summis amplexi caulibus, verticillis sub nudis, corollis galea glutinosis. *Linn. Sp. pl.* 25.

Salvia foliis ovatis inciso-crenatis, verticillis subnudis.

Hort. Cliff. 12. *Fl. Suec.* 28. *Hort. Ups.* 10. *Roy. Lugdb.* 310.

Horminum pratense foliis serratis. *Baub.* pin. 238.

β Gallitrichum Sylvestre, flore majore albo. *Baub. hist.* 3. p. 312.

Habitat in pratis passim circa Leytæpontum, Döbling, Dornbach, & Hernals, alibique. β in pratis siccioribus, & pascis inter Rohrau & Leytæpontum. a. etiam in montibus Badensibus, retro Novemecclesias, & in valle Breina.

4. *SALVIA* foliis cordatis crenato-dentatis, verticillis subnudiis, Stylo corollarum labio inferiore incumben-
tibus. *Hort. Ups. 11. Sp. pl. 26.*
Salvia foliis cordato sagittatis dentatis. *Hort. Cliff. 495.*
Roy. Lugdb. 309.
Horminum Sylvestre latifolium verticillatum. Baub. pin. 238.
*Habitat in agrorum limitibus, & ad muros circa Leytæpon-
tum passim.*
5. *SALVIA* foliis cordato-sagittatis serratis acutis. *Linn. Sp. pl. 26. Hort. Cliff. 13. Hort. Ups. 11.*
Salvia montana maxima foliis hormini, flore flavescente. Tournef. inst. 180.
*Sclarea glutinosa floris lutei variegati barba ampla ca-
va. Boerhaav. Lugdb. 1. p. 164.*
Horminum luteum glutinosum. Baub. pin. 238.
Horminum flore luteo. Riv. mon. irr.
Orvala tertia. Dodon. pempt. 292.
*Galeopsis Species, lutea, viscida, odorata, nemoren-
sis. Baub. hist. 3. p. 314.*
*Habitat copiose circa Burckersdorff trans rivum ad primum
montem, ex quo primus rivalus effluit.*
6. *SALVIA* foliis rugosis oblongo-cordatis serratis, floribus
calyce longioribus concavis acuminatis. *Linn. Sp. pl. 27. Hort. Ups. 10.*
Horminum Sclarea dictum. Baub. pin. 238.
Horminum. Riv. mon. irr.
Horminum sativum vulgare s. Sclarea. Moris. hist. 3. p. 392.
Horminum Sylvestre primum Sclarea. Clus. hist. 2. p. 28.
Gallitrichum sativum. Baub. hist. 3. p. 309.
Orvala. Dodon. pempt. 292.
Hospitatur passim in hortis rhizotomarum.

DIGYNIA.

ANTHOXANTHVM.

- I. *ANTHOXANTHVM* Spica ovato-oblonga, flosculis subpe-
dunculatis arista longioribus. *Linn. Sp. pl. 26.*
*Anthoxanthum flosculis diandris. Hort. Cliff. 25. Roy.
Lugdb. 58.*
Anthoxanthum. Fl. Suec. 29.

Gramen pratense, Spica flavescente. *Bauh. pin. 3. Scheuchz. gram 88.*

Habitat in pratis Leytæpontanis, vulgo auf den Heide-
Wiesen.

CLASSIS III.

TRIANDRIA MONOGYNIA.

VALERIANA.

I. VALERIANA floribus triandris, dioicis, foliis pinnatis.
Linn. Sp. pl. 31.

Valeriana dioica. *Fl. Suec. 31.*

Valeriana foliis caulinis pinnatis sexu distincta. *Hort. Cliff. 16.*

Valeriana foliis caulinis pinnatis polygama. *Virid. Cliff. 5.*

Valeriana Sylvestris prima, & secunda. *Clus. hist. 2. p. 55.*

{ Valeriana palustris minor. *Bauh. pinn. 164.*

Mas { Valeriana minima. *Dodon. pempt. 350.*

{ Valeriana minor. *Riv. mon. irr.*

{ Valeriana Sylvestris f. Palustris altera. *Raj. Sp. 3. p. 200.*

Fæmi- { Valeriana aquatica minor, flore minore. *Raj. hist. 389.*

na. { Valeriana palustris inodora parū laciniata. *Bauh. pin. 86.*

{ Valeriana flore exiguo. *Riv. mon. irr.*

Habitat in Tabor, in prato Murobacensi, Döblingensi, in
Insulis Danubialibus Fischamentensibus, aliisque locis Syl-
vestribus, & gramineis uliginosis.

2. VALERIANA floribus triandris, foliis caulinis pinnatis,
radicalibus indivisis. *Hort. Ups. 13. Linn. Sp. pl. 32.*
Mat. med. 22.

Valeriana foliis infimis integris, proximis laciniatis,
caulinis pinnatis. *Hort. Cliff. 15. Roy. Lugdb. 234.*

Valeriana hortensis. *Bauh. pin. 164. Dodon. pempt. 349.*

Valeriana major, odorata radice. *Bauh. hist. 3. part. 2.*
p. 209

Hospitatur passim in hortis rhizotomarum sub dio.

3. VALERIANA floribus triandris, foliis omnibus pinnatis.
Mat. med. 21. Sp. pl. 31. Fl. Suec. 30.

Valeriana Sylvestris major. *Bauh. pin. 164. Fl. Lapp. 14.*
 Habitat in nemore ad hortum phasianorum & fluvium Leyta situm Leytæponti, alibique in nemoribus paludosis passim.

4. VALERIANA floribus triandris, foliis radicalibus cordatis; caulinis ternatis lanceolatis serratis. *Linn. Sp. pl. 32.*
 Valeriana floribus triandris, foliis radicalibus cordatis, aliis laciniatis. *Sauv. monsp. 276.*

Valeriana alpina prima. *Bauh. pin. 165. Prodr. 86. t. 86.*
 Habitat in Schneeberg, alpe Wexel, & in Sylva ante arcem Durrenstein.

5. VALERIANA floribus triandris, foliis subdentatis; radicalibus ovatis, pedunculis communibus elongatis. *Linn. Sp. pl. 33.*

Valeriana alpina nardo celticæ similis. *Bauh. pin. 165.*
 Valeriana Sylvestris alpina 2. Saxatilis. *Clus. hist. 2. p. 56.*
 Nardo Celticæ similis inodora. *Bauh. pin. 165. prodr. 88.*
 Habitat inter Monasterium Neuberg & Merzsteeg sicut & ad viam inde versus alpen Buchalpen distam.

6. Valeriana floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Linn. Sp. pl. 33. Fl. Suec. 32. Hort. Ups. 14.*

Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis integris, fructu simplici. *Hort. Cliff 16. Roy. Lugdb. 235.*
 Valeriana campestris inodora major. *Bauh. pin. 165.*
 Valerianella arvensis præcox humilis semine compresso, & arvensis serotina semine turgido. *Moris. Umb. 53.*
 Locusta. *Bauh. hist. 3. p. 323.*

Habitat in valle Döblingensi, ac passim in hortis & agris circa Leytæpontum.

C R O C V S.

I. CROCUS Spatha univalvi radicali, Corollæ tubo longissimo. *Linn. Sp. pl. 36.*

Crocus floribus fructui impositis: tubo longissimo. *Hort. Ups. 15.*

Crocus autumnalis sativus. *Moris. hist. 2. p. 335. S. 4. t. 2. f. 1.*

Crocus sativus. *Bauh. pin. 65.*
 Hospitatur in hortis passim, præsertim circa Perschling, & St. Hippolitum (St. Pölten) a rusticis cultus, sub dio.

GLADIOLVS.

1. GLADIOLVS foliis ensiformibus, floribus distantibus.

Linn. Sp. pl. 36.

Gladiolus foliis ensiformibus. *Hort. Cliff. 20. Hort. Ups. 16.*

Gladiolus floribus uno versu dispositis. *Bauh. pin. 41.*

Gladiolus. *Riv. monop. irr.*

Victorialis rotunda. *Officinarum.*

Habitat in prato ad sinistram inter Rosenaviam & vallem Breininam.

IRIS.

1. IRIS corollis barbatis, caule foliis longiore unifloro.

Hort. Cliff. 18.

Iris fusiana, flore maximo nigricante. *Bauh. pin. 31.*

Theatr. 579.

Hospitatur passim in hortis nobilium & curiosorum sub diopræsertim Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach a supra laudato hortulano suo Domino Mohr copiose culta.

2. IRIS corollis barbatis, caule foliis longiore multifloro.

Hort. Cliff. 18. Hort. Ups. 16.

Iris vulgaris Germanica S. Sylvestris. *Bauh. pin. 30.*

Iris hortensis latifolia. *Bauh. pin. 31.*

Habitat in Mœniis Viennensibus intra Civitatem in platea vulgo Sauwinckel, in Monte Leytaberg supra Mannersdorff, alibique in clivosis.

Hospitatur vero ubique in hortis sub dio.

3. IRIS corollis barbatis caule subfoliofo longitudine foliorum multifloro. *Linn. Sp. pl. 38. Roy. Lugdb. 17.*

Hort. Ups. 16.

Iris latifolia pannonica, colore multiplici. *Bauh. pin. 31.*

Habitat circa Mannersdorff & Sumerain ad Montem Leytaberg.

4. IRIS corollis barbatis, caule foliis brevioris unifloro.

Linn. Sp. pl. 38.

Iris corollis barbatis foliis caulem uniflorum superantibus. *Hort. Cliff. 19.*

Chamæiris minor flore purpureo. *Bauh. pin. 33.*

Habitat in collibus apricis Leytæponti ad Domum Venatoris sitis.

5. IRIS corollis imberbibus, petalis interioribus Stigmate minoribus, foliis ensiformibus. *Hort. Cliff.* 19. *Fl. Suec.* 33.

Iris palustris lutea seu Acorus adulterinus. *Baub. hist.* 2. p. 732.

Acorus adulterinus. *Baub. pin.* 34.

Habitat ad flumen Fischa in Insula Geimanniana, & in prato communis Fischamentæ, ad paludem horti phasianorum Rohravienſis, in uliginosis prati Murobacenſis, & in fossis Civitatis Thulnenſis.

6. IRIS corollis imberbibus, germinibus trigonis foliis linearibus. *Hort. Cliff.* 19. *Hort. Ups.* 17.

Iris pratensis angustifolia non fœtida altior. *Baub. pin.* 32. *Theatr.* 597.

Iris angustifolia 2. *Clus. hist.* 1. p. 229.

Habitat in pratis circa Himberg, & Ebersdorff.

7. IRIS corollis imberbibus, germinibus sex angularibus caule terete foliis sublinearibus. *Hort. Cliff.* 19. *Hort. Ups.* 17.

Iris pratensis angustifolia, folio fœtido. *Baub. pin.* 32.

Iris angustifolia 1. *Clus. hist.* 1. p. 228.

Habitat in pratis circa Mannersdorff, Oberwaltersdorff, Loreten, & Margarethen vulgo an Moofs.

8. IRIS corollis imberbibus germinibus sexangularibus caule ancipiti foliis linearibus. *Hort. Cliff.* 19. *Hort. Ups.* 17.

Iris angustifolia prunum redolens minor. *Baub. pin.* 33.

Iris angustifolia 6. *Clus. hist.* 1. p. 330.

Habitat in pratis ad radices montium sitis circa Medling, & Baden.

9. IRIS corollis imberbibus, foliis subulato canaliculatis caule brevioribus. *Hort. Ups.* 17.

Iris foliis margine conniventibus corollis imberbibus. *Hort. Cliff.* 20.

Iris bulbosa latifolia caule donata. *Baub. pin.* 38.

β. Iris bulbosa cæruleo-violacea. *Baub. pin.* 40.

Xiphion cæruleo-violaceum. *Tournef. inst.* 364.

Hospitatur hinc inde in hortis nobilium, & curiosorum Viennæ sub dio.

10. IRIS corollis imberbibus foliis subulato canaliculatis caule longioribus. *Linn. Sp. pl.* 40.

Xiphion persicum præcox flore variegato. *Tourn. inst.* 363.

Hospitatur ubi præcedens rarius tamen.

S C H O E N V S.

- I. SCHOENVS culmo tereti foliis margine dorsoque aculeatis.

Fl. Suec. 35.

Mariscus. Hall. Helo. 251.

Pseudo Cyperus palustris foliis & carina ferratis.

Scheuchz. gram. 375.

Cyperus longus inodorus Germanicus. Baub. pin. 14.

Theatr. 221.

Scirpus palustris altissimus foliis, & carina ferratis.

Tournef. inst. 528.

Habitat in paludibus latifonti, & Insularum Danubialium Fischamentæ.

C Y P E R V S.

- I. CYPERVS culmo triquetro nudo umbella trifida, pedunculis simplicibus, inæqualibus Spicis confertis linearibus. *Linn. Sp. pl. 46.*

Cyperus minimus panicula sparsa nigricante. Tournef. inst. 527. Scheuchz. gram. 384.

Cyperus minor pulcher, panicula compressa nigricante. Moris. hist. 3. p. 239. S. 8. t. 9. f. 38.

Gramen cyperoides minus panicula sparsa nigricante. Baub. pin. 6.

Gramen cyperoides minus panicula sparsa obsolete nigricante. Baub. Theatr. 88.

Gramen parvum pulchrum aliud, panicula compressa nigricante. Baub. hist. 2. p. 471.

Habitat in udis circa Buchbergam.

S C I R P V S.

- I. SCIRPVVS culmo tereti nudo, Spica subovata imbricata.

Fl. Suec. 41.

Scirpus equiseti capitulo majore. Tournef. inst. 528.

Scheuchz. gram. 360.

Juncus palustris capitulo equiseti major. Baub. pin. 12.

Juncus equiseti capitulis, scirpis triplo latioribus. Baub.

Theatr. 187.

Juncus capitulis longis, s. clavatus. Baub. hist. 2. p. 523.

Juncellus cyperoides, capitulo simplici. Læf. fl.

Pruss. 130.

Habitat in fossis hinc inde, & ad ripam piscinæ inter Laden-
dorff, & Rusbach sitæ.

2. SCIRPVs culmo tereti nudo, spicis ovatis pluribus, pe-
dunculatis terminalibus. *Fl. Suec.* 40.

Scirpus palustris altissimus. Tournes. inst. 528. *Scheuchz. gram.* 354.

Juncus maximus s. scirpus major. Baub. pin. 12.
Theatr. 178.

Juncus maximus, Holoschænos. Baub. hist. 2. p. 522.

Juncus palustris major. Tabern. icon. 249.

Juncus aquaticus maximus. Lobel. icon. 85.

Habitat in Stagnis Himbergensibus, sed copiosius in palude
Siebenbrunnensi trans danubium, alibique passim.

3. SCIRPVs culmo triquetro, panicula conglobata foliacea
spiculorum squamis trifidis: intermedia subulata,
Fl. Suec. 39.

Cyperus panicula sparsa. Tournes. inst. 527.

Cyprus rotundus inodorus germanicus. Baub. pin. 14.
Theatr. 215.

Cyprus aquaticus Septentrionalis. Lobel. icon. 77.

Habitat in Stagno Danubiali supra Rosaviam Viennæ, ali-
bique.

4. SCIRPVs culmo triquetro folioso, umbella foliacea, pe-
dunculis nudis supra-decompositis, spicis confer-
tis. *Fl. Suec.* 38.

Scirpo-Cyperus. Mich. gen. 48.

Cyperus gramineus. Baub. hist. 3. p. 504. *Scheuchz. gram.*
343.

Gramen cyperoides miliaceum. Baub. pin. 6. *Theatr.* 90.

*Gramen arundinaceum foliis acutissimis, panicula mul-
tiplici, cyperi facie. Læs. pruss. p.* 119. t. 33.

Habitat in Insula s. Sylvula Geimanniana olim nunc Haue-
riana Fischamentæ. Copiosis vero in fossis & ad rivulos in
Sylvis circa Latifontum.

ERIOPHORVM.

- I. ERIOPHORVM culmis teretibus, foliis planis spicatis pe-
dunculatis. *Linn. Sp. pl.* 52.

Eriophorum culmo folioso tereti, foliis planis. Fl.
Suec. 44.

Eriophorum Spicis pendulis. Fl. Lapp. 22. *Hort. Cliff.* 22.
Lina-

Linagrostis foliis planis, spicis multiplicibus. Hall. Helv. 250.

Linagrostis spica multiplici. Hall. Fl. Jen. Rupp. 325.

Linagrostis panicula ampliore. Tournef. inst. 664. Scheuchz. gram. 306. Monti prodr. 28.

Gramen pratense tomentosum panicula sparsa. Baub. pin. 4. Theatr. 60.

Gramen Eriophoron. Dodon. pempt. 562.

Gnaphalium Tragi sive Juncus bombycinus. Baub. hist. 2. p. 514.

Linum pratense. Tabern. icon. 250.

Gramen pratense Junceum, nutante, ampla, sparsa, & bombycina panicula. Barrel. icon. 12.

Habitat in prato uliginoso Döblingensi, & communis pargi Fischamentensis, Leytæpontanisque, in fruticeto sito inter viam regiam Badensem & Petersdorff, alibique in uliginosis, & udis passim.

D I G Y N I A.

S A C C H A R V M.

1. *SACCHARUM floribus paniculatis. Hort. Cliff. 26.*

Arundo Saccharifera. Baub. pin. 18.

Hospitatur in variis hortis nobilium, præsertim in Caldario S. P. de Schwarzenberg Viennæ.

Folio variegato olim in Favorita Videnfi a Domino Zinner colebatur.

P H A L A R I S.

1. *PHALARIS panicula subovata spiciformi, glumis carinatis.*

Linn. Sp. pl. 54. Hort. Ups. 19.

Phalaris radice annua. Hort. Cliff. 23.

Phalaris major semine albo. Baub. pin. 28.

Hospitatur passim in hortis sub dio ad usum pharmaceuticum, & pro nutrimento passerum Canariensium culta.

2. *PHALARIS panicula oblonga ventricosa. Linn. Sp. pl. 55.*

Arundo foliis planis, panicula spicata, spiculis confertis. Hort. Cliff. 26.

Gramen aquaticum paniculatum, phalaridis semine. Tournef. inst. 523.

Gramen

Gramen arundinaceum spicatum. *Baub. pinn. 6. theatr.*
94.

Gramen miliaceum aquaticum semine Phalaridis.
Monti prodr. 52.

Gramen arundinaceum acerosa gluma, nostras. *Park.*
theatr. 1273.

B. Gramen paniculatum, folio variegato. *Baub. pinn. 3.*
theatr. 37.

Gramen Striis pictum. *Baub. hist. 2. p. 476.*

Habitat passim in hortulis PP. Carthusianorum Murobacii
olim culta.

P A N I C U M.

1. PANICUM Spica composita, spiculis glomeratis fetis im-
mixtis, pedunculo hirsuto. *Linn. Sp. pl. 56.*

Panicum Spica composita, aristis flosculo brevioribus.
Hort. upf. 19.

Panicum Italicum 3. panicula majore. *Baub. pin. 27.*
theatr. 519.

Panicum vulgare. *Clus. hist. 2. p. 215.*

Hospitabatur olim passim in agris, nunc varius. Colitur ta-
men adhuc in horto phasianorum Excellentissimi Comitis
Ernesti ab Harrach Leytæponti.

2. PANICUM Panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pu-
bescentibus. *Hort. Cliff. 27. Hort. upf. 20.*

Milium semine luteo & albo. *Baub. pin. 26. theatr. 502.*

Hospitatur passim in agris semine quoque nigro varians præ-
sertim circa Leytæpontum.

P H L E V M.

1. PHLEVUM Spica cylindracea longissima. *Fl. lapp. 26. Fl.*
Suec. 50.

Gramen Typhoides maximum Spica longissima. *Baub.*
pin. 4. theatr. 49. Scheuchz. gram. 60.

Gramen cum cauda muris majoris, longa majus. *Baub.*
hist. 2. p. 472.

Habitat in pratis Leytæpontanis vulgo auf denen Heið-
wiesen.

A L O P E C V R V S.

1. ALOPECURUS Culmo spicato erecto. *Linn. Sp. pl. 60.*
Fl. Suec. 52.

Gramen phalaroides majus f. Italicum. *Bauh. pinn. 4. theatr. 15.*

Gramen alopecuro simile glabrum, cum pilis longiusculis in spica onocordon. *Bauh. hist. 2. p. 475.*

Habitat in pratis Hochaviensibus.

M I L I V M.

1. MILIVM Foliis dispersis. *Fl. Suec. 55.*

Milium glumis diphyllis. *Hort. Cliff. 27.*

Gramen sylvaticum panicula miliacea sparsa. *Bauh. pinn. 8. theatr. 140. Scheuchz. gram. 133.*

Habitat circa Döbling & Nusdorff, in sylvula ad hortum Leytæpontanum Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach sita passim; copiose vero in montosis sylvis latifontanis, & Mannersdorffensibus.

A G R O S T I S.

1. AGROSTIS Petalo exteriori exserente aristam rectam strictam longissimam. *Fl. Suec. 58.*

Gramen segetum altissimum, panicula sparsa C. B. *Scheuchz. gram. 144.*

Gramen capillatum. *Bauh. hist. 3. p. 462.*

Gramen capillatum, paniculis viridantibus & rubentibus. J. B. *Tournef. inst. 524.*

Habitat in agris siccioribus circa Leytæpontum minus frequens.

2. AGROSTIS Panicula mutica filiformi. *Linn. Sp. pl. 63.*

Gramen minimum paniculis elegantissimis. *Bauh. pin. 2. Scheuchz. gram. 40.*

Gramen minimum. *Bauh. hist. 2. p. 465. Dalech. hist. 425.*

Habitat ad viam regiam Nusdorffensem, & supra Nusdorff.

A I R A.

1. AIRA Panicula spicata, floribus muticis pedunculo longioribus, glumis acuminatis inæqualibus. *Linn. Sp. pl. 63.*

Gramen spica cristata subhirsutum. *Bauh. pin. 2. prodr. 8. Scheuchz. gram. 166.*

Habitat supra parvum Nusdorff ad Danubium in siccioribus.

2. AIRA

2. *AIRA* Foliis planis, panicula coarctata, floribus pedunculatis muticis convoluto subulatis. *Fl. Suec.* 71.
Poa spiculis subulatis, panicula rara contracta. *Fl. lapp.* 29.
Gramen arundinaceum enode minus sylvaticum. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 97. *Scheuchz. gram.* 209.
Gramen arundinaceum enode minus. *Bauh. hist.* 2. p. 481.
Gramen paniculatum autumnale, panicula angustiore ex viridi nigricante. *Tournef. inst.* 521.
Gramen pratense ferotinum panicula longa purpurascente. *Raj. hist.* 1288. *Syn.* 260.
Gramen loliaceum, panicula angustiore. *Monti prodr.* 37.
Habitat copiose in pascuis sylvaticis oppidi Fischamentensis versus Leytæpontum.

M E L I C A.

1. *MELICA* Petalis exterioribus ciliatis. *Fl. Suec.* 56.
Gramen avenaceum montanum lanuginosum. *Bauh. pinn.* 10.
Gramen avenaceum spica simplici, locustis densissimis candicantibus, & lanuginosis. *Scheuchz. gram.* 174.
Habitat in montosis circa Medling & thermas Badenses.

P O A.

1. *POA* Panicula diffusa, spiculis sex floris linearibus. *Fl. Suec.* 73.
Gramen palustre paniculatum altissimum. *Bauh. pin.* 2. *theatr.* 38. *Scheuchz. gram.* 191.
Habitat ad ripam fluvii Leyta dicti.
 2. *POA* Panicula diffusa angulis rectis, spiculis obturis, culmo obliquo, compresso. *Fl. Suec.* 75.
Gramen pratense paniculatum minus album. *Bauh. pinn.* 3. *theatr.* 3. *Bauh. hist.* 2. p. 465. *Scheuchz. gram.* 189.
 β. *Gramen* pratense paniculatum rubrum. *Bauh. pinn.* 3. *theatr.* 31. *Tournef. inst.* 522. *Scheuchz. gram.* 190.
Gramen loliaceum paniculatum minus, vulgatissimum, & paniculis rubentibus. *Monti prodr.* 38.

Gramen paniculatum elegans, panniculis ex spadiceo viridi, & argenteo variegatis. *Scheuchz. Agrost. prodr. 20. t. 3.*

Habitat passim circa Viennam, præsertim ad portam novam inter hortum olim S. P. Eugenii & montem Viennensem; in ambulacris horti Leytæpontani Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach; alibique passim.

B R I Z A.

1. BRIZA Spiculis triangulis, calyce flosculis (7) longiore. *Linn. Sp. pl. 70.*

Gramen tremulum minus, panicula parva. *Baub. pin. 2. prodr. 4. theatr. 25.*

Gramen tremulum minus. *Baub. hist. 2. p. 47.*

Gramen Phalaroides, f. tremulum minus locustis parvis, paniculis non expansis. *Monti prodr. 45.*

Habitat ad marginem prati Fischamentensis ad communitem pagi pertinentis.

2. BRIZA Spiculis ovatis, calyce flosculis (7) brevioribus. *Linn. Sp. pl. 70.*

Gramen tremulum majus. *Baub. pinn. 2. Scheuchz. gram. 204.*

Gramen Phalaroides f. tremulum minus lata sparsa panicula. *Barrel. 1219. icon. 16. Monti prodr. 45.*

β. Gramen tremulum majus panicula spadicea. *Baub. pinn. 2. theatr. 22.*

Gramen Phalaroides phœniceis locustis. *Monti prodr. 45.*

Habitat circa Döbling, Nussdorff, Fischamentam, Latofontum, & Leytæpontum, alibique.

D A C T Y L I S.

1. DACTYLIS Panicula secunda glomerata. *Linn. Sp. pl. 71.*

Cynosurus panicula secunda glomerata. *Fl. Suec. 83.*

Poa flosculis confertis uno versu dispositis. *Hort. Cliff. 28.*

Gramen spicatum folio aspero. *Baub. pin. 3. prodr. 2. theatr. 45. Scheuchz. gram. 299.*

Gramen asperum. *Baub. hist. 2. p. 467.*

Gramen paniculatum spicis crassioribus, & brevioribus. *Tournef. inst. 521.*

Habi-

Habitat *supra parvum Nusdorff ad Danubium, & in hortorum locis gramineis Leytæponti passim.*

CYNOSVRVS.

1. CYNOSVRVS Bracteis pinnatifidis. *Fl. Suec. 81.*
Gramen pratense cristatum, f. spica cristata lævi. *Baub. pinn. 3. prodr. 8. theatr. 42. Scheuchz. gram. 79.*
Gramen Typhinum, plantaginis spica, glumis digitatis, heteromallon majus. *Borell. icon. 172. I.*

Habitat in omnibus fere pratis Leytæponti alibique passim.

2. CYNOSVRVS Panicula subspicata, flosculis simplicibus biaristatis. *Linn. Sp. pl. 73.*
Panicum floribus conglomerato spicatis lævibus arista dimidio brevioribus. *Fl. Suec. 54.*
Panicum spiculis spicatis scabritie adhærentibus. *Hort. Cliff. 27.*
Panicum spica simplici & aspera. *Tournef. inst. 515. Monti prodr. 10.*
Gramen paniceum spica aspera. *Baub. pinn. 8. theatr. 139. Scheuchz. gram. 47.*

Habitat in hortis passim præsertim in Erdbeerenfibus & Leytæpontanis.

FESTVCA.

1. FESTVCA Spiculis viviparis. *Fl. Suec. 94.*
Poa spiculis ovato-angustis acutis vivipara. *Fl. lapp. 56.*
Gramen sparteum alpinum, panicula spadiceo viridi uno plerumque verru disposita. *Scheuchz. alp. 457. t. 20.*
Gramen paniculatum sparteum alpinum, panicula angusta spadiceo-viridi proliferum. *Scheuchz. gram. 213.*

Habitat in alpium austriacarum jugis fere omnibus, & fere unicum.

2. FESTVCA Panicula secunda spiculis erectis, calycis altera valvula integra, altera acuminata. *Linn. Sp. pl. 75.*
Festuca spicis erectis unum latus, palea altera calycina minima, altera acuminata. *Roy. lugdb. 68.*

Gramen paniculatum bromoides minus, paniculis aristatis unam partem spectantibus. *Raj. hist.* 1287.
Scheuchz. gram. 297.

Gramen loliaceum locustis expansis unam partem spectantibus. *Monti prodr.* 35.

Habitat in ambulacris graminibus obstitis horti Leytæpontani Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach, sicut & ad agrorum margines, & vias latifonti & Leytæponti alibi que.

3. **FESTUCA** Panicula erecta, spiculis subsessilibus teretibus muticis. *Fl. Suec.* 90.

Poa spiculis oblongis erectis. *Hort. Cliff.* 28.

Gramen aquaticum fluitans, multiplici spica. *Baub. pinn.* 3. *theatr.* 41. *Scheuchz. gram.* 199.

Habitat ad & intra stagnum danubiale extra Rossaviam sive Lichtenthal Viennæ, & in fossis ac paludibus circa Leytæpontum.

B R O M V S.

1. **BROMVS** Panicula patente, spiculis ovatis, aristis rectis. *Linn. Sp. pl.* 76. *Fl. Suec.* 84.

Festuca culmo paniculato, spicis compresso-ovatis. *Fl. lapp.* 28.

β. *Festuca* graminea gluminis hirsutis. *Baub. pinn.* 9. *theatr.* 143. *Scheuchz. gram.* 250.

Gramen avenaceum segetale majus, gluma turgidiore. *Moris. hist.* 3. S. 8. t. 7. f. 16.

Habitat passim in agris Secalinis Leytæpontum inter & Nischiterium sitis.

2. **BROMVS** Panicula patula, spicis ovatis, aristis divaricatis. *Linn. Sp. pl.* 76.

Festuca graminea glumis vacuis. *Scheuchz. gram.* 251.

Gramen avenaceum locustis amplioribus candicantibus glabris aristatis. *Tournef. inst.* 525.

Gramen Phalaroides acerosum nutante spica. *Barr. icon.* 24. f. 1.

Habitat passim supra vallum Suburbicum Viennæ.

3. **BROMVS** Panicula nutante spiculis ovato-oblongis. *Fl. Suec.* 85.

Bromus culmo paniculato, spicis compressis. *Fl. lapp.* 27.

Festu-

Festuca graminea juba effusa. Baub. pinn. 192.

Gramen avenaceum villosum, locustis amplioribus viridantibus margine argenteo cinctis. Scheuchz. gram. 253.

Ægilops major, caule & foliis arundinaceis, locustis glabrioribus, & angustioribus e fusco Xerampelinis. Dill. giff. 130. app. 60.

Habitat ad margines agrorum, & inter avenam Leytæponti extra portam Hamburgensem minus frequens.

4. *BROMVS Panicula nutante, spiculis linearibus. Fl. Suec. 36.*

Gramen avenaceum, locustis villosis angustis candidantibus, & aristatis. Tournef. inst. 526. Scheuchz. gram. 254.

Habitat in vallo Suburbico Viennensi retro hortum olim S. P. Eugenii, & ad viam regiam NUSDORFFENSEM.

STIPA.

I. *STIPA Aristis lanatis. Linn. Sp. pl. 78.*

Gramen spicatum aristis pennatis. Tournef. inst. 513. Scheuchz. gram. 153.

Gramen sparteum pennatum. Baub. pinn. 5. theatr. 70.

Spartum austriacum. Clus. hist. 2. p. 220.

Habitat copiosè in montibus Badensibus.

AVENA.

I. *AVENA Calycibus dispermis, seminibus lævibus. Hort. upf. 20.*

Avena alba. Baub. pinn. 23.

Hospitatur passim in agris.

2. *AVENA Panicula patente, calycibus trifloris, flosculis basi pilosis. Fl. Suec. 97.*

Avenæ seminibus hirsutis. Fl. lapp. 30.

Gramen avenaceum, utriculis lanugine flavescentibus. Tournef. inst. 525. Scheuchz. gram. 239.

Festuca utriculis lanugine flavescentibus Ægilops Dioscordis. Baub. pin. 10. theatr. 149.

Ægilops quibusdam aristis recurvis, five avena pilosa. Baub. hist. 2. p. 433.

Habitat in agris inter segetes, & in agrorum marginibus passim circa Leytæpontum, & Viennam.

A R V N D O.

1. ARVUNDO Calycibus trifloris, panicula diffusa. Linn. Sp. pl. 81.

Arundo Sativa. Virid. Cliff. 7. Hort. Cliff. 26.

Arundo sativa, quæ donax Dioscoridis. Baub. pinn. 17. theatr. 271.

Hospitatur Viennæ æstate in area, hyeme in frigidario horti Clarissimi professoris mei Schelenberger ad finem suburbii ad St. Mariam auxiliatricem dicti siti.

2. ARVUNDO calycibus quinque floris, panicula laxa. Linn. Sp. pl. 81.

Arundo panicula laxa, flosculis quirinis. Fl. Suec. 99.

Arundo vulgaris S. phragmites Dioscoridis. Baub. pinn. 17. Scheuchz. gram. 161.

Arundo vulgaris palustris. Baub. hist. 2. p. 485.

Habitat passim in insulis danubialibus, in stagno danubiali ad viam Nusdorffensem; in fossa civitatis Thulnensis & Leytæpontanæ, alibique in paludibus, & piscinis.

3. ARVUNDO Calycibus unifloris, culmo ramoso. Fl. lapp. 42. Fl. Suec. 100.

Gramen arundinaceum panicula molli spadicea, majus C. B. pinn. 7. theatr. 94. Scheuchz. gram. 122. t. 3. f. 5.

Gramen plumosum lobelii spica candida, & serici modo lucens. Baub. hist. 2. p. 476.

Gramen caninum, pratense paniculatum, glumis asparagi foliis similibus, mucronatis, sylvestre. Barr. 1207. icon. 364. Monti prodr. 58.

Habitat ad viam regiam Nusdorffensem circa paludem danubialem, & in omnibus fere insulis danubialibus.

L O L I V M.

1. LOLIVM Spica mutica. Linn. Sp. pl. 83.

Lolium spicis muticis radice perenni. Hort. Cliff. 24. Fl. Suec. 104.

Lolium spicis compressis, radice perenni. Fl. lapp. 32.

Gramen loliaceum, angustiore folio, & spica. Baub. pinn. 9. theatr. 127. Scheuchz. gram. 25. Monti prodr. 40.

Phœnix lolio similis. Baub. hist. 2. p. 436.

Phœnix sive lolium murinum. Dod. pempt. 540.

Habi-

Habitat *passim* ad agrorum & vinearum margines, in locis gramineis hortorum Viennensium & Leytæpontanorum fere omnibus, in vâllo Suburbico Viennensi; alibique in cultis.

2. *LOLIVM* spica aristata. *Linn. Spec. pl.* 83.

Lolium spicis aristatis, radice annua. *Hort. Cliff.* 23.
Fl. Suec. 103.

Lolium verum. *Moris. hist.* 3. p. 181.

Gramen Loliaceum spica longiore, s. *Lolium* Dioscoridis. *Baub. pin.* 9. *Theatr.* 121. *Scheuchz. gram.* 31.

Habitat in agris inter hordeum & secale *passim*, præsertim Leytæponti.

SECALE.

1. *SECALE* glumarum ciliis scabris. *Hort. Ups.* 22.

Secale hybernum, vel majus. *Baub. pinn.* 22. *Theatr.* 425.

Hospitatur *passim* in agris.

HORDEVM.

1. *HORDEV*M flosculis omnibus hermaphroditis aristatis; ordinibus duobus erectioribus. *Linn. Sp. pl.* 84.

Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis, feminibus cordicatis. *Hort. Ups.* 22.

Hordeum polystichon vernal. *Baub. pinn.* 22. *Theatr.* 439.

Hospitatur *passim* in agris Austriæ.

2. *HORDEV*M flosculis omnibus hermaphroditis, aristatis feminibus sexfariam æqualiter positis. *Hort. Ups.* 23.

Hospitatur *passim* in agris Trautmannsdorffii, & Leytæponti.

3. *HORDEV*M flosculis lateralibus masculis muticis, feminibus angularibus imbricatis. *Hort. Ups.* 23.

Hordeum distichon. *Baub. pin.* 22.

Hospitatur in agris, præcipue Leytæponti.

4. *HORDEV*M flosculis lateralibus masculis aristatis. *Fl. Suec.* 107.

Gramen hordeaceum minus, & vulgare. *Baub. pinn.* 9. *Theatr.* 134. *Scheuchz. gram.* 14.

Hordeum murinum. *Baub. hist.* 2. p. 431.

Hordeum Spontaneum, Spurium, *Holcus* Plinii *Anguill.* *Lob. icon.* 30.

Gramen secalinum, spicatum, vulgare. *Tournef. inst.* 517. *Monti prodr.* 60.

Habitat *passim ad muros, & mœnia Viennæ, & Leytæponti, ad viam regiam Nusdorffensem, alibique in ruderatis.*

TRITICVM.

1. *TRITICVM* glumis ventricosis lævibus, imbricatis submuticis. *Hort. Ups. 21.*

Triticum radice annua, spica mutica. *Hort. Cliff. 24.*

Triticum hybernium, aristis carens. *Baub. pin. 21.*

Hospitatur passim in agris Leytæpontanis.

2. *TRITICVM* glumis ventricosis, villosis, imbricatis, obtusis. *Hort. Ups. 21.*

Triticum, radice annua, glumis villosis. *Hort. Cliff. 24.*

Triticum spica villosa, quadrata, brevior, & turgidior. *Moris. hist. 3. p. 176. S. 8. t. 1. f. 14.*

Triticum aristatum, spica maxima cinericea, glumis hirsutis nostras. *Raj. hist. 1238.*

Hospitatur vulgariter in agris Austriacis.

3. *TRITICVM* calycibus subulatis trifloris, acuminatis. *Linn. Sp. pl. 86.*

Triticum radice repente, foliis viridibus. *Fl. Suec. 105.*

Gramen caninum arvense, f. *Gramen Dioscoridis*. *Baub. pin. 1. Scheuchz. gram. 5.*

Gramen caninum arvense, f. *primum Dioscoridis*, & officinarum. *Baub. Theatr. 7.*

Habitat passim in Vineis, Agris, Hortisque desertis.

4. *TRITICVM* calycibus subulatis quatrifloris aristatis. *Linn. Sp. pl. 86.*

Gramen caninum non repens elatius, spica aristata. *Moris. hist. 3. p. 177. S. 8. t. 1. f. 2.*

Gramen loliaceum radice repente, f. *Gramen officinarum* longioribus aristis donatum T. *Vaillant. Paris. 81. t. 17. f. 2.*

Graminis Spica triticea repentis vulgaris varietas cum spica aristata. *Scheuchz. gram. 9.*

Habitat ad Sepes, & in Dumeris præsertim Leytæponti.

TRIGYNIA.

HOLOSTEVM.

1. *HOLOSTEVM* floribus umbellatis. *Linn. Sp. pl. 88.*

Holosteum caryophyllæum arvense. *Tabern. icon. 233.*

Sper-

Spergula foliis oppositis, pedunculis umbellatis. Guett. Stamp. 298. Linn. Sp. pl. 88.

Arenaria, verna, fugax, glabra, bifolia. Hall. Jen. Rupp. 112.

Lychnis graminea, hirsuta umbellifera. Moris. hist. 2. p. 546. S. s. t. 22. f. 46.

Caryophyllus arvensis umbellatus, folio glabro. Baub. pin. 210.

Caryophyllus arvensis. Baub. hist. 3. p. 361.

Habitat passim in arvis, præcipue Döblingensibus, & retro hortum olim S. P. Eugenii Viennæ sitis, sicut etiam in vallo Suburbico, & Mœniis Viennensibus præsertim supra portam Stubensem adversus Monasterium ad St. Jacobum dictum.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA MONOGYNIA.

GLOBULARIA.

I. *GLOBULARIA* caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis, caulinis lanceolatis. *Fl. Suec. 109.*

Globularia caule folioso foliis ovatis integerrimis. Hort. Cliff. 490.

Bellis cærulea caule folioso. Baub. pin. 262.

Habitat in locis apricis montium supra lapidicinam Dornbacensem, in pratis siccioribus Sylvæ Dornbacensis, & Pezlsdorffensis, ad viam Minckendorffensem ultra Hochau, alibique.

2. *GLOBULARIA* caule subnudo foliis cuneiformibus tricuspidatis: intermedio minimo. *Linn. Sp. pl. 96.*

Globularia foliis radicalibus cuneiformibus retusis dentatis, denticulo intermedio minimo. Hort. Cliff. 491.

Scabiosa bellidis folio humilis, caule nudo, radice repente, folio cordato. Moris. hist. 3. p. 50. S. 6. t. 15. f. ult.

Bellis cærulea montana frutescens. Baub. pin. 262.

β. *Globularia alpina minima, origani folio. Tournef. inst. 467.*

Scabiosa bellidis folio, pyrenaria minima. *Moris. hist.*

3. p. 51.

Habitat in Monte Schneeberg, aliisque retro Neopolim Austriæ, & Scotto-Viennam sitis.

3. GLOBULARIA caule nudo, foliis integerrimis lanceolatis. *Linn. Sp. pl.* 97.

Globularia pyrenaica, folio oblongo, caule nudo. *Tournef. inst.* 467.

Scabiosa bellidis folio, humilis, caule nudo radice non repente. *Moris. hist.* 3. p. 50, *S. G. t.* 15. f. 4.

Bellis cærulea caule nudo. *Baub. pin.* 262. *Raj. hist.* 381.

Habitat in montibus Petersdorffensibus, Medlingensibus, & Badensibus.

DIPSACVS.

1. DIPSACVS foliis sessilibus ferratis. *Linn. Sp. pl.* 97.

Dipsacus foliis connato-perfoliatis. *Hort. Ups.* 25.

Dipsacus capitulis florum conicis. *Hort. Cliff.* 27.

Dipsacus Sylvestris, aut Virga Pastoris major. *Baub. pinn.* 385.

Dipsacus Sylvestris. *Dodon. pempt.* 735.

Habitat passim ad vias publicas, & in agrorum marginibus, præsertim circa Leytæpontum & Fischamentam.

2. DIPSACVS foliis connatis sinuatis. *Linn. Sp. pl.* 97.

Dipsacus folio laciniato. *Baub. pin.* 385. *Moris. hist.* 3. p. 158. *S. 7. t.* 36. f. 4.

Habitat circa Dornbach, & Murobacium.

3. DIPSACVS foliis petiolatis appendiculatis. *Hort. Ups.* 25.

Dipsacus capitulis florum subglobosis. *Hort. Cliff.* 30.

Dipsacus Sylvestris capitulo minore s. Virga Pastoris minor. *Baub. pin.* 385.

Dipsacus tertius. *Dodon. pempt.* 735.

Habitat in Insulis danubialibus passim præsertim in Tabor, & in Fischamentensi, ac Thulnensi majore.

SCABIOSA.

1. SCABIOSA corollulis quadrifidis æqualibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *Hort.*

Cliff. 30. *Fl. Suec.* 112.

Succisa glabra. *Baub. pin.* 269.

Succisa f. *morsus diaboli*. *Cam. epit.* 397.

β. *Succisa hirsuta*. *Baub. pin.* 269.

Habitat in pascuis humidiusculis circa Fischamentam, Enzersdorff, Döbling, Grinzing, & Leytæpontum.

2. *SCABIOSA* corollulis quadrifidis radiantibus, caule hispidō. *Fl. Suec.* 10.

Scabiosa major hirsuta. *Baub. pin.* 269.

Scabiosa arvensis *Tabern. hist.* 442.

Scabiosa major communior hirsuta, folio non laciniato. *Baub. hist.* 3. p. 2.

Habitat in arvis, & pratis passim.

3. *SCABIOSA* corollulis quinquefidis, foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis setaceis. *Fl. Suec.* III.

Scabiosa capitulo globoso major. *Baub. pin.* 270.

β. *Scabiosa capitulo globoso minor*. *Baub. pin.* 270.

Habitat in Insulis Danubialibus præsertim in Tabor, sicut etiam in montibus supra Nusdorff & Weidling ubi β. potissimum occurrit.

4. *SCABIOSA* corollulis quinquefidis, foliis dissectis, receptaculis florum subulatis. *Hort. Ups.* 26.

Scabiosa peregrina rubra, capite oblongo. *Baub. pin.* 270.

Scabiosa VI. *indica*. *Clus. hist.* 2. p. 3.

Hospitatur passim in hortis sub dio.

5. *SCABIOSA* corollulis quinquefidis radiantibus, foliis bipinnatis linearibus. *Linn. Sp. pl.* 101.

Scabiosa multifido folio, flore flavescente. *Baub. pin.* 270.

Scabiosa VII. *Clus. hist.* 2. p. 3.

Habitat ubique ad agrorum margines, & in pratis siccioribus, pascuisque.

A S P E R V L A.

1. *ASPERVLA* foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis. *Fl. Suec.* 114.

Asperula Sylvatica. *Hall. Jen. Rupp.* 6.

Asperula f. *Rubeola montana odorata*. *Baub. pin.* 334.

Asperula odorata flore albo. *Dodon. pempt.* 355.

Aparine latifolia humilior montana. *Tournef. inst.* 114.

Habitat passim in Sylvis præsertim Dornbacensibus, Grinzingensibus, & Leytæpontanis.

2. *ASPERVLA* foliis inferioribus senis, intermediis quaternis subulatis triquetris, floribus quadrifidis. *Linn. Sp. pl.* 104.

Ru-

Rubeola vulgaris quadrifolia lævis floribus albis. Tournef. inf. 130.

Rubia cynanchica. Baub. pin. 333. Baub. hist. 3. p. 723.

Habitat passim in agrorum marginibus, pratis, & pascuis aridis, præsertim circa Waring, Döbling, & Weinhaus.

G A L I U M.

1. *GALIVM* foliis quaternis obovatis inæqualibus, caulibus diffusis. *Fl. Suec. 119.*

Galium caulibus diffusis, foliis quaternis verticillatis. Fl. Lapp. 59.

Gallium palustre album. Baub. pin. 335.

Asperula quadrifolia palustris. Hall. Jen. Rupp. 6.

Cruciata palustris alba. Tournef. inst. 115.

Habitat in Insulis danubialibus, & præsertim copiose in Tabor ad textram.

2. *GALIVM* foliis octonis linearibus fulcatis, ramis floriferis brevibus. *Fl. Suec. 116.*

Galium caule erecto, foliis plurimis verticillatis linearibus. Fl. Lapp. 61.

Gallium luteum. Baub. pin. 335.

Habitat circa Dornbach, Hernals, Waring, & Leytæpontum, in M. Schneeberg, & passim alibi ad sepes vel in dumetis.

3. *GALIVM* foliis octonis ovatis linearibus subserratis patentissimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. *Linn. Sp. pl. 107.*

Galium foliis pluribus acutis, caule flaccido, ramis patentissimis. Fl. Suec. 117.

Gallium album latifolium sylvaticum. Hall. Jen. Rupp. 4.

Mollugo montana latifolia ramosa. Baub. pin. 334.

Rubia Sylvestris lævis. Baub. pin. 333.

Habitat in Tabor, circa Dornbach, & ad Sylvam Fischamentensem majorem.

4. *GALIVM* foliis verticillatis linearibus, pedunculis dichotomis summo caule floriferis. *Hort. Ups. 27.*

Gallium montanum altissimum, foliis angustis albicantibus. Hall. Fl. Jen. Rupp. 5.

Rubia montana angustifolia. Baub. pin. 333. Prodr. 145.

Habitat in locis gramineis ad viam regiam supra Nussdorff sitis, & ad agrorum margines, ac inter frutices circa Leytæpontum.

5. *GALIVM* foliis octonis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructu hispido. *Linn. Sp. pl.* 108.

Aparine foliis lanceolatis acuminatis scaberrimis, corollis fructu minoribus. *Fl. Suec.* 120.

Aparine vulgaris. *Baub. pin.* 334.

Aparine. *Dod. pempt.* 353.

Habitat passim ad sepes, senticeta, & in ruderatis, præsertim Vie næ in vallo Suburbico ad hortum olim S. P. Eugenii, in valle Döblingensi, & in muris vineas Leytæpontanæ cingentibus.

PLANTAGO.

1. *PLANTAGO* foliis ovatis glabris, nudo scapo tereti, spica flosculis imbricatis. *Linn. Sp. pl.* 112.

Plantago foliis ovatis glabris. *Hort. Cliff.* 43. *Fl. Suec.* 122.

Plantago scapo spicato, foliis ovatis. *Fl. Lapp.* 62.

Plantago latifolia sinuata. *Baub. pin.* 189.

Plantago major. *Cam. epitom.* 261.

β. *Plantago* latifolia glabra minor. *Baub. pin.* 189.

Habitat in pratis sylvaticis passim. β. ubique in agrorum marginibus, ad vias publicas & in pascuis siccioribus.

2. *PLANTAGO* foliis ovata lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, Scapo tereti. *Fl. Suec.* 123.

Plantago latifolia incana. *Baub. pin.* 189.

Plantago major incana. *Clus. hist.* 2. p. 109.

β. *Plantago* latifolia hirsuta minor. *Baub. pin.* 189.

Habitat passim in pascuis sterilibus apricis, & argillosis; hinc ad furnum lateritium Fischamentæ & ad vallum Suburbicum Viennensem circa furna lateritia in platea Alstergassen dicta.

3. *PLANTAGO* foliis lanceolatis, spica subovata nuda scapo angulato. *Vir. Cliff.* 9. *Hort. Cliff.* 36.

Plantago angustifolia major. *Baub. pin.* 189.

Plantago minor. *Dodon. pempt.* 102.

Habitat ubique ad agrorum margines, & in campis siccioribus.

4. *PLANTAGO* foliis linearibus dentatis, scapo tereti. *Linn. Sp. pl.* 115.

Plantago foliis linearibus pinnato-dentatis. *Hort. Cliff.* 37. *Fl. Suec.* 126.

Coronopus sylvestris hirsutior. Baub. pin. 190.

Herba Stella S. Cornu Cervinum. Dodon. pempt. 109.

Habitat ad Baden supra muros collapsæ arcis Rauenstein.

5. *PLANTAGO* caule ramoso, foliis integerrimis, spicis foliosis. *Hort. upf. 29.*

Plantago caule ramoso. *Vir. Cliff. 9.*

Plantago annua, foliis integerrimis, caule ramoso erecto. *Hort. Cliff. 37.*

Psyllium majus erectum. Baub. pin. 191.

Habitat supra Weinhaus in vallo tempore assedii Viennensis a Turcis facto, vulgo auf der Türckenschanz.

SANGVISORBA.

1. *SANGVISORBA* Spicis ovatis. *Hort. Cliff. 39. Fl. Suec. 130.*

Sanguisorba major pratensis. Hall. Jen. Rupp. 63.

Pimpinella sanguisorba major. Baub. pin. 160.

Pimpinella sylvestris S. sanguisorba major. Dodon. pempt. 105.

Habitat in pratis passim præsertim circa Dornbach: Fischamentam, & Leytæpontum.

CORNUS.

1. *CORNUS* arborea, umbellis involucrum æquantibus. *Hort. upf. 29.*

Cornus sylvestris mas. Baub. pinn. 447.

Cornus mas pumilio. Clus. hist. 1. p. 13.

β. *Cornus hortensis mas. Baub. pinn. 447.*

Habitat passim in sylvis præsertim circa Dornbach, Pezlsdorff, Fischamentam & Leytæpontum. β. in hortorum sepibus præcipue Rohraviæ in horto Excellentissimi Comitis Caroli ab Harrach.

2. *CORNUS* arborea, cymis nudis. *Linn. Sp. pl. 117.*

Cornus umbellis involucre multoties longioribus. Hort. Cliff. 38.

Cornus fœmina. Baub. pinn. 447.

Virga sanguinea. Dodon. pempt. 782. Dill. Giff. 145.

Ostea Loniceri, & Rivini. Hall. fl. Jen. Rupp. 93.

Habitat passim in fruticetis præsertim insularum danubialium, & Fischamentæ in insula Geimanniana, in valle Döblingensi, inter Salmersdorff & Weidling; alibique.

T R A P A.

1. TRAPA. Linn. Sp. pl. 120.

Trapa petiolis foliorum natantium ventricosus, Fl.
Suec. 134.

Tribuloides vulgare aquis innascens. Tournef. inst. 655.

Tribulus aquaticus. Bauh. pinn. 194.

Tribulus aquatilis. Dodon. pempt. 581.

Habitat in piscinis ultra Felsberg austriæ transdanubiali
vicinis

E L Æ A G N V S.

1. ELÆAGNUS foliis lanceolatis. Hort. ups. 31.

Elæagnus. Cam. epit. 106. Hort. Cliff. 38.

Olea sylvestris folio molli incano. Bauh. pin. 473.

Ziziphus Cappadocica. Dodon. pempt. 807.

Hospitatur sub dio in, & ad hortum phasianorum Excellen-
tissimi Comitis Ernesti ab Harrach Leytæponti, ex
Aschach pago austriæ Superioris (ubi habitat) dicti Co-
mitis prædio a patre ejusdem Friderico ab Harrach in-
ter eruditos piæ memoriæ digno historiæ naturalis Zelosissimo
cultore in Austriam inferiorem delatus.

A L C H E M I L L A.

1. ALCHEMILLA foliis lobatis. Fl. Suec. 135.

Alchemilla foliis palmatis. Hort. Cliff. 38.

Alchemilla foliis simplicibus. Fl. lapp. 66.

Alchimilla. Dodon. pempt. 140.

β. Alchemilla vulgaris. Bauh. pin. 319.

Alchimilla minor. Tournef. inst. 502.

Habitat circa Heiligencreutz & Aland. β. passim in pratis
præsertim circa Dornbach Fischament, & Döbling.

2. ALCHEMILLA foliis digitatis ferratis. Fl. lapp. 61. Fl.
Suec. 136.

Alchimilla alpina quinque folii folio subtus argenteo.
Tournef. inst. 508.

Alchimilla alpina pentaphyllos. Raj. hist. 209.

Tormentilla alpina folio sericeo. Bauh. pin. 326.

Habitat in via ex Novem Ecclesiis Buchbergam versus,
sicut etiam copiose in secundo jugo Montis Schneeberg.

DIGYNIA.

APHANES.

I. APHANES. *Fl. Suec.* 137. *Gron. Virg.* 17.

Percepier anglorum. *Dill. gen.* 94. *Giff.* 60.

Alchimilla minima montana. *Hall. Jen. Rupp.* 64.

Chærophyllo non nihil similis. *Baub. pin.* 182.

Scandix minor. *Tabern. icon.* 96.

Habitat in arvis inter Weinhaus, & Hernals.

CVSCVTA.

I. CVSCVTA floribus sessilibus. *Linm. Sp. pl.* 124.

Cuscuta nuda repens filiformis. *Fl. Suec.* 138.

Cuscuta major. *Baub. pin.* 219.

Cuscuta. *Cam. epit.* 984.

β. Epithymum S. Cuscuta minor. *Baub. pin.* 219.

Habitat in variis plantis circa Dornbach, & Leytæpontum, in Tabor, valle Döblingensi, alibique in sylvis, & pratis. β. Copiose in valle Breinina.

TETRAGYNIA.

ILEX.

I. ILEX foliis ovatis acutis spinosis. *Hort. ups.* 32.

Ilex aculeata baccifera. *Baub. pin.* 425.

Aquifolium S. Agrifolium. *Lob. hist.* 582.

Hospitatur in hortis Rhizotomarum sub dio sicut etiam ad murum in horto Schönbrunnensi inter palatium & Ecclesiam Hiezingensem copiose olim culta est; an adhuc superstes, an fabricando extirpata?

POTAMOGETON.

I. POTAMOGETON foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus. *Fl. Suec.* 139.

Potamogeton foliis ovato-oblongis natantibus. *Fl. lapp.* 68.

Potamogeton rotundifolium. *Baub. pin.* 193.

Habitat in piscina supra Himberg, & in fossis Ebersdorffensibus.

2. POTAMOGETON foliis lanceolatis planis in petiolos desinentibus. *Fl. Suec.* 141.
 Potamogeton alpinum plantaginis folio. *Tournef. inst.* 233.
 Potamogeton foliis angustis splendentibus. *Bauh. pin.* 193.
 Potamogeton aquis immersum, folio pellucido lato, oblongo, acuto. *Raj. hist.* 138.
 Fontinalis lucens major. *Bauh. hist.* 3. p. 769.
 Habitat in fossis arcis olim Comitum Volcherer in Schwechet, nunc Comitum Kircher. vulgo Kettenhof dicta.
3. POTAMOGETON foliis lanceolatis alternis undulatis serratis. *Fl. Suec.* 142.
 Potamogeton foliis crispis S. lactuca ranarum sarmenis planis. *Bauh. pin.* 193.
 Potamogeton S. Fontinalis crispa, foliis alternis, cauliculis compressis. *Boerhaav. lugdb.* 1. p. 197.
 Fontinalis crispa. *Bauh. hist.* 3. p. 770.
 Fontilapathum pusillum. *Lob. icon.* 236.
 Tribulus aquaticus minor. *Clus. hist.* 2. p. 252.
 Habitat in fossis hospitalis Ebersdorffensis.
4. POTAMOGETON foliis linearibus obtusis, caule compresso. *Fl. Suec.* 143.
 Potamogeton caule compresso, folio graminis canini. *Raj. hist.* 189.
 Habitat in fossis arcis Comitum Kircher in Schwechet, & in fossatis hospitalis Ebersdorffensis.

SAGINA.

1. SAGINA ramis procumbentibus. *Fl. lapp.* 157. *Fl. Suec.* 148.
 Alfine pusilla, graminea flore tetrapetalo. *Tournef. inst.* 243.
 Alfine minima flore fugaci. *Raj. app.* 501. *Tournef. inst.* 243. *Vaill. parif.* 6.
 Alfine tetrapetala, foliis angustis in origine latefcentibus. *Hall. herb.* 390. *Fl. Jen. Rupp.* 73.
 Alsinella muscosa flore repens. *Dill. Giff.* 81. *Raj. syn. Britan.* 345.
 Saxifraga graminea, [pusilla, flore parvo tetrapetalo. *Raj. hist.* 1026.

Spergula perennis, repens, folio gramineo læte virente. *Hall. Jen. Rupp.* 73.

Caryophyllus minimus, muscosus nostras. *Park. theatr.* 1340.

Habitat in valle Breinina, & ad pedem alpīs Breininae in saxīs madidis.

2. *SAGINA* caule erecto unifloro. *Linn. Sp. pl.* 128.

Alpine foliis Caryophyllæis. *Raj. Syn. Brit.* p. 344. t. 15. f. 4.

Alpine verna glabra. *Vaill. paris.* 6. t. 3. f. 2.

Alpine pusilla, pulchro flore, folio tenuissimo nostras, *S. saxifraga Caryophylloides* pusilla flore albo pulchello. *Raj. hist.* 1033.

Spergula unicaulis, pusilla, foliolis latiusculis acutis. *Hall. Jen. Rupp.* 73.

Habitat in mœniis Viennensibus præsertim inter portam Stubensem, & Carinthiacam.

CLASSIS V.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

MYOSOTIS.

I. *MYOSOTIS* Seminibus nudis: foliorum apicibus callosis. *Fl. Suec.* 149.

α. *Myosotis foliis hirsutis.* *Hort. Cliff.* 45.

Myosotis minor arvensis. *Hall. Jen. Rupp.* 10.

Myosotis hirsuta arvensis major. *Fl. lapp.* 14. *Dill. Giff.* 55.

Scorpiurus annua, flore parvo. *Hall. Helv.* 519.

Heliotropium minus angustifolium arvense f. hirsutum. *Boerhaav. Lugdb.* 1. p. 190.

Lithospermum arvense minus. *Tournef. inst.* 137.

Echium Scorpioides arvense. *Baub. pin.* 254.

β. *Myosotis foliis glabris.* *Hort. Cliff.* 46.

Myosotis palustris major. *Hall. Jen. Rupp.* 10.

Myosotis glabra pratensis. *Dill. Giff.* 67. *Fl. lapp.* 75.

Scorpiurus perennis, floribus majoribus. *Hall. helv.* 520.

Echi-

Echium Scorpioides palustre. Baub. pin. 254.

Habitat *a. copiose in arvis Döblingensibus & Leytæpontanis, sicut etiam inter Dornbach & Neustift. B. in pratis Murobacensibus & Fischamentensibus, ad viam Nussdorffensem, in valle Döblingensi, in Tabor, & omnibus insularum danubialium locis gramineis.*

2. *Myrsotis* feminibus aculeis triglochidibus, foliis lanceolatis pilosis. *Fl. Suec. 150.*

Lithospermum feminibus echinatis. *Hort. Cliff. 46.*

Buglossum angustifolium, semine echinato. Tournef. inst. 134.

Cynoglossum foliis lingulatis hirsutis subasperis, floris minimi tubo longiore. *Hall. beho. 521.*

Cynoglossum minus. Baub. pin. 257,

Lappula Rivini. Hall. Jen. Rupp. 12.

Habitat *in vallo suburbico & ad agrorum margines Viennæ retro hortum olim S. P. Eugenii. Ad viam regiam Döblingensem, s. Nussdorffensem. in Tabor, insula Geimanniana Fischamentæ aliisque insulis danubialibus, & in arvis, ac illorum, vinearumque marginibus passim Leytæponti.*

L I T H O S P E R M V M.

1. *LITHOSPERMUM* feminibus lævibus, corollis calycem vix superantibus, foliis lanceolatis. *Fl. Suec. 51.*

Lithospermum majus erectum. Baub. pin. 258.

Lithospermum minus. Cam. epit. 659.

Habitat *passim in insulis danubialibus, præsertim in Tabor, Brader, viridario urbico s. Stadt Gut Viennæ, omnibusque fere Ebersdorffensibus, Mannsvertensibus, & Fischamentensibus.*

2. *LITHOSPERMUM* feminibus rugosis, corollis vix calycem superantibus. *Fl. Suec. 152.*

Lithospermum arvense radice rubra. Baub. pin. 258. Fl. lapp. 73.

Lithospermum nigrum quibusdam, flore albo, semine Echii. Baub. hist. 2. p. 592.

Buglossum arvense annuum, lithospermi folio. Tournef. inst. 134.

Echioides flore albo. Riv. monop. irr. Hall. Jen. Rupp. 218.

Anchusa arvensis minor facie milii folis. *Tabern. icon.*
849.

Habitat in arvis passim, præsertim in iis inter vallum suburbicum Viennensem & hortum olim S. P. Eugenii sitis, ac in Döblingensibus.

3. *LITHOSPERMUM* feminibus lævibus corollis calycem multoties superantibus. *Hort. Cliff.* 46.

Lithospermum flore magno, caule ex apice radices agente. *Hall. helv.* 517.

Lithospermum, minus, repens, latifolium. *Baub. pin.* 258.

Lithospermum repens majus. *Clus. hist.* 2. p. 163.

Habitat passim in vepretis circa Viennam, Laag, & Leytæpontum, in sylvula Gatterhölztzl dicta, in monticulo regio Enzersdorff inter & Fischamentam sito, alibique in dumetis.

A N C H U S A.

1. *ANCHUSA* foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. *Fl. Suec.* 153.

Buglossum angustifolium majus. *Baub. pin.* 256.

Buglossum vulgare. *Cam. epit.* 915.

Habitat ad viam regiam supra Nussdorff, circa Fischamentam, inter Gishabel & sylvam Petersdorffensem, in valle Döblingensi alibique passim ad ruderata, & vias.

C Y N O G L O S S V M.

1. *CYNOGLOSSUM* staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus. *Linn. Sp. pl.* 134.

Cynoglossum foliis ovato-lanceolatis, corollis calycem æquantibus. *Fl. Suec.* 154.

Cynoglossum majus vulgare. *Baub. pin.* 257.

Cynoglossum vulgare. *Cam. epit.* 700.

Habitat in Tabor ad sinistram, ad viam Döblingensem, circa Dornbach, Petersdorff, Fischamentam & Leytæpontum passim.

P V L M O N A R I A.

1. *PULMONARIA* foliis radicalibus lanceolatis. *Hort. Cliff.* 44. Pul-

Pulmonaria V. pannonica. Clus. hist. 2. p. 170.

Habitat passim in sylvis circa Petersdorff versus Gishübel, in monticulo regio Fischamentensi, in Tabor, alibique in sylvis cæduis.

2. *PULMONARIA* foliis radicalibus ovato-cordatis scabris.
Fl. Suec. 156.

Pulmonaria vulgaris maculoso folio, & non maculoso.
Clus. hist. 2. p. 168.

Symphitum maculosum, sive pulmonaria latifolia.
Baub pin. 259.

Habitat circa Burkersdorff, & Hiedldorff, in monte Cecio s. Kalenberg, circa Leytæpontum, alibique passim in sylvis.

S Y M P H Y T V M.

1. *SYMPHYTUM* foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Fl. Suec. 155.*

Symphytum consolida major. Baub. pin. 259.

Symphytum majus. Cam. epit. 70.

Habitat ubique in umbrosis subhumidis, & graminosis præsertim in fossa inter mænia Viennensia, circa Dornbach, & in insulis danubialibus.

2. *SYMPHYTUM* foliis summis oppositis. *Linn. Sp. pl. 136.*

Symphytum majus tuberosa radice. Baub. pin. 259.

Symphytum radice tuberosa. Cam. epit. 701.

Habitat copiosè in insula Danubiali majore Fischamentæ.

C E R I N T H E.

1. *CERINTHE* foliis complexicaulibus emarginatis, fructibus geminis, corollis acutis clausis. *Linn. Sp. pl. 137.*

Cerinte f. Cynoglossum montanum majus. Baub. pin. 258.

Habitat passim in nemoribus insularum Danubialium fere omnibus, in monticulo regio ad Enzersdorff s. Fischamentam sito, inter Gishübel & Petersdorff, aliisque in sylvis montanis.

2. *CERINTHE* foliis amplexicaulibus integris, fructibus geminis, corollis acutis clausis. *Linn. Sp. pl. 137.*

Cerinte foliis caulem amplexantibus floribus profunde quinquesidis. Hall. leb. 516.

Cerinte minor. Baub. pin. 258.

Cerinthe minor f. quarta. *Clus. hist.* 2. p. 168.

Habitat in agris Leytæpontanis passim, præsertim in iis ad senticetum versus domum venatoris, & ad primas vineas f. Adelsbergenses sitis.

B O R R A G O.

1. *BORRAGO* foliis omnibus alternis, calycibus patentibus.

Hort. Ups. 34.

Borrigo floribus cæruleis. *Tournef. inst.* 133.

Buglossum latifolium, *Borrigo*. *Baub. pin.* 256.

Habitat nunc passim in Insulis Danubialibus, nempe in Brader, Tabor, & Fischamentensibus, ex hortis Nusdorfensibus & Erdbeerenfibus ad Danubium sitis, ubi copiose colitur, a Danubio illuc delatis seminibus.

A S P E R V G O.

1. *ASPERVGO*. *Fl. Lapp.* 76. *Fl. Suec.* 159.

Asperugo vulgaris. *Tournef. inst.* 135.

Buglossum Sylvestre caulibus procumbentibus. *Baub. pin.* 257. Fructu pedem anserinum referente. *Moris. hist.* 3. p. 181. t. 183.

Habitat in ruderatis, & ad sepes passim, præsertim in mœniis Viennæ supra portam Novam, & Stubensem, Turremque rubram Transweisgarber versus Erdbeer, alibique.

L Y C O P S I S.

1. *Lycopsis* foliis integerrimis, calycibus inflatis pendulis, radice annua.

Lycopsis foliis integerrimis, calycibus frutescentibus inflatis pendulis. *Hort. Ups.* 35.

Echioides flore pullo calice amplo. *Riv. mon. irr. t.* 8. in posterioribus exemplaribus. *Hall. Jen. Rupp.* 219.

Habitat in arvis, eorumque limitibus, Viennæ inter vallum Suburbicum & hortum olim S. P. Eugenii circa Döbling, Hernals, & Dornbach sitis.

2. *LYCOPSIS* foliis integerrimis lanuginosis, calycibus florentibus cylindræis, frutescentibus ovatis pendulis, radice perenni.

Echioi-

Echioides flore pullo. Rivini Hall. Jen. Rupp. 219.

Habitat passim cum præcedente, sola autem, & copiosè in tractu illo valli Suburbici Viennensis inter portas per quam Waringam & aliam per quam Hernals, vel Lerchenfeld itur, sito.

3. *LYCOPSI* foliis lanceolatis hispidis calycibus florescentibus erectis. *Fl. Lapp. 77. Fl. Suec. 157.*

Echioides flore cæruleo. Rivini Hall. Jen. Rupp. 218.

Buglossum Sylvestre minus. Baub. pin. 256.

Echium Fuchsi sive Borrago Sylvestris. Baub. hist. 3. p. 581.

Buglossa Sylvestris. Dodon. pempt. 628.

Habitat in agris & in eorum limitibus passim, præsertim in iis circa hortum olim S. P. Eugenii Viennæ sitis. Nec non in prato Murobacensi.

ECHIVM.

1. *ECHIVM* caule simplici erecto, foliis caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus. *Fl. Suec. 158.*

Echium. Rivini monop. irr. Camp. epit. 737. Dodon. pempt. 631.

Echium vulgare. Baub. pin. 254. Baub. hist. 3. p. 586. Clus. hist. 2. p. 143.

Habitat ubique ad vias, & in agrorum marginibus circa Viennam, Leytæpontum, Döbling, Dörnbach, & Murobacium.

ANDROSACE.

1. *ANDROSACE* perianthiis maximis. *Hort. Ups. 36.*

Androsace calycibus fructuum maximis. Hort. Cliff. 50.

Androsace altera. Cam. epit. 639. Clus. hist. 2. p. 134.

Alfine affinis Androsace dicta major. Baub. pin. 251.

Habitat passim in agris, & in vallo Suburbico Viennensi præsertim circa hortum olim S. P. Eugenii, in eodem inter portam Hernalsensem, & Waringensem. Ad viam Döblingensem, alibique.

2. *ANDROSACE* foliis pilosis, perianthiis hirsutis. *Linn. Sp. pl. 142.*

Aretia villosa, floribus umbellatis. Hall. Helv. 486.

Sedum alpinum hirsutum, lacteo flore. Baub. pin. 284.

Sedum minus X, alpinum IV. Clus. hist. 2, p. 62.

Habitat in Monte Schneeberg, ejusque jugis.

P R I M V L A.

1. PRIMVLA foliis dentatis rugosis, scapo multifloro, limbo corollarum concavo.
 Primula foliis dentatis rugosis. *Fl. Suec.* 181.
 Primula foliis denticulatis rugosis, limbo corollarum concavo. *Mat. med.* 64.
 Primula veris odorata, flore luteo simplici. *Bauh. hist.* 3. p. 495.
 Verbascum pratense odoratum. *Bauh. pin.* 241.
 Primula veris flavo flore elatior. *Clus. hist.* 1. p. 301.
 Habitat in pratis passim præsertim circa Dornbach, Döbling, & Leytæpontum.
2. PRIMVLA foliis dentatis rugosis pedunculis radicalibus unifloris, limbo corollarum plano.
 Primula veris pallido flore humilis. *Clus. hist.* 1. p. 302.
 Primula veris minor. *Dodon. pempt.* 147.
 Verbascum sylvestre majus singulari flore. *Bauh. pin.* 241.
 Habitat copiosè in sylvis circa Dornbach, Hiedldorff, & Burckersdorff.
3. PRIMVLA foliis crenatis, glabris, florum limbo plano.
Fl. Suec. 162.
 Primula foliis crenatis glabris. *Virid. Cliff.* 12.
 Primula foliis erectis fastigiatis. *Fl. Lapp.* 79.
 Primula veris rubro flore. *Clus. hist.* 1. p. 300.
 Verbascum umbellatum alpinum minus. *Bauh. pin.* 242.
 Habitat passim in pratis uliginosis, præsertim in iis inter viam regiam Badensem, & Petersdorff sitis, sicut etiam inter Margarethen, vulgo an Moos, & Loreten, circa Himberg, Waltersdorff, Ebersdorff, in valle Bruhl retro Medling, supra Baden versus Neapolim Austriæ; alibique.
4. PRIMVLA foliis ferratis glabris. *Hort. Ups.* 36.
 Primula foliis ferratis carnosis glabris. *Hort. Cliff.* 50.
 Sanicula alpina lutea. *Bauh. pin.* 242.
 Auricula Ursi I. *Clus. hist.* 1. p. 302.
 Habitat in Schneeberg, in alpibus Breininis, & in montis petrosi Medlingensis parte Septentrionali.
5. PRIMVLA foliis cuneiformibus dentatis minimis corolla longe minoribus. *Linn. Sp. pl.* 143.
 Sanicula alpina minima carnea. *Bauh. pin.* 243.
 Auricula Ursi VIII. minima. *Clus. hist.* 1. p. 305.
 Habitat in ultimo jugo Montis Schneeberg, ast minus frequens.

6. PRIMULA foliis integerrimis glabris oblongis, calycibus tubulosis obtusis. *Linn. Sp. pl.* 144.

Primula foliis glabris carnosiss integerrimis. *Hall. helv.* 485.

Sanicula alpina rubescens, folio non ferrato. *Baub. pin.* 243.

Auricula Ursi IV. *Clus. hist. i. p.* 303. *t.* 304.

Habitat in Schneeberg, alpibusque vicinis.

CORTVSA.

1. CORTVSA calycibus corolla brevioribus. *Linn. Sp. pl.* 144.

Cortusa foliis cordatis petiolatis. *Hort. Cliff.* 50.

Cortusa Mathioli. *Clus. hist. i. p.* 307.

Sanicula montana latifolia laciniata. *Baub. pin.* 243.

Habitat in alpium locis umbrosis, potissimum ubi in jugis sylvæ desinunt in alpibus Breininis, Schneeberg, Wexel.

SOLDANELLA.

1. SOLDANELLA. *Hort. Cliff.* 49.

Soldanella alpina rotundifolia. *Baub. pin.* 295.

Soldanella alpina. *Cam. epit.* 254.

Habitat in alpe Breinina & Wexel.

CYCLAMEN.

1. CYCLAMEN corolla reflexa. *Linn. Sp. pl.* 145.

Cyclamen foliis cordatis, corolla reflexa. *Hort. Ups.* 47.

Cyclamen. *Hort. Cliff.* 49.

Cyclamina omnia I. — 13. *Baub. pin.* 308.

Cyclaminus. *Cam. epit.* 357.

Habitat passim in sylvis præsertim circa Murobacium, Dornbach, Weidling, Grinzing, Burckersdorff, & Mannersdorff.

MENYANTHES.

1. MENYANTHES foliis ternatis. *Fl. Lapp.* 80. *Fl. Suec.* 163.

Menyanthes palustre angustifolium triphyllum. *Tournef. inst.* 117.

Menyanthes. *Tournef. & Rivini. Hall. Jen. Rupp.* 22.

Acopa. *Moris. hist. 3. s.* 15. *t.* 2.

Trifolium palustre. Baub. pin. 327.

Habitat copiose extra Draskirchen ad pontem in stagno rivus de- tro, sicut etiam ultra Schwechet versus Lanzendorff in uliginosis.

LYSIMACHIA.

1. *LYSIMACHIA* paniculata, racemis terminalibus. Linn. Sp. pl. 146.

Lyfimachia foliis lanceolatis, racemo composito terminali. Fl. Suec. 166.

Lyfimachia foliis lanceolatis, corymbo terminali. Fl. Lapp. 81.

Lyfimachia lutea major. Baub. pin. 245.

Lyfimachium luteum. Dodon. pempt. 84.

Nummularia erecta. Rivini. Hall. Jen. Rupp. 18.

Habitat supra Grinzing, in Tabor, aliisque Insulis Danubialibus passim.

2. *LYSIMACHIA* foliis ovatis acutis, floribus solitariis, caule procumbente. Hort. Cliff. 52.

Anagallis lutea nemorum. Baub. pin. 252.

Anagallis. Clus. hist. 2. p. 182.

Habitat teste Clusio in Hebeberger in summo fere jugo inter arbores; ego in cursibus meis Botanicis illam tantum semel in loco opaco montis Cecii seu Kalenberg inveni.

3. *LYSIMACHIA* foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente. Fl. Suec. 168.

Nummularia supina, sive *Nummularia* officinarum. Hall. Jen. Rupp. 18.

Nummularia major lutea. Baub. pin. 309.

Anagallis mas. Cam. epit. 324.

Habitat juxta Scrobes, & agros hinc inde praesertim circa Dornbach, & in Tabor.

ANAGALLIS.

1. *ANAGALLIS* foliis indivisis, caule procumbente. Linn. Sp. pl. 148.

Anagallis foliis indivisis. Fl. Suec. 169.

Anagallis foliis ovatis. Hort. Cliff. 52.

Anagallis phoeniceo flore. Baub. pin. 252.

Habitat in arvis Viennam inter & Döbling, sicut etiam undique circa Döbling, Grinzing, Waring, & Mariaefontum, alibique in pomariis.

A Z A L E A.

1. *AZALEA* ramis diffuso patentibus. *Fl. Lapp.* 90. t. 6. f. 2.
Fl. Suec. 170.

Chamærhododendros alpina serpillifolia. *Tournef. inst.*
 604.

Chamærhododendros ferruginea supina, thymi folio,
alpina. *Bocc. mus.* 64. t. 53.

Chamæcistus serpillifolia floribus carneis. *Bauh. pin.* 466.

Chamæcistus VII. *Clus. hist.* 1. p. 75.

Habitat in summis alpium jugis præsertim in Schneeberg.

C O N V O L V U L V S.

1. *CONVOLVULVS* foliis sagittatis utrinque acutis, pedunculis unifloris. *Fl. Suec.* 173.

Convolvulus foliis sagittatis acutis. *Hort. Cliff.* 66.

Convolvulus minor arvensis. *Bauh. pin.* 294. *Tournef. inst.* 83.

Smilax lævis minor. *Dodon. pempt.* 323.

Habitat passim in arvis circa Döbling, Hernals, Waring, & Leytæpontum.

2. *CONVOLVULVS* foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis unifloris. *Fl. Suec.* 174.

Convolvulus foliis sagittatis postice truncatis. *Hort. Cliff.* 66.

Convolvulus major albus. *Bauh. pin.* 294.

Smilax lævis major. *Dodon. pempt.* 322.

Habitat passim ad sepes, in hortis, pomariis, & dumetis.

3. *CONVOLVULVS* calycibus tuberculatis, pilosis. *Hort. Ups.* 38.

Convolvulus annuus foliis cordatis, rarius trilobis, calyce tuberculato piloso. *Hort. Cliff.* 67.

Convolvulus purpureus folio subrotundo. *Bauh. pin.* 295.

Hospitatur passim in hortis, & ante fenestras curiosorum.

4. *CONVOLVULVS* foliis lineari lanceolatis acutis, caule ramoso recto, pedunculis bifloris. *Hort. Cliff.* 68.

Convolvulus minimus spicæfolius. *Moris. hist.* 2. p. 17.
S. 1. T. 4. f. 3.

Convolvulus linariæ folio. *Bauh. pin.* 295.

Cantabrica quorundam. *Clus. hist.* 2. p. 49.

Habitat in montibus Badensibus, & præsertim in quo Scaturigo Thermarum est.

3. CONVULVULVS foliis lanceolato-ovatis glabris, caule declinato, floribus solitariis. *Virid. Cliff.* 19.

Convolvulus foliis lanceolato-ovatis glabris, caule declinato, floribus solitariis. *Hort. Cliff.* 68. *Hort. Ups.* 38.

Convolvulus peregrinus cæruleus, folio oblongo. *Baub. pin.* 295.

Convolvulus lusitanicus flore cyaneo. *Brofs. Hall. Jen. Rupp.* 28.

Hospitatur sub dio in variis hortis curiosorum, præsertim Viennæ in horto S. P. de Schwarzenberg.

I P O M O E A.

1. IPOMOEA foliis cordatis acuminatis: basi angulatis, pedunculis multifloris. *Hort. Ups.* 39.

Ipomœa foliis cordatis acuminatis vix dentatis. *Hort. Cliff.* 66.

Ipomœa foliis cordatis integerrimis, limbo floris quinquefido. *Sauv. meth.* 114.

Quomoclit americana, folio hederæ, flore coccineo. *Comm. rar.* 21. t. 21.

Convolvulus coccineus, folio anguloso. *Plum. amer.* 89. t. 203. *Raj. suppl.* 380.

Convolvulus orientalis flore coccineo minore, a Comelino sub nomine Quomoclit descriptus. *Hall. Jen. Rupp.* 29.

Hospitatur sub dio in hortulo botanico Fratris Honorii apud FF. Misericordiæ in Suburbio Leopoldino Viennæ.

2. IPOMOEA foliis cordatis integerrimis, floribus confertis, corollis indivisis. *Sauv. monsp.* 114. *Linn. Sp. pl.* 161.

Quamoclit foliis amplissimis cordiformibus. *Plum. Spec.* 3.

Hospitatur sub dio in horto Domini Maximiliani in Suburbio Viennensi Alstergassen dicto.

C A M P A N V L A.

1. CAMPANULA foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. *Fl. Lapp.* 83. *Fl. Suec.* 176. *Hort. Ups.* 65.

Campanula minor rotundifolia vulgaris. *Baub. pin.* 93.

β Campanula minor rotundifolia alpina. *Baub. pin.* 93.

γ Cam-

γ *Campanula alpina linifolia cærulea. Baub. pin. 93. Fl. Lapp. 84.*

Habitat passim in omnibus fere locis gramineis totius agri Viennensis, β & γ vero in alpibus Breinini & Schneeberg.

2. *CAMPANULA* foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis. *Fl. Suec. 179.*

Campanula foliis lineari-lanceolatis crenatis caule longissimo simplicissimo, floribus raris. *Hort. Cliff. 65.*

Campanula persicæ folio. Clus. hist. 2. p. 171. Hall. Jen. Rupp. 30.

Campanula angustifolia cærulea. Baub. hist. 2. p. 803.

Rapunculus persicifolius, magno flore. Baub. pin. 93.

β *Rapunculus nemorosus angustifolius magno flore major. Baub. pin. 93.*

Habitat circa Weidling, Grinzing, Dornbach, in prato Murobacensi, in valle Döblingensi & ad Sylvarum margines Leytæponti passim, β sparsim cum priore præsertim in Sylva dicta Gatterhölzl.

3. *CAMPANULA* foliis ovatis subserratis, caule erecto paniculato; ramulis brevibus. *Linn. Sp. pl. 165.*

Campanula foliis ovatis glabris obsolete serratis, ramis brevissimis cauli approximatis. *Virid. Cliff. 17.*

Campanula foliis ovatis margine cartilagineo crenatis, caule ramosissimo angustato. *Hort. Cliff. 64.*

Campanula pyramidata altissima. Tourn. Hall. Jen. Rupp. 29.

Campanula lactescens foetidior. Clus. hist. 2. p. 172.

Campanula pyramidalis lævis. Baub. hist. 2. p. 808.

Rapunculus hortensis latiore folio, seu pyramidalis. Baub. pin. 93.

Hospitatur passim in hortis, & ante fenestras curiosorum sub dio, sponte sua autem vixit Viennæ supra tectum domus palatio Archi-Episcopali vicinæ in platea Wollzeil, an superstes; an extirpata?

4. *CAMPANULA* caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. *Fl. Suec. 181.*

Campanula foliis radicalibus cordatis, calycibus ciliatis. *Hort. Cliff. 64.*

Campanula vulgatiior, foliis urticæ, vel major & asperior. Baub. pin. 94.

Campanula major & asperior folio urticæ. Baub. b. 2. p. 805.

Cervicaria major. Dodon. pempt. 164.

Trache-

Trachelium vulgare. *Clus. hist. 2. p. 170.*

Habitat *passim in sylvis & sepibus præsertim circa Leytæpontum, Murobacium, & Döbling.*

5. *CAMPANULA* caule angulato simplici, floribus sessilibus, capitulo terminali. *Fl. Suec. 182.*

Campanula foliis lanceolato-ovatis crenatis, ramis capitulo florali terminatis. *Hort. Cliff. 64.*

Campanula pratensis, flore conglomerato. *Baub. pin. 24.*

Cervicaria minor. *Dodon. pempt. 164.*

Trachelium minus. *Clus. hist. 2. p. 171.*

Habitat *in pratis inter sylvas sitis circa Leytæpontum, Weidling, Dornbach, & Burckersdorff, in monte supra Nusdorff, circa Monasterium Neuberg, & in alpihus Breininis.*

6. *CAMPANULA* hispida, floribus sessilibus, capitulo terminali, foliis lanceolato-linearibus undulatis. *Fl. Suec. 183.*

Campanula altissima hirsuta asperior, foliis angustis, floribus parvis conglomeratis. *Dill. Giff. 121.*

Campanula alpina altissima hirsuta, parvo flore. *Tournef. inst. 110.*

Campanula foliis & spica longissimis, floribus sessilibus in alis congestis. *Hall. belv. 492.*

Trachelium altissimum, foliis asperis angustis, floribus parvis. *Baub. hist. 2. p. 801.*

Habitat *in sylvis asperis circa Medling, & Petersdorff minus frequens.*

7. *CAMPANULA* hispida racemo ovato-oblongo terminali, caule simplicissimo, foliis lanceolato-linearibus. *Linn. Sp. pl. 167.*

Campanula foliis echii. *Baub. pin. 24. prodr. 36. Hall. Jen. Rupp. 29.*

Alopecurus alpinus quibusdam, Echium montanum dalechampii. *Baub. hist. 2, p. 809.*

Habitat *in alpe Breinina.*

8. *CAMPANULA* caule ramosissimo diffuso, foliis oblongis subcrenatis, calycibus solitariis corolla longioribus, capsulis prismaticis. *Hort. Ups. 41.*

Campanula caule ramoso, foliis ovato-oblongis crenatis. *Hort. Cliff. 65.*

Campanula calycibus corollam superantibus capsulis columnaribus. *Vir. Cliff. 17.*

Speculum Veneris. Raj. hist. 742.

Onobrychis arvensis f. *Campanula arvensis erecta.*

Baub. pin. 215.

Habitat in arvis, locisque gramineis circa Waring, Döbling, Burckersdorff & Perschling.

PHYTEVMA.

1. *PHYTEVMA* spica oblonga, capsulis bilocularibus, foliis radicalibus cordatis. *Linn. Sp. pl. 171.*

Rapunculus corniculatus spica longiore. *Riv. Hall. Jen.*

Rupp. 248.

Rapunculus spicatus. Baub. pin. 92.

Rapunculus corniculatus spicatus, f. *Alopecuroides*, flore albo, & cæruleo. *Moris. hist. 2. p. 463. s. 5. t. 5. f. 46.*

Habitat in prato Murobacensi, inter Dornbach & Weidling, circa Burckersdorff, in Schneeberg, & in alpe Breinina.

2. *PHYTEVMA* fasciculo terminali sessili, foliis dentatis: radicalibus cordatis. *Linn. Sp. pl. 171.*

Rapunculus alpinus corniculatus. Baub. pin. 113.

Trachelium petraeum minus. Pon. bald. 336. t. 336.

Habitat in alpe Breinina, & in valle Bruhl retro Medling, rarissime.

SAMOLVS.

SAMOLVS. Hort. Cliff. 51. Hort. Ups. 42. Fl. Suec. 165.

Samolus Valerandi. Baub. hist. 3. p. 791.

Anagallis aquatica, rotundo folio non crenato. *Baub. pin. 252.*

Alsine aquatica, foliis rotundis beccabungæ. *Moris. hist. 2. p. 323. S. 3. t. 24. f. 28.*

Habitat in horto deserto P. Montecuculi in Suburbio Leopoldino Viennæ sito, statim in principio horti ad dextram, ubi intratur ad hortulanum, in loco gramineo ad murum.

COFFEA.

COFFEA. Hort. Ups. 41.

Jasminum arabicum lauri folio, cujus semen apud nos

Caffè dicitur. *Juss. atl. 1713. p. 383.*

D

Evo-

Evonymo similis Ægyptiaca, fructu baccis lauri simili,
Baub. pin. 498.

Hospitatur in caldario horti Viennensis S. P. de Schwarzenberg, sicut etiam in Vaporario intra caldarium sito, horti Leytæpontani Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

L O N I C E R A.

1. LONICERA floribus verticillatis terminalibus sessilibus foliis summis connato-perfoliatis. *Hort. Ups. 42.*
 Periclymenum perfoliatum. *Baub. pin. 302.*
 Caprifolium italicum. *Dodon. pempt. 411.*
 Hospitatur passim in umbraculis hortorum, præsertim Viennæ, in horto olim Favoritæ Videntis nunc Gymnasii Theresiani quondam plantata nunc sponte habitat.
2. LONICERA capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis. *Fl. Suec. 191.*
 Periclymenum non perfoliatum germanicum. *Baub. pin. 302.*
 Periclymenum Germanicum. *Riv. mon. irr.*
 Caprifolium Germanicum. *Dodon. pempt. 411. Tournesf. inst. 608.*
 Habitat in dumetis præsertim in monte ad dextram Neustift trans rivulum ad fossam sito.
3. LONICERA pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis integerrimis pubescentibus. *Fl. Suec. 192.*
 Lonicera pedunculis bifloris, foliis ovatis obtusis integris. *Hort. Cliff. 58.*
 Chamæcerasus dumetorum, fructu gemino rubro. *Baub. pin. 451.*
 Xylosteum. *Dodon. pempt. 412. Riv. mon. irr. Hall. Jen. Rupp. 250.*
 Habitat in Lapidicina supra Nussdorff, in valle Breinina, in monte Schneeberg, & in horto Gymnasii Theresiani olim Favoritæ Videntis Viennæ.
4. LONICERA pedunculis bifloris, baccis coadunato-globosis, stylis indivisis. *Linn. Sp. pl. 174.*
 Chamæcerasus montana, fructu singulari cæruleo. *Baub. pin. 451. Tournesf. inst. 609.*
 Periclymenum rectum fructu cæruleo. *Baub. hist. 2. p. 108. Raj. hist. 1492.*

Xylosteum folio cerasi. Riv. Hall. Jen. Rupp. 251.
Habitat in Sylvula adversus Simmering sita.

M I R A B I L I S.

1. MIRABILIS. *Hort. Ups. 43. Hort. Cliff. 53. Rivini mon. irr. Hall. Jen. Rupp. 1.*

Solanum mexicanum, flore magno. Baub. pin. 168.

Admirabilis peruviana, rubro flore. Clus. hist. 2. p. 89.

β *Jalappa flore flavo. Tournef. inst. 129.*

γ *Jalappa flore exalbido. Tournef. inst. 129.*

δ *Jalappa flore ex purpureo & luteo mixto. Tournef. inst. 129.*

Hospitatur ubique in hortis sub dio.

V E R B A S C V M.

1. VERBASCUM foliis decurrentibus utrinque tomentosis.
Fl. Suec. 186.

Verbascum caule simplici superne floribus sessilibus clavato, foliis utrinque lanigeris. Hort. Cliff. 55.

Verbascum mas latifolium luteum. Baub. pin. 239.

Verbascum latius. Dodon. pempt. 143.

Habitat ubique ad vias & in agrorum marginibus circa Vienne, & per totum agrum Austriacum.

2. VERBASCUM foliis cuneiformibus oblongis. *Hort. Ups. 45.*
Verbascum foliis ovato-acutis subtus villosis crenatis, spicis laxis lateralibus, & terminalibus. Hort. Cliff. 54.

Verbascum pulverulentum, flore luteo parvo. Baub. hist. 3. p. 312. Raj. hist. 1094.

Verbascum mas angustioribus foliis, floribus pallidis. Baub. pin. 239. Hall. Jen. Rupp. 247.

β *Verbascum ramosum floribus albis parvis. Tournef. inst. 147.*

Habitat circa Dornbach, Salmersdorff, Grinzing, & Weidling in muris, ac vineis.

3. VERBASCUM foliis cordato-oblongis petiolatis. *Linn. Sp. pl. 178. Mat. med. 91.*

Verbascum foliis ovatis crenatis subtus tomentosis, caule angulato. Fl. Suec. 187.

Verbascum foliis ovatis subtus incanis crenatis spica laxa rarius ramola. Hort. Cliff. 54.

Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascente. *Baub. pin. 240. Hall. Jen. Rupp. 247.*

Verbascum nigrum flore parvo, apicibus purpureis. *Baub. hist. 3. app. 873.*

Verbascum nigrum. *Dodon. pempt. 144.*

Habitat in salicetis, ad vias, & circa pagos passim præsertim Fischamentæ, & Leytæponti.

4. *VERBASCUM* foliis amplexi caulibus oblongis glabris, pedunculis solitariis. *Hort. Ups. 46.*

Verbascum annuum, foliis oblongis sinuatis obtusis. *Hort. Cliff. 55.*

Blattaria lutea folio oblongo laciniato. *Baub. pin. 240. Hall. Jen. Rupp. 247.*

Blattaria. *Dodon. pempt. 145.*

Habitat in prato Murobacensi, & in pomariis passim circa Leytæpontum alibique in pratis

D A T V R A.

1. *DATVRA* pericarpis spinosis erectis ovatis. *Hort. Ups. 43. Fl. Suec. 185.*

Stramonium fructu spinoso oblongo, flore albo. *Tournef. inst. 119.*

Stramoneum sive datura. *Hall. Jen. Rupp. 38.*

Solanum fætidum, pomo spinoso oblongo, flore albo. *Baub. pin. 164.*

Nucimetellæ congener planta *Datura.* *Cam. in epit. Math. 168.*

Habitat inter hortorum quisquillas, ad urbium pagorumque rejectamenta, & simeta ubique.

2. *DATVRA* pericarpis spinosis nutantibus globosis. *Hort. Ups. 44. Fl. Zeyl. 86.*

Datura Zeylanica violacea. *Herm. Zeyl. 41.*

Stramonium Zeylanicum. *Burm. Zeyl. 221.*

Stramonium pomo spinoso rotundo flore violaceo simplici. *Tournef. inst. 118.*

Solanum pomo spinoso rotundo, flore longo. *Baub. pin. 168.*

Nux metella. *Cam. epit. 175.*

Hummatu. *Rheed. mal. 2. p. 47. t. 28.*

Hospitatur passim in hortis præsertim in horto S. P. de Schwarzenberg Viennæ, æstate in area meridionali, hyeme in caldario, vel frigidariis.

HYOSCYAMVS.

- I. HYOSCYAMVS foliis amplexicaulibus. *Fl. Suec.* 184.

Hyoscyamus vulgaris, vel niger. *Baub. pin.* 169. *Baub. hist.* 3. p. 627. *Dodon. pempt.* 450. *Clus. hist.* 2. p. 83.

Habitat ubique ad pagos, & juxta vias publicas.

NICOTIANA.

- I. NICOTIANA foliis lanceolatis. *Hort. Ups.* 45.

Nicotiana major latifolia. *Baub. pin.* 169.

Nicotiana major sive Tabacum majus. *Baub. hist.* 3. p. 629.

Hyoscyamus peruvianus. *Dodon. pempt.* 452.

Hospitatur sub dio, nunc ab Austria exulare jussi copiose ad ejusdem confinia, statim trans fluvium Leytam, in Hungaria.

2. NICOTIANA foliis ovatis. *Hort. Ups.* 45.

Nicotiana minor. *Baub. pin.* 170.

Petum. Rivini Hall. Jen. Rupp. 24.

Priapeja quibusdam. *Baub. hist.* 3. p. 630.

Hyoscyamus luteus. *Dodon. pempt.* 450.

Dubius Hyoscyamus luteolus solanifolius. *Lobel. icon.* 269.

Pariter ex Austria proscripta cum priore degit.

ATROPA.

- I. ATROPA caule herbaceo, foliis ovatis integris. *Linn. Sp. pl.* 181.

Atropa. *Hort. Ups.* 45.

Belladonna majoribus foliis, & floribus. *Tournef. inst.* 77. *Hall. Jen. Rupp.* 252.

Solanum melano-cerasus. *Baub. pin.* 166.

Solanum majus. *Cam. epit.* 817.

Solanum lethale. *Clus. hist.* 2. p. 86. *Dodon. pempt.* 456.

Habitat in montibus sylvestris inter Salmersdorff & Weidling præsertim in locis opacis montis proximi vineis Weidlingensibus. Sicut etiam circa Burckersdorff & Hiedldorff, ac inter Murobacium & Gablitzam.

PHYSALIS.

- I. PHYSALIS foliis geminis. *Linn. Sp. pl.* 183.

Physalis caule simplici annuo, foliis integerrimis geminatis, floribus solitariis. *Hort. Ups.* 49.

Alkekengi efficiarum. *Tournef. inst.* 151. *Hall. Jen. Rupp.* 50.

Halicacabum. Rivini.

Solanum vesicarium. *Baub. pin.* 166. *Dodon. pempt.* 454.

Solanum halicacabum vulgare. *Baub. hist.* 3. p. 609.

Habitat copiose in Tabor ad dextram in locis opacis, sicut etiam passim ad vinearum margines fruticibus obsitas præsertim ad Vineas Adelsbergenfes Leytæponti.

S O L A N U M .

1. *SOLANUM* caule inermi fruticoso, foliis lanceolatis repandis, umbellis sessilibus. *Linn. Sp. pl.* 184.

Solanum caule inermi fruticoso, foliis ovato-lanceolatis integris, floribus solitariis. *Hort. Ups.* 48.

Solanum fruticosum bacciferum. *Baub. pin.* 166. *Hall. Fl. Jen. Rupp.* 49.

Strychnodendros. Baub. hist. 3. p. 614.

Pseudo-Caplicum. Dodon. pempt. 718.

Hospitatur passim æstate in areis & apricariis hortorum, hyeme in frigidariis, præsertim Viennæ in horto S. P. de Schwarzenberg in Schönbornensi, & Domini Maximiliani in Suburbio dicto Alstergasse, ac Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

2. *SOLANUM* caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. *Fl. Suec.* 189.

Solanum scandens seu dulcamara. *Baub. pin.* 167. *Hall. Jen. Rupp.* 49.

Dulcamara. Dodon. pempt. 402.

Glycipicros, s. amaradulcis. Baub. hist. 2. p. 109.

Habitat passim ad sepes, præsertim inter hortos oleraceos Erdbeerenfes Viennæ, in valle Döblingensi, & in Tabor.

3. *SOLANUM* caule inermi herbaceo, foliis pinnatis incis, racemis simplicibus. *Virid. Cliff* 15. *Hort. Cliff.* 60.

Solanum pomiferum, fructu rotundo striato molli. *Baub. pin.* 167.

Lycopersicon majus flore multifido. *Hall. Jen. Rupp.* 50.

Lycopersicon Galeni. *Anguill.* 217. *Tournef. inst.* 150.

Mala aurea odore fætido, quibusdam *Lycopersicon. Baub. hist.* 3. p. 620.

Aurea mala. *Dodon. pempt. 458.*

Poma amoris. *Cam. epit. 821.*

β Lycopersicon minus flore quinquefido. *Hall. Jen. Rupp. 50.*

Lycopersicon fructu rubro non striato. *Tournef. inst. 150.*

γ Lycopersicon fructu cerasi rubro. *Tournef. inst. 150.*

Solanum racemosum cerasorum forma. *Baub. pin. 167.*

Baub. hist. 3. p. 623.

Hospitatur passim in hortis sub dio præsertim Viennæ, & Leytæponti.

4. SOLANVM caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, umbellis nutantibus. *Linn. Sp. pl. 186.*

Solanum caule inermi herbaceo, foliis ovatis angulatis. *Hort. Ups. 48. Fl. Suec. 188.*

Solanum officinarum acinis nigricantibus. *Baub. pin. 166.*

Tournef. inst. 148. Hall. Jen. Rupp. 48.

Solanum hortense. *Dodon. pempt. 454.*

Habitat Viennæ supra Suburbium dictum Razenstadi ad molam, circa Erdbeer, in Tabor ad domos passim Leytæponti etiam intra Civitatem, alibique inter hortorum quisquilias.

5. SOLANVM caule inermi herbaceo, foliis ovatis tomentosis integris, calycibus spinosis. *Linn. Sp. pl. 186.*

Solanum calycibus aculeatis, foliis ovatis integerrimis tomentosis. *Hort. Ups. 49. Fl. Zeyl. 93.*

Solanum pomiferum, fructu oblongo. *Baub. pin. 167.*

Melongena fructu oblongo. *Tournef. inst. 151.*

Mala insana. *Dodon. pempt. 458.*

Hospitatur passim in hortis sub dio præsertim Viennæ, & Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

6. SOLANVM caule aculeis recurvis, foliis sinuatis subtus tomentosis utrinque aculeatis, pedunculis aculeatis. *Fl. Zeyl. 95. Hort. Ups. 49.*

Solanum caule aculeato fruticoso, foliis oblongis pinato laciniatis, spinis supinis erectis, pronis recurvis. *Hort. Cliff. 61. Virid. Cliff. 15.*

Solanum pomiferum frutescens africanum spinosum nigricans, borraginis flore, foliis profunde laciniatis. *Herm. Lugdb. 573. t. 575.*

Hospitatur in horto Leytæpontano Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach æstate vel sub dio, vel in ollis

in apricario, hyeme vel in frigidario, vel Caldario, ad nutum hortulani.

C A P S I C V M.

- I. CAPSICVM caule herbaceo. *Linn. Sp. pl. 188. Roy. Lugdb. 426.*

Capficum annuum. Hort. Ups. 47. Fl. Zeyl. 92.

Piper indicum vulgatissimum. Baub. pin. 132.

Hospitatur passim in hortis præsertim Leytæponti.

R H A M N V S.

- I. RHAMNVS spicis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis. *Fl. Suec. 193.*

Rhamnus catharticus. Baub. pin. 478.

Rhamnus solutivus. Dodon. pempt. 756.

Spina cervina. Dill. gen. 145. t. 8.

Cervi spina. Rivini, & Cordi. Hall. Jen. Rupp. 94.

Habitat in vallis Döblingensis sepibus, in montibus Badensibus, in insulis Fischamentensibus, alibique in sylvis passim.

2. RHAMNVS inermis, floribus dioicis, foliis duplicato-crenatis. *Linn. Sp. pl. 193.*

Frangula ora folii serrata. Hall. Helv. 164.

Frangula rugosiore, & ampliore folio. Tournef. inst. 612.

Alnus nigra baccifera, rugosiore folio s. major. Baub. hist. 1. p. 562.

Alnus nigra polycarpus. Baub. pin. 429.

Habitat in montibus Badensibus, & in valle Breinina.

3. RHAMNVS inermis floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. *Linn. Sp. pl. 193. Fl. Suec. 194.*

Rhamnus inermis foliis annuis. Fl. Lapp. 60.

Frangula. Dodon. pempt. 734. Tournef. inst. 612.

Alnus nigra baccifera. Baub. pin. 428.

Habitat in valle Döblingensi, in Insulis Fischamentensibus præsertim in Geimanniana. circa Dornbach & Leytæpontum, alibique in fruticetis.

4. RHAMNVS inermis, floribus dioicis, stigmate triplici. *Hort. Ups. 47.*

Rhamnus inermis, floribus polygamis, stigmate triplici, foliis ferratis. Hort. Cliff. 70.

Phylica elatior. Baub. pin. 477.

Phylica humilior. Baub. pin. 477.

Alaternus. *Clus. hist. 1. p. 50.*

Hospitatur sub dio in horto Schönbornnensi retro PP. Trinitarios Viennæ.

5. RHAMNUS aculeis geminatis: inferiore reflexo, floribus trigynis. *Hort. Ups. 47.*

Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso. *Baub. pin. 477.*

Paliurus. *Dodon. pempt. 576.*

Hospitatur in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach Leytæponti, æstate sub dio, hyeme in frigidario; semine ex Italia allato ab erudito, & indefesso ejus hortulano Domino Mohr cultus.

5. RHAMNUS aculeis geminatis rectis, floribus digynis, foliis ovato oblongis. *Hort. Cliff. 69.*

Jujuba sylvestris. *Baub. pin. 446.*

Zizyphus. *Dodon. pempt. 307.*

Hospitabatur olim in horti Favoritæ Videntis area meridionali æstate, hyeme in frigidario ejusdem, nunc abeunte Domino Zinner quorsum pervenerit ignoro.

EVONYMUS.

1. EVONYMUS floribus plerisque quadrifidis. *Linn. Sp. pl. 197.*

Evonymus foliis oblongo-ovatis. *Fl. Suec. 133.*

Evonymus vulgaris, granis rubentibus. *Baub. pin. 438. Hall. Jen. Rupp. 93.*

Evonymus. *Dodon. pempt. 783.*

Evonymus 2. *Clus. hist. 1. p. 57.*

Evonymus multis aliis Tetragonia. *Baub. hist. 1. p. 201.*

Habit in sepibus, fruticetis, & sylvis passim, præsertim in valle Döblingensi, & circa Fischamentam, ac Leytæpontum.

RIBES.

RIBES inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. *Linn. Sp. pl. 200.*

Ribes inerme, floribus planiusculis, racemis pendulis. *Fl. Suec. 197. Hort. Ups. 59.*

Ribes vulgare acidum. *Baub. hist. 2. p. 97. Fl. Lapp. 68.*

Grossularia multiplici acino, s. non spinosa hortensis rubra. *Baub. pin. 455.*

β *Grossularia hortensis*, fructu margaritis simili. *Baub. pin.* 455.

Hospitari, an habitare dicam hæreo; cum ubique in hortis etiam rusticorum occurrat integras subinde sepes constituens.

2. *RIBES* inerme, racemis pilosis, floribus oblongis. *Linn. Sp. pl.* 201.

Ribes inerme, floribus oblongis. *Hort. Ups.* 51. *Fl. Suec.* 196.

Ribes vulgaris fructu nigro. *Fl. Lapp.* 99.

Grossularia non spinosa, fructu nigro. *Baub. pin.* 455.

Hospitatur sub dio in hortis PP. Carthusianorum Murobaccii, sicut etiam in hortulo Botanico Fratris Honorii apud FF. Misericordiæ in Suburbio Leopoldino Viennæ.

3. *RIBES* racemis aculeatis, baccis glabris, petioli bractea monophylla. *Linn. Sp. pl.* 201.

Ribes ramis aculeatis erectis, fructu glabro. *Fl. Suec.* 195.

Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris. *Baub. pin.* 455. *Hall. Jen. Rupp.* 53.

Uva crispa f. *Grossularia*. *Baub. hist.* 1. p. 47.

Habitat in fruticetis in valle Bruhl ultra Ecclesiam sive in medio vallis ante lapidicinas calcaveas ad viam sitis: passimque in hortis.

H E D E R A.

1. *HEDERA* foliis ovatis lobatisque. *Fl. Lapp.* 9. *Fl. Suec.* 190.

Hedera arborea. *Baub. pin.* 305. *Hall. Fl. Jen. Rupp.* 158.

Hedera. *Dodon. pempt.* 413.

Habitat ad muros & arbores passim præsertim Leytæponti in borto PP. Capucinatorum.

V I T I S.

1. *VITIS* foliis lobatis sinuatis nudis. *Linn. Sp. plant.* 202.

Vitis foliis palmato - angulatis. *Hort. Ups.* 50.

Vitis vinifera. *Baub. pin.* 299. *Dodon. pempt.* 415.

Habitat in Insularum Danubialium nemoribus passim.

Hospitatur vero ubique in vineis.

2. *VITIS* foliis quinatis: foliolis multifidis. *Hort. Cliff.* 74.

Vitis laciniatis foliis. *Cornut.* 183. *Hall. Fl. Jen. Rupp.*

137.

Vitis folio Apii. *Baub. hist.* 2. p. 73.

Hospitatur in hortis passim, varius in vineis.

CELOSIA.

- CELOSIA foliis oblongo-ovatis, pedunculis teretibus substriatis, spica oblonga. *Linn. Sp. pl.* 205.
 Celosia foliis lanceolato-ovatis. *Hort. Ups.* 52.
 Amaranthus paniculi incurva. *Baub. pin.* 121.
 β Amaranthus cristatus. *Cam. epit.* 702.
 Hospitatur passim in hortis sub dio.

THESIVM.

- THESIVM panicula foliata, foliis linearibus. *Linn. Sp. pl.* 207.
 Thesium. *Hort. Cliff.* 41. *Hall. helv.* 183.
 Linosyris Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 2.
 Linaria montana flosculis albicantibus. *Baub. pin.* 213.
 Linariæ similis. *Baub. hist.* 3. p. 461.
 Anonymos lini folio. *Clus. hist.* 1. p. 324.
 Alchimilla linariæ folio calice florum albo. *Tournef. hist. paris. heb. II.* p. 90. *inst.* 509.
 Habitat ultra Dornbach ad viam quæ ducit Neustift, in acclivitate montis Hamburgensis, qua Altenburg spectat, & inter Salmersdorff, ac Weidling.

VINCA.

- VINCA caulibus procumbentibus foliis lanceolato-ovatis. *Linn. Sp. pl.* 209.
 Vinca foliis ovatis. *Hort. Ups.* 53.
 Vinca Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 27.
 Pervinca, vulgaris, angustifolia, flore cæruleo. *Tournef. inst.* 120. *Boerhaav. Lugdb.* 1. p. 311.
 Clematis daphnoides minor, flore cæruleo. *Baub. pin.* 301.
 Clematis daphnoides minor, flore cæruleo simplici. *Baub. hist.* 2. p. 130.
 Habitat ad sepes, in dumetis, & nemoribus passim; ad pedem montis in valle Döblingensi supra pontem, in sylva ad hortum oleraceum Leytæpontanum Excellentissimi Comitum Ernesti ab Harrach sita: circa Petersdorff, alibique.

NERIVM.

- NERIVM foliis lineari-lanceolatis ternis. *Hort. Ups.* 53.
 Nerium floribus rubescentibus. *Baub. pin.* 464.

Rhododendrum. Dodon. pempt. 851.

Oleander, laurus rosea. Lob. icon. 118.

Hospitatur ubique in hortis æstate sub dio, hyeme in frigidariis.

DIGYNIA.

PERIPLOCA.

I. *PERIPLOCA* floribus interne hirsutis. *Linn. Sp. pl. 211.*

Periploca foliis lanceolato-ovatis. *Hort. Cliff. 78.*

Periploca folio oblongo. *Baub. pin. 303.*

Apocynum secundum angustifolium. *Clus. hist. 1. p. 125.*

Hospitatur sub dio in hortulo botanico Fratris Honorii apud FF. Misericordiæ in Suburbio Leopoldino Viennæ.

APOCYNVM.

I. *APOCYNVM* caule rectiusculo herbaceo, foliis ovato-lanceolatis. *Linn. Sp. pl. 213.*

Apocynum foliis ovato-lanceolatis. *Hort. Cliff. 80.*

Apocynum maritimum, venetum, erectum, flore purpureo. *Boerhaav. Lugdb. 1. p. 314.*

Apocynum, maritimum, venetum, salicis folio, flore purpureo. *Tournef. inst. 92.*

Vincecoxium maritimum, salicis folio, flore albo. *Tournef. Hall. Jen. Rupp. 26.*

Tithymalus maritimus, purpurascens floribus. *Baub. pin. 291.*

Alypum quibusdam, sive esula rara, flore purpureo. *Baub. hist. 3. p. 676.*

Esula rara, e Lio venetorum insula. *Lob. icon. 372. hist. 201.*

Hospitatur in hortis nobilium hinc inde, præsertim Viennæ æstate in apricario, hyeme in frigidario horti S. P. de Schwarzenberg.

ASCLEPIAS.

I. *ASCLEPIAS* foliis ovatis basi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis. *Linn. Sp. pl. 217.*

Asclepias caule erecto simplicissimo herbaceo, foliis cordato-lanceolatis, racemis conglomeratis alternis. *Fl. Suec. 200.*

Ascle-

Asclepias caule erecto annuo, foliis ovato-lanceolatis, floribus confertis. *Hort. Cliff.* 78.

Asclepias albo flore. *Baub. pin.* 303.

Asclepias sive *Vincetoxicum* multis, floribus albicantibus. *Baub. hist.* 2. p. 138.

Vincetoxicum. *Dodon. pempt.* 407. *Hall. Jen. Rupp.* 25.

Hirundinaria officinarum.

Habitat in montosis asperis & juxta sepes passim, præsertim in monticulo regio Fischamentensi, circa Dornbach, Salmersdorff, & Murobacium, nec non circa Arcem Dürrenstein infra alpes antequam Buchbergam perveniatur.

STAPELIA.

STAPELIA denticulis ramorum patentibus. *Vir. Cliff.* 20.

Stapelia denticulis ramorum extrorsum prominulis. *Hort. Ups.* 53.

Apocynum humile aizoides, siliquis erectis, africanum. *Herm. Lugdb.* 52. t. 53.

Fritilaria crassa capitis bonæ spei. *Stapalii in not. ad Theophr.* 335.

Crassa Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 25.

Hospitatur in hortis Nobilium hinc inde, præsertim in caldario Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach Leytæponti, a supra laudato suo hortulano Domino Mohr culta omni anno florens, ast semina nunquam perficiens.

HERNIARIA.

HERNIARIA glabra. *Baub. hist.* 3. p. 378. *Linn. Sp. pl.* 212. *Hall. Jen. Rupp.* 340.

Herniaria calycibus bractea nudis. *Fl. Suec.* 207.

Herniaria. *Dodon. pempt.* 114.

Polygonum minus s. *Millegrana* major. *Baub. pin.* 281.

Habitat in apricis arenosis insularum danubialium præcipue in Brader, ast varius.

Hospitatur autem copiose, & sub dio in hortulo botanico Fratris Honorii apud FFr. Misericordiæ Viennæ.

Annotatio. Postquam hæc scripseram amicus & Collega meus D. Mifsley me certiozem reddidit se eandem copiose invenisse in litoribus torrentis Wien vulgo dicti.

CHENOPODIUM.

1. **CHENOPodium** foliis triangulari-sagittatis integerrimis
Fl. Suec. 208.
Chenopodium folio triangulo. Tournef. inst. 506. Hall.
Jen. Rupp. 338.
Blitum perenne Bonus Henricus dictum. Moris. hist. 2.
p. 599. s. 5. t. 30. f. 1.
Bonus Henricus. Trag. hist. 317. Baub. hist. 2. p. 965.
Lapathum unctuosum folio triangulo. Baub. pin. 115.
Tota bona. Dodon. pempt. 651.
Habitat ubique in ruderatis, & ad pagos.
2. **CHENOPodium** foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subnudis caule brevioribus. *Fl. Suec. 210.*
Chenopodium erectum, foliis subtriangularibus antice sinuato-dentatis, racemis erectis foliosis lateralibus. Hort. Cliff. 85.
Chenopodium sylvestre alterum coma purpurascens. Vail. Paris. 35.
Chenopodium Pes anserinus I. Tabern. icon. 427. Hall.
Jen. Rupp. 337.
Atriplex sylvestris latifolia. Baub. pin. 119.
Atriplex dicta Pes anserinus. Baub. hist. 2. p. 975.
Pes anserinus. Dalech. hist. 542. t. 542.
Habitat in cultis. & ruderatis passim, præsertim Leytæponti circa hortum Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.
3. **CHENOPodium** foliis rhomboideo-triangularibus erosissimis postice integris, summis oblongis, racemis erectis. *Fl. Suec. 212.*
Chenopodium foliis inferioribus ovatis acutis antrorsum dentatis: summis lanceolatis. Vivid. Cliff. 22.
Hort. Cliff. 85.
Chenopodium folio sinuato, candicante. Tournef. inst. 536. Hall. Jen. Rupp. 338.
Atriplex sylvestris, folio sinuato candicante. Baub. pin. 119.
Atriplex sylvestris. Baub. hist. 2. p. 972. Tabern. icon. 426.
Habitat ubique in fimetis & ruderatis, inter olera, & in agris inter segetes, præsertim circa Leytæpontum, in vallo Suburbico Viennensi inter Hernals & Lichtenthal, ac circa Döbling & Waring.

CHENOPODIUM foliis rhomboideis dentato-sinuatis, racemis ramosis subnudis. *Fl. Suec.* 213.

Chenopodium sylvestre opuli folio. *Vail. paris.* 36. t. 7. f. 1.

Chenopodium folio oblongo integro. *Dill. Giss.* 154.

Chenopodium folio subtus farinoso rhomboideo, multis, & minoribus dentibus serrato. *Hall. herb.* 175.

Habitat ubique in cultis, oleraceis, inter hortorum quisquiliis, in agris, fimetis, plateis, & ruderalis.

CHENOPODIUM foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramosis nudis. *Fl. Suec.* 214. *Linn. Sp. pl.* 219.

Chenopodium stramonii folio. *Vail. Paris.* 36. t. 7. f. 2.

Chenopodium Pes anserinus II. *Tabern. icon.* 428. *Hall. Jen. Rupp.* 337.

Chenopodio adfinis, folio lato laciniato in longissimum mucronem procurrente, florum racemis sparsis.

Raj. app. 123.

Atriplex Chenopodia daturæ folio. *Magn. hort.* 29.

Atriplex sylvestris latifolia, acutiore folio. *Baub. pin.* 119.

Atriplex dictus Pes anserinus alter, sive ramosior.

Baub. hist. 2. p. 976.

Habitat in cultis, oleraceis, & ruderalis passim, præcipue circa Leytæpontum, ad fimeta inter domos hortosque Erdbeerensens Viennæ; ac inter quisquiliis horti S. P. de Schwarzenberg Viennæ versus Septentrionem rejectas.

CHENOPODIUM foliis oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis. *Hort. Ups.* 55.

Chenopodium suaveolens, foliis quernis. *Hall. Jen. Rupp.* 339.

Chenopodium ambrosioides folio sinuato. *Tournef. inst.* 506.

Botrys ambrosioides vulgaris. *Baub. pin.* 138.

Botrys. *Dodon. pempt.* 34.

Habitat copiose in ripa arenosa torrentis Viennensis versus Hiezing.

CHENOPODIUM foliis lanceolatis dentatis, racemis foliatis simplicibus. *Hort. Ups.* 56.

Chenopodium suaveolens foliis longioribus Mexicanum. *Hall. Jen. Rupp.* 339.

Chenopodium ambrosioides Mexicanum. *Tournef. inst.* 506.

Botrys ambrosioides Mexicana. *Baub. pin.* 138. & app. 516. Botrys

Botrys odorata suaveolens americana, Mexicana. Mo. hist. 2. p. 605. s. 5. t. 35. f. 8.

Hospitatur passim in hortis sub dio, præsertim Viennæ in horti domus Lambrechtianæ in via regia olim culta, nunc Sperte provenit.

8. *CHENOPODIUM* foliis ovato oblongis repandis, racem nudis simplicibus glomeratis *Fl. Suec. 215*

Chenopodium foliis ovato-oblongis repande sinuatis florum racemis glomeratis ex ala solitariis. Hort. Cliff. 85.

Chenopodium angustifolium laciniatum minus. Tournes. inst. 506. Vaill. Paris. 35. Hall. Jen. Rupp. 338.

Atriplex angustifolia laciniata minor. Baub. hist. 2. 970.

Habitat passim juxta domos, in ruderatis, & ad fimeta præsertim in Erdbeer Suburbio Viennensi.

9. *CHENOPODIUM* foliis integerrimis rhombico-ovatis, floribus conglomeratis. *Fl. Suec. 216.*

Chenopodium foliis triangulari-ovatis. Hort. Cliff. 84.

Chenopodium foetidum. Tournes. inst. 506.

Atriplex foetida. Baub. pin. 119.

Blitum foetidum vulvaria dictum. Raj. Syn. 3. p. 150.

Vulvaria. Tabern. icon. 428. Dalech. hist. 543.

Connina. Cæsalp. Syst. 161.

Garosmus. Dodon. pempt. 616.

Habitat ubique in cultis oleraceis, præsertim circa Viennam, & Leytæpontum. Ad omnes fere domos Minckendorffenses ad dextram viæ regię sitas nec non ad viam regiam Nussdorffensem ad sinistram statim infra furnum lateritium.

10. *CHENOPODIUM* foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, cymis dichotomis. *Linn. Sp. pl. 220.*

Chenopodium foliis ovatis integerrimis, caule decumbente. Fl. Suec. 217.

Chenopodium betæ folio. Tournes. inst. 506. Hall. Jen. Rupp. 339.

Blitum foliis ovatis. Hort. Cliff. 28.

Blitum polyspermum a seminis copia. Baub. pin. 118.

Blitum erectius sive III. Tragi. Baub. hist. 2. p. 967.

Blitum sylvestre. Cam. epit. 137.

Polysporon cassiani, basii, anguillaræ. Lob. hist. 128.

Habitat in cultis oleraceis passim, præsertim in horto Leytæpontano Excellentissimi Comitissæ Ernesti ab Harrach, & in horto FF. Misericordiæ in Suburbio Viennensi Leopoldino.

I. CHENOPODIUM foliis lineari-lanceolatis planis integerrimis. *Hort. Cliff.* 86. *Hort. Ups.* 55.

Chenopodium lini folio villoso. *Tournef. Scoparia Rivini.* *Hall. Jen. Rupp.* 339.

Linaria Scoparia. *Bauh. pin.* 212.

Linaria belvedere dicta. *Bauh. hist.* 3. p. 462.

Osyris. *Dodon. pempt.* 101.

Herba studiosorum. *Tabern. hist.* 2. p. 102.

Habitat nunc passim in hortis Viennensibus olim culta.

B E T A.

I. BETA. *Linn. Sp. pl.* 222. *Hort. Cliff.* 83. *Hort. Ups.* 56. *Mat. med.* 113.

α Beta rubra vulgaris. *Bauh. pin.* 118. *Bauh. hist.* 2. p. 961. *Dodon. pempt.* 620.

β Beta rubra radice Rapæ. *Bauh. pin.* 118.

Beta radice rubra crassa. *Bauh. hist.* 2. p. 961.

Beta rubra romana. *Dodon. pempt.* 620.

γ Beta alba vel pallescens, quæ Cicla officinarum, *Bauh. pin.* 118.

Beta candida. *Bauh. hist.* 2. p. 961. *Dodon. pempt.* 260.

δ Beta pallide virens major. *Bauh. pin.* 118.

Hospitatur sub dio passim in hortis oleraceis, præsertim in Erdbeerensibus, Simmeringensibus, & Leytæpontanis.

S A L S O L A.

I. SALSOLA herbacea, foliis subulatis mucronatis, calycibus ovatis axillaribus. *Linn. Sp. pl.* 222.

Salsola foliis pungentibus. *Fl. Suec.* 206.

Kali spinosum cochleatum. *Bauh. pin.* 289.

Kali spinoso affinis. *Bauh. pin.* 289. *Moris. hist.* 2. s. 5. t. 23. f. 11.

Habitat in Brader ad ripam danubii; circa Nosocomium ad St. Marcum dictum Viennæ. Et cum Plantagine Psyllium dicta supra lapidicinam Weinhausensem in cujus lapidibus varia petrefacta marina reperiuntur, evidente signo mare semel ibidem fuisse.

V L M V S.

VLMVS foliis duplicato-ferratis, basi inæqualibus. *Linn. Sp. pl.* 225.

E

Ulmus

Ulmus fructu membranaceo. Hort. Cliff. 83. Fl. Suec. 219.
Ulmus campestris, & theophrasti. Baub. pin. 426. Hall.
Jen. Rupp. 330.

Ulmus vulgaris cum seminibus suis. Park. theatr. 1404.

Ulmus. Dodon. pempt. 837.

Habitat passim in sylvis & ad pagos, ac in hortorum ambula-
cris præsertim circa Viennam & Leytapontum.

G E N T I A N A.

1. *GENTIANA* corollis quinquefidis campaniformibus verti-
 cillatis, calycibus subspathaceis. *Linn. Sp. pl. 227.*

Gentiana corollis campaniformibus verticillatis, foliis
 imis petiolatis ellipticis. *Hall. helv. 479.*

Gentiana major purpurea. *Baub. pin. 187.*

Gentiana major alia. *Cam. epit. 416.*

Gentiana major purpureo flore l. *Clus. hist. 1. p. 312.*

Habitat copiose in alpe Breinina, & Wexel.

2. *GENTIANA* corollis quinquefidis campanulatis oppositis
 sessilibus, foliis amplexicaulibus. *Linn. Sp. pl. 227.*

Gentiana foliis ovato-lanceolatis, floribus campanu-
 latis in alis sessilibus. *Hall. helv. 478.*

Gentiana floribus lateralibus solitariis sessilibus, corollis
 erectis. *Hort. Cliff. 80.*

Gentiana asclepiadis folio. *Baub. pin. 187.*

Habitat ad pedes alpium passim, præsertim in vallibus opacis
Breininis, & montis Schneeberg, circa Rosenaviam, &
Burckersdorff, nec non in monticulo regio inter Fischamen-
tam & Enzersdorff sito.

3. *GENTIANA* corollis quinquefidis campanulatis oppositis
 pedunculatis, foliis linearibus. *Linn. Sp. pl. 228.*

Gentiana floribus terminalibus raris, corollis erectis
 plicatis, foliis linearibus. *Fl. Suec. 202.*

Gentiana angustifolia autumnalis major. *Baub. pin. 188.*

Gentiana palustris angustifolia. *Baub. pin. 188.*

Gentianæ species, calathiana quibusdam, radice perpe-
 tua, sive palustris. *Baub. hist. 3. p. 524.*

Gentiana IV. species. *Clus. hist. 1. p. 313.*

Pneumonanthe. Tabern. icon. 787.

Campanula autumnalis. *Dodon. pempt. 168.*

Calathiana viola. *Dalech. hist. 824.*

Habitat in pratis humidioribus circa Murobacium, Ebreichs-
dorff, & Baden.

4. GENTIANA corolla quinquefida campanulata caulem excedente. *Linn. Sp. pl.* 228.

Gentiana corolla campanulata caulem longitudine excedente. *Hort. Cliff.* 81. *Hall. belv.* 477.

Gentiana alpina latifolia, magno flore. *Baub. pin.* 187. *prodr.* 97.

Gentiana V. Gentianella major verna. *Clus. hist.* 1. p. 314.

Habitat in alpe Breinina, Schneeberg, & Etscher aliisque continua serie productis.

5. GENTIANA corolla quinquefida infundibuliformi caulem excedente, foliis radicalibus, confertis majoribus. *Linn. Sp. pl.* 228.

Gentiana flore unico tubuloso, foliis ad terram congestis acutis. *Hall. belv.* 476.

Gentiana alpina verna major. *Baub. pin.* 188.

Gentiana VI. Gentianella minor verna. *Clus. hist.* 1. p. 315.

Habitat in celsissimis alpium jugis præsertim in Schneeberg, Etscher, & Durrenstein.

GENTIANA corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo. *Linn. Sp. pl.* 229.

Gentiana foliis lineari-lanceolatis, caule dichotomo, corollis infundibuliformibus quinquefidis. *Fl. Suec.* 205.

Centaurium minus. *Baub. pin.* 278. *Dodon. pempt.* 336.

Habitat passim in sylvis, & pratis, præsertim in insulis danubialibus Brader, & Fischamentenlibus.

GENTIANA corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis. *Linn. Sp. pl.* 230.

Gentiana corollis hypocrateriformibus fauce barbatis. *Fl. Suec.* 203.

Gentiana prætensis flore lanuginoso. *Baub. pin.* 188.

Gentiana autumnalis ramosa. *Baub. pin.* 188.

Habitat in pratis circa Monasterium Neobergenſe, & in pratis Leytæpontum lapidicinam Cæſateam & Königshofen inter ſitis.

GENTIANA corollis quadrifidis margine ciliatis. *Linn. Sp. pl.* 231.

Gentiana corollis hypocrateriformibus laciniis margine barbatis. *Hort. Cliff.* 81.

Gentiana angustifolia autumnalis minor, floribus ad latera pilosis. *Baub. pin.* 188.

Gentianella cœrulea oris pilosis. Baub. pin. 188.

Gentianella cœrulea fimbriata angustifolia autumnalis.

Column. ecphr. 1. p. 222. t. 221. f. 1.

Habitat copiose in montibus circa Scotto - Viennam, præsertim in monte Semering Austriam a Styria dividente.

9. *GENTIANA* corollis quadrifidis imberbibus verticillatis sessilibus. *Linn. Sp. pl. 231.*

Gentiana floribus confertis terminalibus, corollis quadrifidis imberbibus interjecto denticulo. Hort. Cliff.

81.

Gentiana cruciata. Baub. pin. 188. Clus. hist. 1. p. 313.

Gentiana minor. Cam. epit. 417.

Cruciata five Gentiana minor. Dodon. pempt. 343.

Habitat in montibus circa Hiedldorff, Burckersdorff, Dornbach, aliisque continuam seriem constituentibus.

10. *GENTIANA* corollis octofidis, foliis perfoliatis. *Linn. Sp. pl. 232.*

Gentiana caule dichotomo foliis connatis, corollis octifidis. Hort. Cliff. 81.

Centaureum luteum perfoliatum. Baub. pin. 278. Moris. hist. 2. p. 565. s. 5. t. 26. f. 1. 2.

Centaureum parvum flavo flore. Clus. hist. 2. p. 180.

Habitat ad dextram pagi Simmering in locis gramineis.

ERYNGIUM.

1. *ERYNGIUM* foliis radicalibus ovalibus planis, capitulis pedunculatis. *Hort. Ups. 57.*

Erygium latifolium planum. Baub. pin. 386. Hall. Jen. Rupp. 275.

Eryngium planum, latifolium capitulo rotundo parvo. Baub. hist. 3. p. 88.

Eryngium pannonicum latifolium. Clus. hist. 2. p. 153.

Habitat passim in pratis ad Danubium sitis supra & infra Viennam, præsertim in Ebersdorffensibus.

2. *ERYNGIUM* foliis radicalibus pinnatis tripartitis. *Hort. Cliff. 87.*

Eryngium vulgare. Baub. pin. 386. Baub. hist. 3. p. 85. Hall. Jen. Rupp. 275.

Eryngium campestre vulgare. Clus. hist. 2. p. 157. Dod. pempt. 730.

Habitat ubique in campestribus sterilibus, pascuis siccis, & juxta vias.

S A N I C U L A.

1. *SANICULA* foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. *Fl. Suec.* 222.

Sanicula flosculis omnibus sessilibus. *Gron. Virg.* 147.

Sanicula. *Hort. Cliff.* 88. *Dodon. pempt.* 140.

Sanicula officinarum. *Baub. pin.* 319.

Sanicula mas Fuchsi f. *Diapensia.* *Baub. hist.* 3. p. 639.

Diapensia. *Cap. epit.* 763.

Habitat passim in sylvis montosis, præsertim circa Dornbach, Murobacium, Latifontum, Aland, & Heiligencreutz.

A S T R A N T I A.

1. *ASTRANTIA* foliis quinquelobis: lobis trifidis. *Linn. Sp. pl.* 235. *Hall. belv.* 439.

Astrantia. *Hort. Cliff.* 88.

Helleborus niger, *saniculæ folio.* *Baub. pin.* 186.

Veratrum nigrum Dioscoridis. *Dodon. pempt.* 387.

Sanicula fœmina quibusdam, aliis *Helleborus niger.* *Baub. hist.* 3. p. 136.

Habitat in sylvis montosis circa Dornbach, Salmersdorff, Murobacium, & Neapolim Austriæ, nec non in ipso secundo jugo montis s. alpis Schneeberg.

B V P L E V R V M.

1. *BUPLEVRUM* involucris universalibus nullis, foliis perfoliatis. *Hort. Ups.* 64.

Bupleurum foliis ovatis perfoliatis. *Hall. belv.* 347.

Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum. *Tournef. inst.* 310.

Perfoliata vulgatissima arvensis. *Baub. pin.* 277.

Perfoliata Rivini & officinarum. *Hall. Jen. Rupp.* 281.

Perfoliata. *Dodon. pempt.* 104.

Habitat inter segetes passim, & in vallo Suburbico Viennensi, inter Hernals & Lichtenthal.

2. *BUPLEVRUM* caule dichotomo subnudo: involucris minimis acutis. *Linn. Sp. pl.* 238.

Bupleurum foliis lanceolatis rigidis: radicalibus obtusis, caulinis acutis. *Roy. Lugdb.* 110.

Bupleurum folio rigido. *Baub. pin.* 278.

Bupleurum alterum latifolium. Dodon. pempt. 833.

Habitat in Eselsberg infra vineas supra Nusdorff sitas, alibique ad vias & sæpes passim.

3. *BUPLEVRVM* umbellis simplicibus alternis pentaphyllis subtrifloris. *Linn. Sp. pl. 239.*

Bupleurum foliis linearibus acutis sessilibus. Hort. Cliff. 104. Roy. Ludgb. 110.

Bupleurum tertium minimum. Moris. hist. 3. p. 300. s. 9. t. 14. f. 4.

Bupleurum angustissimo folio. Baub. pin. 278.

Habitat inter vallem Döblingensem ac Danubium, alibique ad vias publicas, & pratorum margines, in locisque tenui gramine obstitis passim.

T O R D Y L I V M,

1. *TORDYLIVM* umbella conferta nudiuscula, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis inciso-ferratis. *Linn. Sp. pl. 240.*

Caucalis umbella universali trifida: partialibus pentaspermis, foliis pinnatis ferratis. Hort. Cliff. 91.

Caucalis arvensis echinata latifolia. Baub. pin. 152.

Lappula canaria latifolia, f. caucalis. Baub. hist. 3. part. 2. p. 80.

Echinophora semine magno. Rivini. Hall. Jen. Rupp. 277.

Habitat in vallo Suburbico Viennensi ad hortum olim S. P. Eugenii, alibique in agris & arvis præsertim circa Leytæpontum.

C A V C A L I S.

1. *CAVCALIS* involucris singulis pentaphyllis: foliolo unico duplo majore. *Hort. Cliff. 91.*

Caucalis involucreo universali pinnatifido, partialibus indivisis, umbella multifida. Fl. Suec. 225.

Caucalis arvensis echinata magno flore. Baub. pin. 152.

Caucalis. Dodon. pempt. 700.

Echinophora flore magno Rivini. Hall. Jen. Rupp. 277.

Lappula canaria flore pulchro magno. Baub. hist. 3. part. 2. p. 70. quoad textum non quoad figuram.

Habitat in agris, arvisque passim, nec non in vallo Suburbico Viennensi retro hortum olim S. P. Eugenii.

2. CAUCALIS seminum aculeis triglochidibus uncinatis pilis verticillatis hispidis. *Linn. Sp. pl.* 242.
 Caulis arvensis echinata, parvo flore, & fructu. *Baub. pin.* 152.
 Caulis tenuifolia, flosculis subrubentibus. *Raj. hist. p.* 467.
 Caulis tenuifolia purpurea. *Park.* 920.
 Echinophora Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 278.
 Echinophora tertia Leptophyllum purpurea. *Column. ecphr.* 1. p. 96. t. 97.
 Lappula canaria, flore minore, sive tenuifolia. *Baub. hist.* 3. part. 1. p. 80. figura erronee ad priorem transposita est.
 Habitat in monte Cecio seu Kalenberg.

D A V C V S.

1. DAUCUS seminibus hispidis. *Hort. Ups.* 59. *Fl. Succ.* 223.
 Daucus vulgaris. *Clus. hist.* 2. p. 198.
 Pastinaca tenuifolia sylvestris dioscoridis, vel Daucus officinarum. *Baub. pin.* 151.
 Pastinaca sylvestris s. Staphylinus Græcorum. *Baub. hist.* 3. part. 2. p. 62.
 Staphylinus Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 272.
 β Daucus sativus radice lutea, aurantii coloris, & alba. *Tournef. inst.* 307.
 Staphylinus sativus Rivini, & Græcorum. *Hall. Jen. Rupp.* 278.
 Pastinaca sativa sive Carota lutea. *Baub. hist.* 3. part. 2. p. 64.
 Habitat ubique in campestribus, & ad sēpes. β in hortis oleaceis & agris passim.

A M M I.

1. AMMI foliis inferioribus pinnatis lanceolatis serratis; superioribus multifidis linearibus. *Hort. Ups.* 59.
 Ammi laciniis foliorum caulis lanceolatis. *Hort. Cliff.* 89.
 Ammi majus. *Baub. pin.* 159.
 Ammi vulgare. *Dodon. pempt.* 301.
 Habitat inter vineas Badenses, & ibi vicinas Sostenses, sicut etiam ultra Waring in vallo tempore assedii Viennensis a Turcis facta.

CONIVM.

- I. *CONIVM* seminibus striatis. *Hort. Ups.* 92. *Fl. Suec.* 226.
Cicuta major. *Baub. pin.* 160. *Tournef. inst.* 306.
Cicuta. *Dodon. pempt.* 461. *Rivini Hall. Jen. Rupp.* 284.
Cicutaria major vulgaris. *Clus. hist.* 2. p. 200.

Habitat passim in agris, hortis oleraceis, vineis, ruderatis, ac dumetis circa Viennam & Leytæpontum, præsertim in margine vinearum supra Grinzing, & in vepreto prati infra vineas Sostenses non procul a Baden sitis.

SELINVM.

- I. *SELINVM* sublaetescens, radice unica. *Linn. Sp. pl.* 244.
Selinum palustre levissime lactescens. *Fl. Lapp.* 100. *Fl. Suec.* 227.
Selinum leviter lactescens, radice unica. *Hall. helv.* 443.
Thysselinum palustre. *Tournef. inst.* 319.
Thysselinum angustifolium Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 276.
Seseli palustre lactescens. *Baub. pinn.* 162. *prodr.* 85.
Carvifolia. *Vaill. paris. t. 5. f. 2.*

Habitat in pratis Draskirchenfibus ad rivum sitis, sicut etiam in pratis humidis Murobacensibus.

- II. *SELINVM* foliis radicalibus ovatis inæqualiter ferratis.
Hort. Ups. 59.
Oreoselinum apii folio majus. *Tournef. inst.* 318.
Daucus montanus apii folio major. *Baub. pin.* 130.
Cervaria Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 274.
Libanotis altera quorundam, aliis dicta Cervaria nigra.
Baub. hist. 3. p. 165.

Habitat in vineis Sostensibus ultra Baden, supra vineas Weidlingenses Orientales in Sylva, in monte Cecio seu Kalenberg, & illi vicino Leopoldsberg dicto. In monticulo regio Fischamentam inter & Enzersdorff, alibique passim in sylvis montosis.

ATHAMANTA.

- I. *ATHAMANTA* foliis bipinnatis planis umbella hemisphærica, seminibus hirsutis. *Fl. Suec.* 229.
Libanotis Rivini & Heucheri. *Hall. Jen. Rupp.* 280.
Libanotis pinnulis circa costam decussatis. *Hall. helv.*

Libanotis minor apii folio. *Baub. pin. 157.*

Daucus montanus apii folio. *Baub. pin. 150. prodr. 77.*

Apium montanum seu petræum album. *Baub. hist. 3. part. 2. p. 105. Haj. Synops. Britan. 218.*

Habitat in montibus Badensibus supra thermarum scaturiginem, vineisque Soltensibus.

2. *ATHAMANTA* foliolis divaricatis. *Linn. Sp. pl. 244.*

Selinum foliolis ovato-acutis acute ferratis & incis. *Hort. Cliff. 92.*

Hort. Cliff. 92.

Selinum pinnis ad angulos obtusos pinnatis: pinnulis incis. non ferratis. *Hall. helv. 444.*

Oreoselinum officin. & Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 274.*

Apium montanum folio ampliore. *Baub. pin. 153.*

Habitat copiose supra Lapidicinam Weinhausensem in vallo illo a turcis tempore assedii Viennensis facto, nec non in monte thermis Badensibus imminente, aliisque circa Viennam.

3. *ATHAMANTA* foliolis capillaribus, seminibus glabris striatis. *Hort. Ups. 60.*

Meum Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 279.*

Meum. *Dodon. pempt. 305. Boerhaav. Lugdb. 1. p. 49.*

Meum foliis anethi. *Baub. pin. 148.*

Meum vulgare, sive radix ursina. *Baub. hist. 3. part. 2. p. 91.*

Daucus Meum. *Clus. hist. 2. p. 198.*

Fœniculum alpinum, perenne, capillaceo folio, odore medicato. *Tournef. inst. 312.*

Habitat in jugis alpium Styriæ vicinis, præsertim in alpe Breinina, & Durrenstein, rupicapris hybernali tempore gratissimus cibus, unde *Ægagropilæ* oriuntur.

P E V C E D A N V M.

1. *PEVCEDANVM* folioliis pinnatifidis: laciniis oppositis.

Linn. Sp. pl. 246. Hort. Cliff. 94.

Seseli pratense Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 280.*

Seseli pratense Silaus forte Plinio. *Baub. pin. 162.*

Silaum quibusdam flore luteolo. *Baub. hist. 3. part. 2. p. 170. Boerhaav. Lugdb. 51.*

Siler alterum pratense. *Dodon. pempt. 310.*

Angelica pratensis apii folio. *Tournef. inst. 313.*

Habitat in prato Murobacensi, ad viam trans Hiedldorff, & in lapidicina Weinhausensi.

2. PEUCEDANVM foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus. *Linn. Sp. pl.* 245.

Peucedanum germanicum. Baub. pin. 149.

Habitat in pratis ad Sylvarum margines Leytæponti.

L A S E R P I T I V M.

1. LASERPITIVM foliolis cordatis inciso-ferratis. *Fl. Suec.* 230.

Laserpitium foliis latioribus lobatis. Moris. umb. 29.
Tournef. inst. 324.

Laserpitium Rivini. Hall. Jen. Rupp. 277.

Libanotis latifolia altera, s. vulgarior. Baub. pin. 157.

Libanotis latifolia major. Baub. pin. 159.

Seseli æthiopicum herba. Dodon. pempt. 312.

Habitat in montosis siccis, præsertim ad vineas Badenses, Solfensesque, & in monte Leopoldsberg monti Cecio seu Kalenberg vicino ad viam.

2. LASERPITIVM foliolis lanceolatis integerrimis: extimis coalatis. *Linn. Sp. pl.* 248. *Hort. Cliff.* 96.

Laserpitium minus Rivini. Hall. Jen. Rupp. 277.

Laserpitium daucoides, prutenicum, viscoso femine. Brev. cent. I. 1675. t. 84.

Habitat in montibus Medlingensibus.

3. LASERPITIVM foliolis lanceolatis integerrimis petiolatis. *Linn. Sp. pl.* 249. *Mat. med.* 124.

Siler montanum. Dodon. pempt. 310. *Clus. hist.* 2. p. 195.
Moris. hist. 3. p. 276. s. 9. t. 3. f. 1.

Siler, montanum, majus. Moris. Umb. 7. 8. *Boerhaav. Lugdb.* 1. p. 52.

Ligusticum, quod Seseli officinarum. Baub. pin. 162.
Tournef. inst. 323.

Habitat in monte thermis Badensibus imminente, in collibus ad vineas Münchenshofenses versus sylvam Golsensem sitis, alibique in montanis.

H E R A C L E V M.

1. HERACLEVM foliolis pinnatifidis. *Fl. Suec.* 231.

Sphondylium vulgare hirsutum. Baub. pin. 147.

Sphondylium. Dodon. pempt. 307. *Rivini Hall. Jen. Rupp.* 275.

Sphondylium quibusdam s. Branca ursina Germanica. Baub. hist. 3. part. 2. p. 160.

β Sphon-

β *Sphondylium hirsutum*, foliis angustioribus. *Baub. pin.*
157. *prodr.* 33.

Habitat circa Grinzing, Weidling, Dornbach, in valle
Döblingensi, & in prato Murobacensi alibique passim. β
infra Weidling ad rivum non procul a via regia.

LIGUSTICVM.

LIGUSTICVM foliis multiplicibus: foliolis superne incis. *Hort. Ups.* 62.

Ligusticum vulgare, an libanotis fertilis Theophrasti.
Baub. pin. 157.

Ligusticum vulgare foliis apii. *Baub. hist.* 3. part. 2. p. 127.
Boerhaav. Lugdb. 1. p. 52.

Levisticum Rivini, & officin. *Hall. Jen. Rupp.* 287.

Levisticum vulgare. *Dodon. pempt.* 311.

Angelica, montana, perennis, paludapii folio. *Tour-
nef. inst.* 313.

Hospitatur passim in hortis sub dio, præsertim in hortulis rhi-
zotomarum Hernalsensium, & in horto P. Montecuculi,
in Suburbio Leopoldino Viennæ.

LIGUSTICVM foliis bipinnatis: foliolis confluentibus in-
cis integerrimis. *Linn. Sp. pl.* 250.

Silaum, quod *ligusticum*, *Cicutæ* folio, glabrum.
Tournef. inst. 323. *Boerhaav. Lugdb.* 152.

Seseli montanum Cicutæ folio glabrum. *Baub. pin.* 161.

Seseli l. montanum pannonicum. *Clus. hist.* 2. p. 193.

Habitat in Schneeberg, aliisque alpibus Styriæ vicinis.

Hospitatur autem sub dio in Suburbio Viennensi via regia di-
cto, in horto ad Generalem de Hohenems spectante.

ANGELICA.

ANGELICA foliorum impari loboto. *Fl. Lapp.* 101. *Fl.*
Suec. 233.

Angelica Rivini & officin. *Hall. Jen. Rupp.* 276.

Angelica fativa. *Baub. pin.* 155. *hist.* 3. part. 2. p. 140.

Angelica major. *Dodon. pempt.* 318.

Imperatoria fativa. *Tournef. inst.* 317.

Hospitatur in hortis rhizotomarum Hernalsensium passim, sub
dio.

ANGELICA foliis æqualibus ovato-lanceolatis ferratis.
Fl. Suec. 234. *Fl. Lapp.* 102.

Angelica palustris Rivini. Hall. *Jen. Rupp.* 276.

Angelica Sylvestris major. Baub. pin. 155.

Angelica Sylvestris magna, vulgator. Baub. hist. 3. p. 144.

Angelica Sylvestris. Dodon. pempt. 318.

Imperatoria pratensis major. Tournef. inst. 317.

Habitat passim in subhumidis sylvaticis, præsertim Viennæ horto olim Favoritæ Leopoldinæ, in sylvula ad hortum Excellentissimi Comitum ab Harrach, ripamque fluvii Lætæ sita, & ad pedem alpium Wexel.

S I V M.

1. *Sium* foliis pinnatis, umbella terminali. Fl. Suec. 235.

Sium latifolium. Baub. pin. 154.

Sium. Dodon. pempt. 589. Rivini Hall. *Jen. Rupp.* 285.

Habitat in Brader, & Tabor, sicut etiam trans danubium inter Ladendorff, & Kirchstetten.

2. *Sium* foliis pinnatis, floralibus ternatis. Hort. Ups. 62.

Sisarum Rivini. Hall. *Jen. Rupp.* 283. Dodon. pempt. 68.

Sisarum germanorum. Baub. pin. 155. Baub. hist. 3. p. 153.

Hospitatur ubique in hortis oleraceis sub dio, præsertim in Simeringensibus, Erdbeerensibus, & Leytæpontanis.

3. *Sium* foliolis linearibus decurrentibus connatis. Linn. Sp. pl. 252.

Falcaria Rivini. Hall. *Jen. Rupp.* 279.

Ammi perenne repens. Moris. hist. 3. p. 294. s. 9. t. 8. f. 1.

Ammi quorundam. Dalechamp. Lugd. 696.

Crithmum quartum mathioli umbell. Baub. hist. 3. p. 195.

Eryngium arvense foliis serræ similibus. Baub. pin. 386.

Habitat ubique in agris, ad illorum, vinearumque margines, in ruderatis, & juxta vias, præsertim circa hortum olim S. P. Eugenii Viennæ, ante vallem Döblingensem versus Septentrionem, & undique circa Leytæpontum.

C I C V T A.

1. *Cicuta* umbellæ folio oppositis, petiolis marginatis obtusis. Linn. Sp. pl. 255.

Cicuta aquatica. Fl. Lapp. 103. Baub. hist. 3. pag. 175.

Cicutaria Rivini. Hall. *Jen. Rupp.* 284.

Sium

Sium erucae folio. Baub. pin. 154.

Sium alterum. Dodon. pempt. 539.

Sium majus angustifolium. Tabern. hist. 1. p. 192.

Sium alterum Olusatrici facie. Lobel. icon. 208.

Habitat in aquis stagnantibus, & paludibus praesertim circa Margarethen an Moos, & Leytæpontum, inter Dornbach & Salmersdorff, ac in insulis danubialibus.

Æ T H V S A.

ÆTHVSA. Linn. Sp. pl. 256, Fl. Suec. 240.

Cynapium Rivini & Tabernæmontani. Hall. Jen. Rupp. 284.

Cicuta minor petroselino similis. Baub. pin. 160.

Cicuta tenuifolia. Raj. hist. 451.

Cicutaria fatua. Lobel. icon. 280.

Cicutaria apii folio. Baub. hist. 3. part. 2. p. 179.

Habitat passim in hortis, & agris circa Viennam, praesertim in horto Rösleriano in via regia sito, & in hortis Erdweerenfibus, undique circa Leytæpontum in arvis, alibi in cultis.

C O R I A N D R V M.

CORIANDRV M fructibus globosis. Hort. Ups. 63.

Coriandrum Rivini. Hall. Jen. Rupp. 285. Cam. epit. 523. Dodon. pempt. 302. Lobel. icon. 705.

Coriandrum majus. Baub. pin. 158.

Hospitatur passim in hortis oleraceis sub dio.

S C A N D I X.

SCANDIX feminibus laevibus rostro longissimo. Hort. Ups. 64.

Scandix semine rostrato, vulgaris. Baub. pin. 152.

Scandix s. Pecten veneris. Dodon. pempt. 701.

Pecten veneris. Cam. epit. 302. Baub. hist. 3. part. 2. p. 71.

Habitat in agris, praesertim inter Hernals, & Weinhaus.

SCANDIX feminibus nitidis ovato-subulatis. Fl. Suec. 242.

Cerrefolium Rivini. Hall. Jen. Rupp. 283.

Chærophyllum sativum. Baub. pin. 152. Tournef. inst. 314.

Chærefolium. Dodon. pempt. 700.

Habitat passim in hortis oleraceis, & ad vinearum margines, sepesque, praesertim circa Leytæpontum, & Julaschium.

CHÆ-

- I. *CHÆROPHYLLUM* flosculis omnibus fertilibus caule æquali. *Linn. Sp. pl.* 258.

Chærophyllum sylvestre perenne, cicutæ folio. *Fl. Lapp.* 104. *Tournef. inst.* 314.

Cerefolium sylvestre Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 280.

Myrrhis sylvestris, seminibus lævibus. *Baub. pin.* 160.

Habitat passim in pomariis præsertim circa Leytæpontum.

2. *CHÆROPHYLLUM* caule lævi, geniculis tumidis. *Linn. Sp. pl.* 258.

Chærophyllum foliis supra decompositis: caulinis articulis lævibus superne incrassatis. *Hort. Ups.* 64.

Chærophyllum radice turbinata, carnosa. *Hort. Cliff.* 102

Cicutaria bulbosa. *Baub. pin.* 161.

Cicutaria pannonica. *Clus. hist.* 2. p. 200.

Myrrhis fœtens Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 282.

Myrrhis tuberosa nodosa. *Moris. Umb.* 67.

Myrrhis odorata bulbosa. *Baub. hist.* 3. p. 183.

Habitat ubique ad sepes, in pomariis, & dumetis circa Leytæpontum.

3. *CHÆROPHYLLUM* caule scabro: geniculis tumidis. *Linn. Sp. pl.* 258.

Chærophyllum caule maculato: geniculis tumidis. *Fl. Suec.* 244.

Chærophyllum sylvestre. *Baub. pin.* 152.

Myrrhis annua semine striato lævi. *Moris. umb.* 44.

Myrrhis annua vulgaris, caule fusco. *Moris. hist.* 3. p. 302. s. 9. t. 10. f. 7.

Habitat ad sepes, arvōsque passim præsertim ad viam Viennam inter & Döbling.

4. *CHÆROPHYLLUM* caule æquali, foliolis incisus acutis. *Linn. Sp. pl.* 258.

Chærophyllum foliolis dissectis, petiolis ramiferis universalibus utrinque membrana auctis. *Hort. Cliff.* 101.

Cerefolium latifolium album, & rubrum. *Moris. hist.* 3. p. 304. s. 9. t. 10. f. 6.

Myrrhis palustris Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 283.

Myrrhis latifolia alba, & rubra. *Tournef. inst.* 318.

Cicutaria palustris latifolia alba, & rubra. *Baub. pin.* 161.

Cicutaria latifolia hirsuta. *Baub. hist.* 3. part. 2. p. 182.

Habitat circa Grinzing, & supra Claustro-Neoburgum, alibi-
bique ad rivulos & in pratis humidioribus.

I M P E R A T O R I A.

IMPERATORIA. *Hort. Ups.* 65.

Imperatoria. *Baub. pin.* 156. Rivini & officin. *Hall. Jen. Rupp.* 276.

Magistrantia. *Cam. epit.* 592.

Astrantia s. Imperatoria. *Dodon. pempt.* 319.

Habitat in alpe Wexel, nec non inter Wolffpassing & Laddendorff.

Hospitatur autem ubique in hortis Rhizotomarum.

S E S E L I.

SESELI caule filiformi divaricato, foliis duplicato-ternatis linearibus, umbellis subsexfidis. *Linn. Sp. pl.* 261.

Pimpinella saxifraga tenuifolia. *Baub. pin.* 160. *prodr.* 84.

Habitat circa Fischamentam rarius.

Observatio in volucrum universale nullum, parziale umbellularum ex multis foliolis factum, quod in Dauco montano multifido, brevique folio Bauhini seu Hippomarathro Rivini monophyllum pelvisiforme reperitur, in Pimpinella autem foliis supra decompositis Linnæi *Sp. pl.* 264 plane abest; qua vel sola nota ab iis, quibus cæterum valde similis est, satis distinguitur.

P A S T I N A C A.

PASTINACA foliis simpliciter pinnatis. *Hort. Ups.* 66.

Pastinaca sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 155.

Pastinaca latifolia sylvestris. *Dodon. pempt.* 680.

Pastinaca germanica sylvestris quibusdam Elaphoboscum. *Baub. hist. 3. part. 2. p.* 149.

β. Pastinaca sativa latifolia. *Baub. pin.* 155.

Pastinaca Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 274.

Elaphoboscum sativum. *Tabern. icon.* 76.

Habitat ubique in pratis, agrorum vinearumque marginibus & fossis circa Leytæpontum, in valle Döblingensi, ac in prato Murobacensi. β ubique in hortis oleraceis.

A N E T H V M.

ANETHVM fructibus compressis. *Hort. Ups.* 66.

Anethum Rivini & officin. *Hall. Jen. Rupp.* 278.

Anethum hortense. *Baub. pin.* 147.

Ane-

Anethum. *Baub. hist.* 3. part. 2. p. 6. *Dodon. pempt.* 298.
Habitat ad vineas Leytæpontanas extra portam Harnburgen-
sem fitas fors olim cultum.

Hospitatur vero sub dio ubique in hortis oleraceis.

2. *ANETHVM* fructibus ovatis. *Hort. ups.* 66.

Fœniculum vulgare germanicum. *Baub. pin.* 147.

Fœniculum Rivini & officinarum *Hall. Jen. Rupp.* 278.

Dodon. pempt. 297.

Fœniculum sylvestre. *Baub. pin.* 147.

β. *Fœniculum majus Rivini*, *Hall. Jen. Rupp.* 279.

Fœniculum dulce. *Baub. pin.* 147.

Fœniculum dulce, majore, & albo semine. *Baub. hist.*

3. part. 2. p. 2. 4.

Habitat pariter ad vineas Leytæpontanas cum priore, sed co-
piofius, probabiliter ibidem olim cultum.

Hospitatur autem præsertim β. in hortis oleraceis passim sub
dio, præsertim in Erdbeerensibus & Simeringensibus.

C A R V M.

I. *CARVM*. *Dodon. pempt.* 299. *Fl. Lapp.* 105. *Fl. Suec.* 245:
Rivini. Hall. Jen. Rupp. 281.

Carus. *Baub. hist.* 3. part. 2. p. 69.

Carvi. Tournef. inst. 306.

Cuminum pratense, Carvi officinarum. *Baub. pin.* 158.

Habitat ubique in pratis præsertim inter: Dornbach, & Sal-
mersdorff, circa Döbling, Neustift, Murobacinm, &
Leytæpontum.

P I M P I N E L L A.

I. *PIMPINELLA* foliis pinnatis: foliolis radicalibus subro-
 tundis, summis linearibus. *Linn. Sp. pl.* 246.

Pimpinella foliis subrotundis. *Fl. Suec.* 246.

Pimpinella. *Hort. Cliff.* 106.

Pimpinella saxifraga minor. *Baub. pin.* 160. *Rivini pent-*
irr. Hall. Jen. Rupp. 285.

Tragofelinum minus. *Tournef. inst.* 309.

Saxifraga parva. *Dodon. pempt.* 315.

β. *Pimpinella saxifraga major altera*. *Baub. pin.* 159.

Pimpinella media Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 285.

Tragofelinum alterum majus *Tournef. inst.* 309.

γ. *Pim-*

γ. *Pimpinella saxifraga* major umbella candida & rubente.

Baub. pin. 159. Hall. Jen. Rupp. 285.

Tragofelinum majus umbella candida. Tournef. inst. 309.

Habitat α. & β. ubique in pascuis & agrorum marginibus circa Leytæpontum præsertim promiscue circa Nosocomium ad St. Lazarum dictum, in montibus Badensibus, Petersdorffensibusque, circa Draskirchen, Weinhaus & Dornbach.

γ. in Schneeberg, a pægue Breinina.

• *PIMPINELLA* foliis radicalibus trifidis incis. *Linn. Sp. pl. 264.*

Anisum foliis radicalibus simplicibus. *Hort. upf. 67.*

Anisum Rivini & officin. Hall. Jen. Rupp. 284. Fuchs. hist. 62.

Anisum herbariis. Baub. pin 159.

Anisum veteribus. Baub. hist. 3. port. 2. p. 92.

Anisum vulgare. Clus. hist. 2. p. 202.

Hospitatur in hortis oleraceis, & rhizotomarum sub dio.

A P I V M.

• *APIUM* foliolis caulinis linearibus. *Hort. upf. 67.*

Apium hortense Petroselinum vulgo. Baub. pin. 153.

Apium hortense. Dodon. pempt 694.

Hospitatur ubique in hortis oleraceis sub dio.

• *APIUM* foliolis caulinis cuneiformibus. *Fl. Suec. 248.*

Apium palustre s. Apium officinarum. Baub. pin. 154.

Apium Rivini. Hall. Jen. Rupp. 284.

Apium vulgare ingratius Baub. hist. 3. part. 2. p. 100.

Eleoselinum Dodon. pempt. 695.

β. *Apium dulce, Celleri italorum. Tournef. inst. 305.*

Habitat in Scrobibus insularum Danubialium, præsertim in Tabor, ac ad viam regiam Nusdorffensem & Danubium, alibique. β. in hortis oleraceis ubique.

Æ G O P O D I V M.

• *ÆGOPODIVM* foliis caulinis summis ternatis. *Linn. Sp.*

pl. 265. Hort. Cliff. 107. Fl. Suec. 247.

Ægopodium herba Gerhardi. Tabern. icon. 83.

Angelica sylvestris minor s. erratica. Baub. pin. 155.

Podagraria Rivini & lobel. Hall. Jen. Rupp. 279.

Herba Gerardi. *Dodon. pempt. 320.*

Habitat ad sepes & in pomariis passim, præsertim in sylva ad hortum Leytæpontanum Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach sita; in valle Döblingeni, in prato Murobacensi, & in Tabor.

HIPPOMARATHRUM.

1. HIPPOMARATHRUM Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 280.*

Daucus montanus multifido, brevique folio. Baub. pin. 150.

Habitat supra thermarum Badensium scaturiginem.

Observatio. Differt a Pimpinella foliis supra decompositis Linnæi Sp. pl. 264. & a Seseli caule filiformi divaricato, foliis duplicato ternatis linearibus, umbellis subsexfidis. ejusdem Sp. pl. 261. involucro umbellularum partialium integro seu monophyllo pelvisiformi.

TRIGYNIA.

RHUS.

1. RHUS foliis pinnatis ferratis lanceolatis utrinque nudis. *Linn. Sp. pl. 265.*

Rhus foliis pinnatis ferratis. Hort. Ups. 68. Hort. Cliff. 110.

Rhus angustifolium. Baub. pin. 414.

Sumach angustifolium. Baub.-prodr. 158.

Hospitatur sub dio in hortis passim præsertim in horto olim favoritæ Videntis nunc Gymnasii Theresiani.

2. RHUS foliis simplicibus obovatis. *Linn. Sp. pl. 267.*

Cotinus foliis obverse ovatis. Hort. Cliff. 111.

Cotinus coriaria. Dodon. pempt. 780.

Cocconilea, s. Coccygia. Baub. pin. 415.

Coccygia. Clus. hist. 1. p. 16.

Habitat circa Baden, vineasque sostenses, præsertim in illa valle quam mons vulgo der Calvariberg dictus cum opposito format.

VIBURNUM.

1. *VIBURNUM* foliis cordatis ferratis venosis subtus tomentosis. *Hort. Usp.* 63.

Viburnum. *Tournef. inst.* 607. *Mathiol.* 217. *Hall. Jen. Rupp.* 41.

Viburnum vulgo. *Bauh. pinn.* 249.

Lantana. *Dodon. pempt.* 731.

Lantana vulgo, aliis *Viburnum*. *Bauh. hist.* 557.

Habitat passim in sepibus, sylvis, & fruticetis circa Dornbach, Fischamentam, Nusdorff, Döbling, & Leytæpontum.

2. *VIBURNUM* foliis lobatis, petiolis glandulosis. *Linn. Sp. pl.* 268.

Opulus. *Fl. Suec.* 249. *Ruellii.* 281. *Tournef. inst.* 607. t. 306. *Hall. Jen. Rupp.* 42.

Sambucus aquatica flore simplici. *Bauh. pin.* 456.

Sambucus palustris. *Dodon. pempt.* 846.

β. *Sambucus aquatica* flore globoso pleno. *Bauh. pin.* 456.

Habitat in insulis danubialibus fere omnibus, in fruticetis insula Geimannianæ, in valle Döblingensi, & in fruticeto inter hortum oleraceum Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach, ac ejusdem hortum phasianorum sito. β. passim in hortorum locis humidioribus.

SAMBUCUS.

1. *SAMBUCUS* cymis tripartitis, stipulis foliaceis. *Linn. Sp. pl.* 269

Sambucus caule herbaceo simplici. *Fl. Suec.* 251.

Sambucus humilis seu *Ebulus*. *Bauh. pin.* 456.

Ebulus. *Fuchf. hist.* 65.

Habitat in prato murebacensi, circa Baden, ad agrorum margines, fossas, & hortos circa Leytæpontum ubique.

2. *SAMBUCUS* cymis quinquepartitis, caule arboreo. *Linn. Sp. pl.* 269.

Sambucus caule arboreo ramoso, floribus umbellatis. *Fl. Suec.* 250.

Sambucus fructu in umbella nigro. *Bauh. pin.* 456.

Sambucus. *Dodon. pempt.* 845.

β. Sambucus fructu in umbella viridi. *Baub. pin. 456.*

Habitat ubique ad hortos suburbiorum Viennensium & ad pagos, nec non in sylva horti Leytæpontani Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach, alibique ab aviculis translatis seminibus propagata. β. in valle Breinina, & inde ad viam quæ Neobergam ducit.

3. SAMBUCUS racemis compositis ovatis, caule arboreo. *Linn. Sp. pl. 270.*

Sambucus racemosa rubra. Baub. pin. 456.

Sambucus racemosa, acinis rubris. Baub. hist. 1. p. 549.

Sambucus montana racemosa. Lobel. ic. 163.

Habitat ultra vallem Breininam ad viam quæ Neobergam ducit, alibique in montosis.

Hospitatur in hortulo botanico Fratris Honorii apud Fr. Fr. Misericordiæ Viennæ, & in horto Leytæpontano Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

STAPHYLEA.

1. STAPHYLEA foliis pinnatis. *Hort. Ups. 69.*

Staphylodendron. Dalech. hist. 102. Mathiol. 274. Baub. hist. 1. p. 274. Hall. Jen. Rupp. 123.

Pistacia sylvestris. Baub. pin. 401.

Habitat supra Grinzing in fruticeto orientali extra sylvam, circa Petersdorff, & in horto olim Favoritæ Videnfis Viennæ.

TAMARIX.

1. TAMARIX floribus decandris. *Hort. Cliff. 111. Linn. Sp. pl. 271.*

Tamarix fruticosa, folio crassiore, f. Germanica. Baub. pin. 485.

Tamarix germanica sive minor, fruticosa. Baub. hist. 1. p. 351.

Tamariscus germanica. Lobel. icon. 218. Hall. Jen. Rupp. 120.

Habitat ad ripam sabulosam Danubii in Tabor, aliisque insulis danubialibus.

ALSINE.

1. ALSINE petalis bipartitis foliis ovato-cordatis. *Linn. Sp. pl.* 272.

Alfene foliis ovato-cordatis (floribus trigynis) *Fl. lapp. 186. Fl. Suec. 369.*

Alfene media. *Baub. pin. 250.*

Alfene minor. *Dodon. pempt. 29.*

Habitat ubique in cultis, & umbrosis.

2. ALSINE petalis integris, foliis subulatis. *Linn. Sp. pl.* 272.

Alfene fegetalis, gramineis foliis unum latus spectantibus. *Vaill. paris. 8. t. 3. f. 3,*

Habitat circa Weinhaus in valle a Turcis tempore assedii Viennensis facta, & circa Baden.

TETRAGYNIA.

PARNASSIA.

1. PARNASSIA. *Fl. lapp. 108. Fl. Suec. 252.*

Parnassia Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 114.*

Parnassia palustris, & vulgaris. *Tournef. inst. 246.*

Pyrola rotundifolia nostras, flore unico ampliore. *Moris. hist. 3. p. 505. s. 12. t. 10. f. 3.*

Gramen parnassi, flore albo simplici. *Baub. pin. 309.*

Gramen parnassi Dodonæi, quibusdam Hepaticus flos. *Baub. hist. 3. p. 537.*

Gramen parnassium *Dodon. pempt. 564.*

Habitat circa Neapolim Austriæ, Novemque Ecclesias, & in valle Breinina; alibique in uliginosis montanis.

PENTAGYNIA.

STATICE.

1. STATICE caule nudo simplici capitato. *Fl. Suec. 253.*

Statice. *Dalech. hist. 1190. Tournef. inst. 341. Hall. Jen. Rupp. 96.*

Limonium majus, flore globoso. *Moris. hist. 3. p. 600.*

Scabiosa montana, globoso flore, gramineis foliis latioribus. *Herm. lugdb. 540.*

Armerius montanus tenuifolius major. *Clus. hist. 1. p. 287.*

Caryophyllus montanus major, flore globoso. *Baub. pin. 211.*

Caryophylleus flos aphyllorcaulos, vel Junceus major. *Baub. hist. 3. p. 336.*

β. Caryophyllus montanus minor. *Baub. pin. 211.*

Habitat in Schneeberg, & alpe Breinina, aliisque vicinis.

β. Hospitatur cum priore passim in hortis illorum areolas cingens

2. STATICE caule nudo paniculato tereti, foliis lævibus. *Linn. Sp. pl. 274.*

Statice caule nudo ramoso. *Fl. Suec. 254.*

Limonium maritimum majus. *Baub. pin. 192. Hall. Jen. Rupp. 95.*

Limonium majus multis, aliis Behen rubrum. *Baub. hist. 3. app. 876.*

Valerianæ rubræ similis pro limonio missa. *Dodon. pempt. 351.*

Hospitatur hinc inde in hortis Viennæ præsertim in horto S. P. de Schwarzenberg æstate in apricario, hyeme in frigidario.

L I N V M.

1. LINVM calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario. *Linn. Sp. pl. 277.*

Linum ramis foliisque alternis lineari-lanceolatis, radice annua. *Hort. Cliff. 114.*

Linum foliis alternis lanceolatis integerrimis, calycibus acuminatis angulatis, capsulis mucronatis. *Hort. Ups. 71.*

Linum arvense. *Baub. pin. 214. Raj. hist. 1073.*

Habitat inter segetes passim, satumque in agris.

2. LINVM calycibus acuminatis sessilibus alternis, caule corymbofo. *Linn. Sp. pl. 277.*

Linum sylvestre latifolium hirsutum cæruleum. *Baub. pin. 339. Raj. hist. 1073. Moris. hist. 2. p. 573. s. 5. t. 26. f. 5.*

Linum sylvestre latifolium. Clus. hist. 1. p. 317.

Habitat in locis editioribus, & siccioribus passim, præsertim juxta viam Peternellam & Altenburgum versus, inter Elend & Fischamentam, Leytæpontum inter & Enzersdorff, ac circa Mannersdorff, a ibique.

3. *LINUM* calycibus acuminatis, foliis sparsis lineari setaceis retrorsum scabris. *Linn. sp. pl. 278.*

Linum sylvestre angustifolium flore magno. Baub. pin. 214.

Linum sylvestre V. angustifolium. Clus. hist. 1. p. 318.

Habitat in arvis desertis Döblingensibus, & in Fischamentæ ad furnum lateritium sitis, ibidemque ad sacellum pestilentiali, & juxta viam Elendinam.

4. *LINUM* calycibus rotundatis obtusis, foliis linearibus acutis. *Linn. Sp. pl. 278.*

Linum sylvestre angustifolium foliis rarioribus. Baub. pin. 214.

Linum sylvestre II. Tabern. icon. 822.

Habitat in monte Cecio seu Kalenberg & in montibus Medlingensibus, alibique.

5. *LINUM* calycibus subserrato-scabris lanceolatis subsessilibus, panicula ramis dichotomis *Linn. Sp. pl. 279.*

Linum sylvestre latifolium luteum. Baub. pin. 214.

Linum latifolium luteum. Baub. hist. 3. p. 454.

Linum sylvestre. III. latifolium. Clus. hist. 1. p. 317.

Habitat in valle Döblingensi ad introitum ex pago.

6. *LINUM* calycibus ovatis muticis, foliis lanceolatis; inferioribus oppositis. *Linn. Sp. pl. 280.*

Linum caule simplici, ramis foliisque inferioribus oppositis lineari lanceolatis. Hort. Cliff. 114.

Linum maritimum luteum. Baub. pin. 214.

Linum luteum Narbonense. Baub. hist. 3. p. 454. Raj. hist. 1074.

Linum sylvestre. Dodon. pempt. 534.

Habitat in monte thermis Badensibus imminente.

7. *LINUM* foliis oppositis ovato-lanceolatis caule dichotomo, corollis acutis. *Fl. Suec. 255.*

Linum catharticum D. Wedelii, & Gerhardi Angli. Hall. Jen. Rupp. 132.

Linum pratense flosculis exiguis. Baub. pin. 214.

Alfene verna glabra flosculis albis, vel linum minimum. Baub. hist. 3. p. 455.

Spergula bifolia lini capitulis. *Loef. pruss. p. 261. t. 80.*
Habitat in pratis decubibus succulentis, sylvisque passim, præ-
sertim in prato Murobacensi ad dextram, & principium
sylvæ lateralis, supra sylvam Petersdorffensem in parte aprica
Gishübel respiciente, circa Dornbach, alibique.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

BROMELIA.

I. **B**ROMELIA foliis ciliato-spinosis mucronatis, spica comosa. *Linn. Sp. pl. 285.*

Bromelia foliis spinosis, fructibus connatis caulem cingentibus. Hort. Ups. 73.

Carduus brasiliensis, foliis aloës. Baub. pin. 384.

Ananas acostæ. Comm. hort. 1. p. 109. t. 57.

β. *Ananas aculeatus, fructu pyramidato: carne aurea. Tournef. inst. 653.*

γ. *Ananas aculeatus, fructu conico carne aurea. Pluk. Spec. 20.*

δ. *Ananas lucide virens, folio vix ferrato. Dill. elth. 25. t. 21. f. 22.*

Hospitatur passim in magnatum caldariis.

GALANTHVS.

I. **G**ALANTHVS. *Hort. Ups. 73.*

Leucojum bulbosum trifolium minus. Baub. pin. 56.

Leucojum bulbosum præcox minus. Clus. hist. 1. p. 169.

Leucojum hortense minus. Hall. Jen. Rupp. 151.

Leuco-Narcisso-Lirion minimum. Lob. hist. 64.

Narcisso-Leucojum, trifolium minus. Tournef. inst. 387.

Habitat passim in sylvis circa Viennam præsertim ad Sacellum S. Brigittæ supra Leopoldinam: copiose autem in sylva ad nosocomium spectante Leytæponti.

N A R C I S S V S.

NARCISSVS spatha uniflora, nectarii limbo rotato brevissimo. *Hort. Ups.* 74.

Narcissus foliis ensiformibus, floris nectario rotato brevissimo. *Hort. Cliff* 134.

Narcissus albus circulo purpureo. *Baub. pin.* 48.

Narcissus medio purpureus. *Dodon. pempt.* 223.

Hospitatur ubique in hortis sub dio.

NARCISSVS spatha uniflora, nectarii limbo campanulato erecto petalo æquale. *Linn. Sp. pl.* 289.

Narcissus foliis ensiformibus, florum nectario longitudine petalorum. *Hort. Cliff.* 134. *Hort. Ups.* 74.

Narcissus sylvestris pallidus, calyce luteo. *Baub. pin.* 52.

Narcissus luteus sylvestris. *Dodon. pempt.* 227.

Hospitatur ubique in hortis sub dio, præsertim Leytæponti.

NARCISSVS ipatha multiflora, nectario campanulato brevi, foliis subulatis. *Hort. Ups.* 75.

Narcissus foliis subulatis, florum nectario brevissimo. *Hort. Cliff.* 134.

Narcissus juncifolius luteus minor. *Baub. pin.* 51.

Narcissus juncifolius, oblongo calyce, luteus major. *Baub. pin.* 51.

Narcissus juncifolius minor & 2. *Clus. hist.* 1. p. 159.

Hospitatur passim in hortis sub dio, & in frigidariis.

NARCISSVS spatha multiflora, nectario campanulato foliis planis. *Hort. Ups.* 74.

Narcissus foliis ensiformibus, florum nectario campanulato erecto petalis longe brevior. *Hort. Cliff.* 134.

Narcissus medio luteus copioso flore: odore gravi. *Baub. pin.* 50.

Narcissus luteus polyanthos lusitanicus. *Baub. pin.* 50.

Hospitatur passim in hortis sub dio, copiosius autem in viridariis, & cubilibus curiosorum.

A M A R Y L L I S.

AMARYLLIS spatha uniflora, corolla inæquali, genitalibus declinatis. *Hort. Ups.* 75.

Amaryllis formosissima. *Aët. Stock.* 1742. p. 23.

Lilio-Narcissus Jacobæus, flore sanguineo nutante.

Dill. elth. 195. t. 163. f. 196.

Hospitatur passim in hortis, præsertim Viennæ in horto Excellentissimi Comitis Ferdinandi ab Harrach, & Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach æstate in area meridionali, hyeme in frigidario, nisi bulbum, postquam defloruit, eximere & per hyemem in loco temperato, ac sicco conservare placeat.

ALLIVM.

1. ALLIVM caule planifolio umbellifero, staminibus tricuspatis, radice tunicata. *Hort. Ups. 77.*

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus sphærice congestis, radice tunicata cauli circum nata. *Hall. all. 5.*

Porrum radice ambiente tunicata oblonga solitaria. *Hort. Cliff. 136.*

Porrum commune capitatum. *Baub. pin. 72.*

Porrum sativum latifolium. *Baub. pin. 72.*

Porrum. *Dodon. pempt. 688.*

Hospitatur ubique in hortis oleraceis sub dio.

2. ALLIVM caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus lanceolatis corolla longioribus. *Mat. med. 163. Spec. pl. 295.*

Allium foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis. *Roy. Lugdb. 39.*

Allium radice oblonga reticulo obducta. *Hall. all. 17.*

Allium montanum latifolium maculatum. *Baub. pin. 74.*

Allium anguinum. *Cam. epit. 329.*

Victorialis longa. *Clus. hist. 1. p. 189.*

Moly alpinum latifolium, caule maculato. *Hall. Jen. Rupp. 152.*

Habitat in Dürrenstein.

3. ALLIVM caule planifolio bulbifero, radice composita, staminibus tricuspatis. *Hort. Ups. 76. Mat. med. 164.*

Allium radice bulbo multipartito, capitulo bulbifero, foliis linearibus. *Hort. Cliff. 137.*

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, capite bulbifero, radicibus in unum bulbum congruentibus. *Hall. all. 1.*

Alli-

Allium sativum. *Bauh. pin.* 73.

Allium. *Cam epit.* 328.

Hospitatur ubique in hortis oleraceis sub dio.

ALLIVM caule planifolio bulbifero, staminibus subulatis.
Linn. Sp. pl. 297.

Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis carinatis. *Hall. all.* 24. t. 1. f. 2.

Ampeloprasum proliferum. *Lob. icon.* 156.

β. *Allium montanum* bicorni angustifolium, flore dilute purpurascens. *Bauh. pin.* 74.

Allium seu Moly montanum. 2. *Clus. hist.* 1. p. 193.

Habitat in montibus circa Burckersdorff, Dornbach, Grinzing, & Weidling.

ALLIVM caule subteretifolio umbellifero, pedunculis exterioribus brevioribus, staminibus tricuspidatis.
Hort. Ups. 78.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, capite suave rubente sphærico, non bulbifero, radice laterali. *Hall. all.* 8.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, capite sphærico non bulbifero atro-purpureo. *Hall. all.* 9. f. 1.

Habitat ultra Baden supra vineas Sostenses.

ALLIVM caule teretifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus subulatis. *Linn. Sp. pl.* 298.

Allium umbella non bulbifera lutea, vagina bicorni, foliis teretibus. *Hall. all.* 21.

Allium montanum bicorni, flore pallido odore. *Bauh. pin.* 75.

Allium seu Moly montanum 4. *Clus. hist.* 1. p. 216.

Habitat in montibus Badensibus, ad vineas Sostenses, & in lapidicina Weinhausensi.

ALLIVM caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspidatis. *Linn. Sp. pl.* 299.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, capite bulbifero, radice multiplici. *Hall. all.* 4.

Allium sylvestre campestre purpurascens *Bauh. pin.* 74.

Allium campestre juncifolium capitatum purpurascens majus. *Bauh. pin.* 74.

Porrum sylvestre vincarum. *Bauh. pin.* 72.

Porrum sylvestre gemino capite. *Baub. pin. 72.*

Habitat in vallo suburbico Viennensi ad hortum olim S. P. Eugenii, versusque Nosocomium ad St. Marcum alibi que in agrorum & vinearum marginibus passim.

8. ALLIUM scapo nudo semicylindrico, foliis lanceolatis, petiolatis, umbella fastigiata. *Linn. Sp. pl. 300.*

Allium foliis lanceolatis, scapo nudo semicylindraceo bulbo setis obvallato. *Fl. Suec. 263.*

Allium foliis radicalibus petiolatis, floribus umbellatis *Hall. all. 18.*

Allium sylvestre latifolium. *Baub. pin. 74.*

Allium ursinum. *Fuchs. hist. 739. Cam. epit. 330.*

Habitat in sylva Dornbacensi, in valle Brühl retro Medling, & in omnibus Saltibus Leytæpontanis fere solum cum fumaria bulbosa, & convallaria.

9. ALLIUM scapo nudo inferne ventricosso longiore, foliis teretibus. *Hort. Ups. 77. Mat. med. 166.*

Allium staminibus alterne trifidis, caule ad terram ventricosso. *Hall. all. 10.*

Cepa scapo nudo ventricosso foliis longiore, radice depressa. *Hort. Cliff. 137.*

Cepa vulgaris. *Baub. pin. 71.*

Cepa. *Cam. epit. 324.*

Hospitatur ubique in hortis oleraceis sub dio.

10. ALLIUM scapo nudo folia adæquante, foliis teretibus ventricossis *Hort. Ups. 78.*

Allium staminibus simplicibus, caule medio ventricosso. *Hall. all. 11.*

Cepa scapo longitudine foliorum, foliis ventricossis radice oblonga. *Hort. Cliff. 136.*

Cepa oblonga. *Baub. pin. 71. Dodon. pempt. 687.*

Hospitatur passim in hortis oleraceis cum præcedente.

11. ALLIUM scapo nudo adæquante folia teretia subulato filiformia *Hort. Ups. 78.*

Allium staminibus simplicibus, foliis radicalibus teretibus scapi longitudine. *Hall. all. 12.*

Cepa scapis foliisque subulatis teretibus fistulosis æqualibus, spathis globosis. *Fl. Suec. 264.*

Cepa scapo longitudine figuraque foliorum, foliis subulatis filiformibus, spathis globosis. *Hort. Cliff. 136.*

Cepa scætilis, juncifolia, perennis. *Moris. hist. 2. p. 383.*

Por-

Porrum sectivum juncifolium. Baub. pin. 72. Hall. Jen. Rupp. 155.

Schœnoprasum. Dodon. pempt. 689.

Hospitatur ubique in hortis oleraceis sub dio.

L I L I V M.

LILIVM foliis sparsis, corollis campanulatis: intus glabris. Hort. Cliff. 120 Hort. Ups. 80.

Lilium album, flore erecto, vulgare. Baub. pin. 76.

Lilium candidum. Dodon. pempt. 197.

Hospitatur sub dio ubique in hortis.

LILIVM foliis sparsis, corollis campanulatis erectis: intus scabris. Hort. Cliff. 120 Hort. Ups. 80.

Lilium purpureo-croceum majus. Baub. pin. 26. Hall. Jen. Rupp. 147.

Lilium rubens, vel *croceum majus.* Baub. hist. 2. p. 688.

Lilium purpureum majus. Dodon. pempt. 198.

Lilium aureum majus, Tabern. icon. 639.

Hospitatur hinc inde in hortis sub dio.

LILIVM foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. Hort. Cliff. 120 Hort. Ups. 81.

Lilium floribus reflexis, latifolium. Baub. pin. 77.

Martagon sylvaticum. Hall. Jen. Rupp. 148.

Lilium sylvestre Dodon. pempt. 201.

β. *Lilium floribus reflexis alterum hirsutum.* Baub. pin. 78.

Habitat supra Grinzing, inter Salmersdorff, & Weidling, in valle Breinina, inter novem Ecclesias & Buchbergam, circa Leytæpontum, alibique in sylvis montanis.

F R I T I L L A R I A.

FRITILLARIA racemo comoso inferne nudo, foliis integerrimis. Hort. Ups. 82.

Petilium foliis caulinis. Hort. Cliff. 119.

Lilium seu corona imperialis: genus. Baub. pin. 79.

Tufai. Clus. hist. 1. p. 127. 128.

Corona imperialis. Dodon. pempt. 202.

Hospitatur ubique in hortis sub dio.

FRITILLARIA foliis omnibus alternis. Hort. Ups. 81.

Fritillaria e foliorum alis florens. Hort. Cliff. 119.

Fritillaria radice depressa. Roy. lugdb. 30.

Fri-

- Fritillaria præcox purpurea variegata.* Baub. pin. 64.
Meleagris. Dodon. pempt. 233.
 β. *Fritillaria alba variegata.* Baub. pin. 64.
 γ. *Fritillaria alba præcox.* Baub. pin. 64.
 δ. *Fritillia ferotina, atro purpurea.* Baub. pin. 64.
 Hospitatur sub dio hinc inde in hortis magnatum.

U V V L A R I A.

- I. *UVULARIA* foliis amplexicaulibus. Linn. Sp. pl. 304.
Uvularia foliis cordato oblongis. Roy. lugdb. 29.
Smilax perfoliata ramosa, flore albo. Barr. rar. 58. t. 720.
Polygonatum latifolium ramosum. Baub. pin. 302. Baub. hist. 3. p. 531.
Polygonatum latifolium 4. ramosum. Clus. hist. 1. p. 276.
 Habitat in umbrosis montis Wexel, & Durrenstein inter saxa, frutices, & filices.

T V L I P A.

- I. *TULIPA* flore erecto, foliis ovato-lanceolatis. Linn. Sp. pl. 306.
Tulipa scapo triphylo, foliis ovato-lanceolatis. Hort. Ups. 82.
Tulipa. Hort. Cliff. 118.
Tulipa (genus fere totum.) Baub. pin. 57.
Tulipa Turearum. Cord. hist. 213.
 Hospitatur ubique in hortis, sub dio.

O R N I T H O G A L V M.

- I. *ORNITHOGALVM* scapo anguloso diphylo, pedunculis umbellatis simplicibus. Fl. Suec. 270.
Ornithogalum scapo diphylo, pedunculis simplicibus terminatricibus filamentis subulatis. Hort. Cliff. 124.
Ornithogalum luteum. Baub. pin. 71.
Stellaris arvensis flore luteo umbellato. Dill. gen. 110. Giff. 33.
Bulbus sylvestris. Dodon. pempt. 222.
 Habitat in sylvis, dumetis, hortis, & agris circa Leytæpontum, sed varius.

ORNITHOGALVM scapo angulato diphylo, pedunculis umbellatis ramosis. *Fl. Suec.* 271.

Ornithogalum luteum minus. *Baub. pin.* 71.

Habitat passim in arvis, locis gramineis, & juxta vias præsertim ad sacellum pestilentiale Fischamentæ.

ORNITHOGALVM racemo longissimo, filamentis lanceolatis, pedunculis patentibus æqualibus: fructiferis scapo approximatis. *Linn. Sp. pl.* 307.

Ornithogalum spica longissima filamentis triangularibus. *Hall. helv.* 294.

Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albo virescentibus. *Baub. pin.* 70. *Hall. Jen. Rupp.* 149.

Ornithogalum majus. *Clus. hist.* 1. p. 187.

Asphodelus bulbosus Dodonæi, sive Ornithogalum spicatum, flore virente. I. *Baub. hist.* 2. p. 627.

Habitat olim ex alpibus helveticis, Genevensibus, vel Pyrenaicis forsân allatum nunc passim in hortis Viennensibus, & præsertim in ambulacris gramine obsitis horti Leytæponti ad Excellentissimum Comitem Ernestum ab Harrach spectantis.

ORNITHOGALVM floribus corymbosis, pedunculis scapo altioribus, filamentis emarginatis. *Hort. Ups.* 84.

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium. *Baub. pin.* 70. *Hall. Jen. Rupp.* 149.

Ornithogalum vulgare, & verius, majus, & minus. *Baub. hist.* 630

Bulbus leucanthemus minor, sive Ornithogalum. *Dodon. pempt.* 221.

Habitat in prato sito inter viam regiam Badensem, & Petersdorff, in insula Geimania olim, nunc Haueriana Fischamentæ, in locis gramineis olim Favoritæ Videnfis, nunc Gymnasii Theresiani, in arvis trans Waringergassen & Alsterbach Viennæ, alibique passim in pratis.

A N T H E R I C V M.

ANTHERICVM foliis planis, scapo ramoso, corollis planis. *Linn. Sp. pl.* 310.

Anthericum foliis planis, corollis planis deciduis. *Fl. Suec.* 267.

Phalangium parvo flore ramosum. *Baub. pin.* 29. *Tournef. inst.* 368.

Phalangium majus. *Cam. epit.* 580.

Pha-

Phalangium ramosum. Dodon. pempt. 106.

Habitat in petrosis ad viam quæ ducit in vineas Grinzingenses, sicut etiam circa Dornbach, & Neapolim Austriæ, retro novem Ecclesias versus Montem Schneeberg; in vallo tempore assedii Viennensis a Turcis facto non procul a lapidicina Weinhausensi, alibique.

ASPARAGVS.

1. ASPARAGVS caule herbaceo erecto, foliis setaceis, stipulis paribus. Fl. Suec. 272.

Asparagus sylvestris tenuissimo folio. Baub. pin. 490.

Asparagus sylvestris Mathioli. Dalec. hist. 610.

Asparagus pratensis. Baub. hist. 3. p. 725.

Habitat passim in insulis Danubialibus præsertim Viennæ, & Fitchamentæ, in pascuo vulgo anserino infra Weisgärber. alibique.

Hospitatur autem ubique in hortis oleraceis.

CONVALLARIA.

1. CONVALLARIA scapo nudo. Fl. lapp. 112. Fl. Suec. 273.

Lilium convallium album. Baub. pin. 304.

Lilium convallium vulgo. Baub. hist. 3. p. 531.

Lilium convallium. Dodon. pempt. 205.

Habitat circa Dornbach, & copiose in saltibus Leytæpontanis, alibique passim in sylvis.

2. CONVALLARIA foliis verticillatis. Fl. lapp. 114. Fl. Suec. 215.

Polygonatum angustifolium non ramosum. Baub. pin. 303. Hall. Jen. Rupp. 51. Baub. hist. 3. p. 531.

Polygonatum V. five angustifolium l. Clu. hist. 1. p. 277.

Polygonatum alterum. Dodon. pempt. 345.

Hospitatur sub dio in hortulo botanico Fratris Honorii apud FF. Misericordiæ Viennæ in suburbio Leopoldino.

3. CONVALLARIA foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus unifloris. Linn. Sp. pl. 315.

Convallaria foliis alternis, floribus axillaribus. Fl. Suec. 274.

Polygonatum latifolium vulgare. Baub. pin. 303.

Poly-

Polygonatum latifolium II. *Clus. hist.* 1. p. 276.

Polygonatum vulgo *Sigillum Salomonis* *Bauh. hist.* 3. p. 529.

Habitat in peninsula Fischamentensi, circa Dornbach, & Leytæpontum, supra Mannersdorff in monte dicto Leytaberg alibique in sylvis montosis, & umbrosis.

CONVALLARIA foliis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris. *Linn. Sp. pl.* 315.

Convallaria foliis alternis, pedunculis pendulis multifloris. *Sauv. monsp.* 42.

Polygonatum latifolium maximum. *Bauh. pin.* 303.

Polygonatum latifolium I. *Clus. hist.* 1. p. 275.

Habitat cum priori præsertim in Leytaberg.

CONVALLARIA foliis cordatis. *Fl. lapp.* 113. *Fl. Suec.* 276.

Lilium convallium minus. *Bauh. pin.* 304.

Unifolium. *Dodon. pempt.* 205. *Hall. Jen. Rupp.* 93. *Dill. app.* 138.

Unifolium s. *Ophris unifolia.* *Bauh. hist.* 3. p. 534.

Monophyllum. *Raj. hist.* 668.

Smilax unifolia humillima. *Tournef. inst.* 654. *Boërhaav. lugdb.* 2. p. 64.

Gramen parnassi. *Cam. epit.* 744.

Habitat in sylva Dornbacensi ad viam quæ ducit Neustift, in monte Cecio vulgo Kalenberg seu ut alii volunt Gallenberg, alibique.

P O L I A N T H E S.

POLIANTHES. *Linn. Sp. pl.* 316.

Polianthes floribus alternis. *Hort. Cliff.* 127. *Hort. Ups.* 76. *Fl. Zeyl.* 125.

Hospitatur ubique in hortis & viridariis, præsertim Viennæ in orto Excellentissimi Comitis Ferdinandi ab Harrach, & S. P. de Schwarzenberg.

H Y A C I N T H V S.

HYACINTHVS corollis campanulatis sexpartitis apice revolutis. *Linn. Sp. pl.* 316. *Hort. Cliff.* 125.

Hyacinthus oblongo flore cæruleus major. *Bauh. pin.* 43.

Hospitatur passim in hortis sub dio, & in viridariis.

2. *HYACINTHVS* corollis infundibuliformibus semisextidis
basi ventricolis. *Hort. Ups.* 85.

Hyacinthus Orientalis (Spec. 1—15.) & plenus (1—3
fere omnes) *Baub. pin.* 44.

Hyacinthus orientalis major, & minor. *Dodon. pempt.*
216.

Hospitatur ubique in hortis, viridariis, & cubilibus curiosorum.

3. *HYACINTHVS* corollis ovatis. *Hort. Ups.* 85.

Hyacinthus racemosus moschatus. *Baub. pin.* 43.

Muscari obsoletiore flore. *Clus. hist.* 1. p. 178.

Hospitatur copiose sub dio in horto Leytæpontano Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach a sæpius laudato Domino Mohr cultus.

4. *HYACINTHVS* corollis angulato-cylindricis: Summis sterilibus longius pedicellatis. *Linn. Sp. pl.* 318.

Hyacinthus corollis globosis: summis pedunculatis, foliis ensiformibus. *Sauv. monsp.* 17.

Hyacinthus comosus major purpureus. *Baub. pin.* 42.

Hyacinthus. *Cam. epit.* 798.

Muscari nemorense, comosum. *Hall. Jen. Rupp.* 36.

Habitat Viennæ in arvis sitis ultra Waringergassen, & Alsterbach, & in locis gramineis horti Rohravienſis Excellentissimi Comitis Caroli ab Harrach.

5. *HYACINTHVS* corollis globosis uniformibus, foliis canaliculato-cylindricis. *Linn. Sp. pl.* 318.

Hyacinthus corollis globosis. *Hort. Ups.* 85.

Hyacinthus racemosus cæruleus minor juncifolius. *Baub. pin.* 43.

Hyacinthus botryoides vulgaris. *Lob. icon.* 107.

Muscari minus cæruleum racemosum, juncifolium. *Hall. Jen. Rupp.* 36.

Habitat ubique in agris, illorumque marginibus & juxta vias publicas circa Fischamentum Leytæpontum, & Viennam præsertim ibidem in vallo Suburbico & in agris ad hortum olim S. P. Eugenii sitis.

Y V C C A.

1. *YUCCA* foliis integerrimis. *Vir. Clif.* 29.

Yucca foliis margine integerrimis. *Hort. Ups.* 88.

Yucca foliis aloës. *Baub. pin.* 51.

Yucca indica, foliis aloës. *Barr. rar.* 70. t. 1194.

Hospitatur passim in hortis nobilium æstate in apricariis & area meridionali, hyeme in frigidariis, & caldariis: præsertim in horto S. P. de Schwarzenberg Viennæ, & Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

A L O E.

ALOE floribus pedunculatis cernuis corymbosis subcylindricis. *Linn. Sp. pl.* 319.

Aloë foliis caulinis dentatis amplexicaulibus vaginantibus. *Hort. Ups.* 86.

α. Aloë africana caulescens, foliis magis glaucis caulem amplectantibus, & in mucronem obtusorem desinentibus. *Comm. præl.* 68. t. 17. var. 44. t. 44.

β. Aloe africana caulescens foliis glaucis latioribus, & undique spinosis. *Comm. præl.* 70. t. 19.

γ. Aloë africana caulescens foliis glaucis caulem amplectentibus. *Comm. hort.* 2. p. 27. t. 14.

δ. Aloë africana maculata spinosa major. *Dill. elth.* 17. t. 14. f. 15.

ε. Aloë africana mitriformis spinosa. *Dill. elth.* 21. t. 17. f. 19.

ζ. Aloë africana caulescens, foliis minus glaucis, dorso parte suprema spinosa. *Comm. præl.* 69. t. 18.

Hospitatur passim in Nobilium viridariis præsertim Viennæ in horto S. P. de Schwarzenberg, & Excellentissimi Comitis Ferdinandi ab Harrach. nec non Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach. E. cum aliis varietatibus in horto Domini Maximiliani in platea dicta Alstergassen Viennæ.

Huc secundum Clarissimum Linnæum interim refertur Aloë foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis. *Hort. Ups.* 86.

Aloë vulgaris. *Bauh. pin.* 386.

Aloë. *Dodon. pempt.* 359. *Clus. hist.* 2. p. 160.

Hospitatur in Caldario S. P. de Schwarzenberg Viennæ, & Leytæponti in caldario Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

ALOE floribus pedunculatis, pedunculis ovato-cylindricis curvis. *Linn. Sp. pl.* 321.

Aloë foliis linguiformibus patulis distichis. *Hort. Ups.* 86.

Aloë africana, flore rubro, folio maculis albicantibus ab utraque parte notato. *Comm. hort. 2. p. 15. t. 8.*

β. Aloë africana flore rubro, folio triangulari, & verrucis albicantibus ab utraque parte notato. *Comm. hort. 2. p. 17. t. 9.*

Hospitatur in caldario Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach Leytæponti. β. *passim in caldariis Viennæ.*

3. ALOE floribus sessilibus bilabiatis: labio superiore erecto; inferiore patente. *Linn. Sp. pl. 322.*

α. Aloë foliis ovato-subulatis acuminatis tuberculis cartilagineis undique adspersis. *Hort. Cliff. 131.*

Aloë africana folio in summitate triangulari margaritifera, flore subviridi. *Comm. hort. 2. p. 19. t. 10.*

β. Aloë africana margaritifera minor & minima. *Dill. elth. p. 19. 20. t. 16. f. 17. 18.*

γ. Aloë africana humilis arachnoidea. *Comm. præl. 72. t. 17.*

Hospitatur *passim in caldariis.* γ. *olim copiose in horto Favoritæ Videntis ab erudito Domino Zinner culta, nunc varie distributa.*

A G A V E.

I. AGAVE foliis dentato-spinosis, scapo racemoso. *Linn. Sp. pl. 323. Gen. nov. 1102.*

Agave foliis spinoso-dentatis mucronatisque. *Hort. Ups. 87.*

Aloë foliis lanceolatis dentatis, spina cartilaginea terminatis radicalibus. *Hort. Cliff. 131.*

Aloë foliis in oblongum aculeum abeunte. *Baub. pin. 286.*

Aloë ex america. *Clus. hist. 2. p. 160. Dodon. pempt. 359.*

Hospitatur *passim in caldariis, præsertim Viennæ in caldario S. P. de Schwarzenburg.*

HEMEROCALLIS.

I. HEMEROCALLIS scapo ramoso corollis monopetalis. *Hort. Ups. 88.*

Lilio-asphodelus puniceus. *Clus. hist. 1. p. 137.*

Lilium non bulbosum obsoleto colore rubens. *Dodon. pempt. 204.*

Lilium rubrum asphodeli radice. *Baub. pin. 80.*

Hospitatur *sub dio copiose Leytæponti in horto Domini Schiemer.*

A C O R V S.

 I. A C O R V S. *Fl. Suec.* 277.

Acorus verus seu calamus aromaticus officinarum. Baub.

pin. 34. theatr. 626.

Typha aromatica, clava rugosa. Moris. hist. 3. p. 246.

s. 8. t. 13. f. 4.

Habitat copiose in piscina Gundramsdorffensi alibique passim in fossis, piscinis, & paludibus præsertim circa Leytæpontum.

H Æ M A N T H V S.

 I. H Æ M A N T H V S foliis lanceolatis undulatis. *Hort. Ups.* 127.

Hæmanthus colchici foliis, perianthio herbaceo. Dill.

elth. 167. p. 140. t. 2.

Hospitatur in caldario S. P. de Schwarzenburg. & olim in caldario Favoritæ Videntis.

J V N C V S.

 I. J V N C V S culmo nudo : apice membranaceo incurvo , panicula laterali. *Linn. Spec. pl.* 326.

Juncus panicula universali laterali culmo longiore, secundariis sparsis. Guell. Stamp. 412.

Juncus acutus panicula sparsa. Baub. pin. 412.

Habitat supra Burckersdorff trans rivum in fine sylvæ.

 2. J V N C V S culmo nudo filiformi nutante , panicula laterali. *Fl. Suec.* 280.

Juncus lævis , panicula sparsa minor. Baub. pin. 12. theatr. 183. Scheuchz. gram. 347. t. 7. f. 1.

Juncus parvus , calamo supra paniculam longius producto. Raj. angl. 3. p. 432. Fl. lapp. 118.

Habitat cum præcedente , & circa Latifontum.

 3. J V N C V S culmo nudo , foliis floribusque tribus terminalibus. *Fl. Suec.* 281. *Fl. lapp.* 119.

Juncus acumine reflexo minor , & trifidus. Baub. pin. 12. prodr. 22. t. 22. theatr. 186.

Juncus trifidus. Baub. hist. 2. p. 521.

Juncoides alpinum trifidum. Scheuchz. gram. 325.

Habitat cum prioribus supra Burckersdorff.

 4. J V N C V S foliis planis subpilosis spicis sessilibus pedunculatisque. *Linn. Sp. pl.* 329. *Fl. Suec.* 285.

Juncus foliis planis, panicula rara, spicis sessilibus & pedunculatis. *Hort. Cliff.* 137. *Roy. lugdb.* 42. *Gron. Virg.* 38.

Juncus villosus capitulis psyllii. *Tournef. inst.* 246. *Fl. lapp.* 126.

Juncoides villosum capitulis psyllii. *Scheuchz. hist.* 310.

Cyperella capitulis psyllii. *Hall. Jen. Rup.* 143.

Gramen hirsutum capitulis psyllii. *Baub. pin.* 7. *theatr.* 103. *prodr.* 15.

Gramen cyperinum pilosum. *Tabern. icon.* 219.

Gramen exile hirsutum, cyperoides. *Lobelii. Baub. hist.* 2. p. 423.

Habitat ad ripam Danubii supra Rosaviam extra vallum suburbicum Viennæ, & in collibus circa latifontum.

B E R B E R I S.

1. *BERBERIS* pedunculis racemosis. *Linn. sp. pl.* 330. *Mat. med.* 290.

Berberis spinis triplicibus. *Fl. Suec.* 290.

Berberis dumetorum. *Baub. pin.* 454.

Berberis vulgaris s. *crespinus.* *Cam. epit.* 86.

Oxyacantha Galeni. *Tabern. icon.* 1035.

Habitat circa Dornbach, & Leytæpontum, supra Grinzing, in valle Breinina, alibique passim in dumetis.

T R I G Y N I A.

R V M E X.

1. *RVMEX* floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis: unica granifera, foliis cordatis. *Linn. Sp. pl.* 333. *Mat. med.* 178.

Lapathum hortense folio oblongo. *Baub. pin.* 114.

Lapathum sativum. *Dodon. pempt.* 648.

Hospitatur in hortulo botanico fratris Honorii apud fratres Misericordiæ in suburbio Leopoldino Viennæ, sub dio.

2. *RVMEX* floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. *Linn. Sp. pl.* 335.

Rumex floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis planis, foliis cordato oblongis. *Fl. Suec.* 292.

Rumex

Rumex foliis cordato-oblongis acuminatis integris. Fl. Lapp. 129.

Lapathum folio acuto crispo. Baub. pin. 115.

Lapathum acutum crispum. Tabern. icon. 436.

Habitat ubique in locis gramineis succulentis circa Viennam, & Leytæpontum.

3. *RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis. Fl. Suec. 293.*

Lapathum folio acuto plano. Baub. pin. 115. Hall. Jen. Rupp. 56.

Lapathum acutum f. Oxylapathum. Baub. hist. 2. p. 983. Lob. icon. 284.

Habitat passim cum priore præsertim in hortorum ambulacris, & in pratis circa Leytæpontum.

4. *RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis, foliis cordato-oblongis obtusiusculis crenulatis. Linn. Sp. pl. 335.*

Lapathum involucro seminis dentato, foliis obtusis ora crispula. Hall. helv. 172.

Lapathum sylvestre folio subrotundo, seminis involucris dentatis. Moris. hist. 2. p. 580.

Lapathum folio minus acuto. Baub. pin. 115. Hall. Jen. Rupp. 53.

Lapathum vulgare folio obtuso. Baub. hist. 2. p. 984. Raj. hist. 175.

Lapathum. Cam. epit. 228.

Habitat passim ad scrobes & ad sepes in locis humidiusculis, nec non in salicetis: copiosè vero in alpe Wexel.

5. *RUMEX floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis. Linn. Sp. pl. 336.*

Lapathum aquaticum folio cubitali. Baub. pin. 116.

Lapathum palustre. Tabern. icon. 437.

Lapathum maximum aquaticum. Chabr. 309. Baub. hist. 2. Hall. Jen. Rupp. 57.

Hippolapathum. Dalech. hist. 604. Cam. epit. 232.

Habitat Viennæ infra Erdbeer ad stagnum danubiale. supra Burckersdorff trans rivum in prima fossa, & passim ad fossas, fluviumque Leyta dictum circa Leytæpontum.

6. *RUMEX floribus hermaphroditis, foliis cordato-hastatis. Hort. Ups. 99.*

Acetosa rotundifolia hortensis. Baub. pin. 114. Hall. Jen.

Rupp. 59. Moris. hist. 2. p. 583. s. 5. t. 28. f. 9.

Lapathum androgynum acetosum, foliis sagittatis, ramis divergentibus. *Hall. herb. 17.*

Oxalis rotundifolia. *Dodon. pempt. 649.*

Oxalis folio rotundiore repens. *Baub. hist. 2. p. 991.*

Hospitatur ubique in hortis oleraceis sub dio.

7. *RUMEX* floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. *Fl. Suec. 295. Fl. Lapp. 130.*

Acetosa pratensis. *Baub. pin. 114.*

Lapathum acetosum vulgare. *Raj. Syn. 3. p. 143.*

Oxalis vulgaris. *Baub. hist. 2. p. 989.*

Habitat ubique in pratis præsertim circa Dornbach, Grinzing, & Leytæpontum.

8. *RUMEX* floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. *Fl. Lapp. 131. Fl. Suec. 296.*

Acetosa arvensis lanceolata. *Baub. pin. 114.*

Oxalis ovina. *Tabern. icon. 440.*

Habitat in vallo suburbico Viennensi retro hortum olim S. P. Eugenii, & circa nosocomium ad St. Marcum dictum. Sicut etiam in agris arenosis Leytæpontum inter & Prellkirchen.

S C H E V C H Z E R I A.

I. *SCHEVZERIA*. *Fl. Lapp 133. t. 10. f. 1.*

Juncus floridus minor. *Baub. pin. 12. prodr. 43. Theatr. 190.*

Juncoidi affinis palustris. *Scheuchz. Gram. 336.*

Gramen junceum aquaticum, semine racemoso. *Loef. pruss 114. t. 28.*

Habitat in paludosis pratis latifonti: æst rarissime, copiosius circa piscinam Bittermannsdorffensem.

T R I G L O C H I N.

I. *TRIGLOCHIN* capsulis trilocularibus sublinearibus. *Fl. Suec. 298.*

Triglochin fructu tenui. *Fl. Lapp. 134.*

Triglochin Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 59.*

Gramen junceum spicatum. s. Triglochim. *Baub. pin. 6. Theatr. 80.*

Juncago palustris, & vulgaris. *Tournef. inst. 266.*

Habitat in humidis scaturiginosis locis in medio monte vallem Breininam antequam ad alpes pervenitur finiente, alibique in alpibus, & montibus Austriacis.

COLCHICVM.

COLCHICVM foliis planis lanceolatis erectis. *Hort. Ups. 90.*

Colchicum commune. *Baub. pin. 67.*

Colchicum. *Fuchs. hist. 356.*

Habitat ubique in pratis succulentis, præsertim in Hochavien-
sibus, Fischamentensibus & Leytæpontanis.

POLYGYNIA.

ALISMA.

ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus obtuse trigonis.

Linn. Sp. pl. 342.

Alisma fructu obtuso trigono. *Fl. Lapp. 138. Fl. Suec. 300.*

Alisma Rivini, & Cordi. *Hall. Jen. Rupp. 60.*

Plantago aquatica latifolia. *Baub. pin. 190.*

Plantago aquatica. *Cam. epit. 264.*

Ranunculus palustris, plantaginis folio. *Tournef. inst. 292.*

Habitat in stagno danubiali ad viam regiam Nusdorffensem,
in fossis ad viam regiam Badensem, alibique in aquosis, &
ad ripas præsertim Leytæponti.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA

MONOGYNIA.

TRIENTALIS.

TRIENTALIS foliis lanceolatis integerrimis. *Linn. Sp. pl. 344.*

Trientalis. *Fl. Lapp. 139. Fl. Suec. 302.*

Trientalis Cordi, & Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 20.*

Herba Trientalis. *Baub. hist. 3. p. 506.*

Pyrola albes flore europæa. *Baub. pin. 191. prodr. 100.*

Habitat in sine fruticeti orientem respicientis supra Grinzing.

Æ S C V L V S.

1. **ÆSCVLVS** floribus heptandris. *Hort. Ups.* 92.
 Hippo - castanum vulgare. *Tournef. inst.* 612.
 Castanea folio multifido. *Baub. pin.* 419.
 Castanea equina. *Clus. hist.* 1. p. 7. *Dodon. pempt.* 814.
Hospitatur ubique in hortis, & ambulacris sub dio.

C L A S S I S VIII.

O C T A N D R I A

M O N O G Y N I A.

T R O P Æ O L V M.

1. **TROPÆOLVM** foliis integris, petalis acuminato - setaceis. *Hort. Ups.* 93.
 Cardamindum minus, & vulgare. *Tournef. inst.* 430. *Hall. Jen. Rupp.* 286.
 Nasturtium indicum majus. *Baub. pin.* 306.
 Nasturtium indicum. *Dodon. pempt.* 397.
 Nasturtium indicum folio peltato scandens. *Baub. hist.* 175.

Hospitatur passim in hortis, præsertim Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach, æstate in area meridionali, hyeme in frigidario perenne.

2. **TROPÆOLVM** foliis subquinelobis, petalis obtusis. *Hort. Ups.* 93.
 Cardamindum ampliorifolio, & majori-flore. *Tournef. inst.* 430.
 Cardamindum majus. *Hall. Jen. Rupp.* 286.
 Acriviola maxima odorata. *Boerhaav. Lugdb.* 1. p. 244.
 Viola inodora scandens, nasturtii sapore maxima, odorata. *Herm. Lugdb.* 628. t. 629.

Hospitatur passim in hortis sub dio, annuum.

OENOTHERA

OENOTHERA foliis ovato-lanceolatis planis. *Hort. Ups.*

24.

OENOTHERA foliis ovato-lanceolatis denticulatis, floribus lateralibus in summo caulis. *Hort. Cliff.* 144.

Onagra. Tournefort & Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 37.

Lyfimachia lutea corniculata. *Baub. pin.* 245. 516.

Lyfimachia lutea corniculata non papposa virginiana major. *Moris. hist.* 2. p. 271. s. 3. t. 11. f. 7.

Habitat in prato Murobacensi, & in omnibus fere insulis danubialibus, præsertim in Thulnensi majore, in Tabor, Brader, Mannswertenfibus, & Fischamentenfibus.

EPILOBIUM

EPILOBIUM foliis sparsis lineari lanceolatis. *Linn. Sp. pl.*

347.

Epilobium floribus difformibus, pistillo declinato. *Fl.*

Suec. 304.

Epilobium foliis lanceolatis integerrimis, *Fl. Lapp.* 146.

Lyfimachia chamænerion dicta angustifolia. *Baub. pin.*

245.

β. Lyfimachia chamænerion dicta latifolia. *Baub. pin.* 245.

Habitat ad paludem infra Salmersdorff extra Dornbach, alibique in humidis, ad fossas, piscinas, & paludes. β. in rubeto, & in pede montis supra Burckesdorff ad torrentem Viennensem, ex quo primus rivulus dexter in eundem fluit; alibique.

EPILOBIUM foliis oppositis lanceolatis serratis. *Fl. Suec.*

305.

Chamænerion palustre, hirsutum, magno flore. *Hall.*

Jen. Rupp. 38.

Lyfimachia filiquosa hirsuta, magno flore. *Baub. pin.*

245.

Lyfimachia purpurea. *Fuchs. hist.* 491.

β. Lyfimachia filiquosa hirsuta, parvo flore. *Baub. pin.*

245. prodr. 116.

Habitat inter arundines in stagno danubiali supra Rossaviam Viennæ, in insula Thulnensi majore, in stagnis circa fluvium Leyta dictum, alibique in arundinetis. β. cum priore præsertim in fossis civitatem Thulnensem ambientibus.

VAC.

VACCINIVM.

1. VACCINIVM pedunculis unifloris, foliis ferratis ovatis deciduis, caule angulato. *Fl. Lapp.* 143. *Fl. Suec.* 313.

Vaccinium Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 52.

Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricantibus. *Baub. pin.* 470.

Vitis idæa angulosa. *Baub. hist.* 1. p. 520.

Vitis idæa f. Myrtillus. *Tabern. icon.* 1078.

Myrtillus germanica, & Vitis idæa. *Dalech. hist.* 192.

Habitat inter Salmersdorff & Weidling, circa Leytæportum, alibique passim in sylvis.

2. VACCINIVM pedunculis unifloris, foliis integerrimis ovalibus basi ciliatis. *Linn. Sp. pl.* 350.

Vaccinium foliis ovalibus integerrimis deciduis. *Fl. Suec.* 312.

Vaccinium foliis ovalibus annuis integerrimis. *Fl. Lapp.* 142.

Vitis idæa foliis subrotundis ex albidis. *Baub. pin.* 470.

Vitis idæa major. *Tabern. hist.* 3. p. 162.

Vitis idæa II. *Clus. hist.* 1. p. 61. t. 62.

Habitat supra monasterium Neobergense in Weitzalpen, in Etscher, aliisque alpibus austriacis.

3. VACCINIVM racemis terminalibus nutantibus, foliis oblongatis revolutis integerrimis subtus punctatis. *Linn. Sp. pl.* 351.

Vaccinium foliis obverse ovatis perennantibus. *Fl. Lapp.* 144. *Fl. Suec.* 314.

Vaccinium foliis Buxi, semper virens, baccis rubris. *Hall. Jen. Rupp.* 52.

Vitis idæa foliis subrotundis non crenatis, baccis rubris. *Baub. pin.* 70.

Habitat in montibus vallis Breininæ, circa Scotto-Viennam, & in ipsa alpe Breinina.

ERICA.

1. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis inæqualibus campanulatis mediocribus, foliis oppositis sagittatis. *Linn. Sp. pl.* 352.

Erica foliis quadrifariam imbricatis triquetris glabris erectis, corollis inæqualibus calyce brevioribus.
Fl. Suec. 309.

Erica vulgaris glabra. *Baub. pin.* 485. *Fl. Lapp.* 141.

Habitat *supra* Salmersdorff, & *in montibus* Breininis.

ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis campanulatis mediocribus secundis, foliis ternis triquetris patulis. *Linn. Sp. pl.* 352.

Erica procumbens herbacea. *Baub. pin.* 486.

Erica coris folio VIII. *Clus. hist. 1. p.* 44.

Habitat *in monte illo* Gamingen *inter*, & *Seehof sito*.

ERICA foliis in summitate quinis, caule præcumbente.
Linn. Sp. pl. 354.

Erica procumbens dilute purpurea. *Baub. pin.* 486. *Raj. hist.* 1715.

Erica foliis Corios, flore purpureo dilutioris coloris.
Baub. hist. 1. p. 358.

Erica coris folio VII. *Clus. hist. 1. p.* 43.

Habitat *in montibus vallis* Breininæ, *seu hanc vallem componentibus*, *in alpe* Breinina, *in* Schneeberg, *aliisque vicinis*.

ERICA antheris bifidis simplicibus exsertis, corollis ovatis sublongioribus, foliis quaternis triangularibus patentibus. *Linn. Sp. pl.* 355.

Erica procumbens, ternis foliolis, carnea. *Baub. pin.* 486.

Erica coris folio IX. *Clus. hist. 1. p.* 44.

Habitat *in sylva inter* Novemecclesias & Schneeberg, *in aliisque circa eundem sitis*.

D A P H N E.

DAPHNE floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Linn. Sp. pl.* 356.

Daphne floribus sessilibus infra folia elliptico-lanceolata. *Fl. Lapp.* 140. *Fl. Suec.* 311.

Daphnoides. *Cam. epit.* 937.

Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis laureola fœmina. *Baub. pin.* 462.

Thymelæa lauri folio deciduo, f. laureola fœmina. *Tournef. inst.* 595.

Chamælea Germanica. *Dodon. pempt.* 364.

Mesereon Germanicum. *Lob. hist.* 199.

Habitat in monte Cecio, seu Kalenberg aut Gallenberg dicto, circa Burckersdorff, alibique in sylvis montanis passim.

2. *DAPHNE* racemis axillaribus, foliis lanceolatis glabris.
Linn. Sp. pl. 357.

Daphne racemis lateralibus, foliis lanceolatis integris.
Hort. Ups. 94.

Daphnoides f. *laureola.* *Dalech. hist.* 211. *Lob. hist.* 200.

Laureola semper virens, flore viridi, quibusdam *laureola* mas. *Baub. pin.* 462.

Laureola. *Dodon. pempt.* 365.

Habitat in monte Cecio seu Kalenberg, in valle Breinina, circa Dornbach, alibique cum priore.

3. *DAPHNE* floribus congestis terminalibus sessilibus, foliis lanceolatis nudis. *Linn. Sp. pl.* 357.

Daphne humifusa, foliis oblongis flores sessiles terminales subcingentibus. *Sauv. monsp.* 57.

Thymelææ affinis facie externa. *Baub. pin.* 463.

Cneorum mathioli (*hist.* 46.) *Clus. hist.* 1. p. 89. f. 90.

Laureola alpina, linifolia, humilior flore purpureo odoratissimo. *Hall. Jen. Rupp.* 41.

Thymelæa alpina, linifolia, humilior flore purpureo odoratissimo. *Tournef. inst.* 594. *Boerhaav. Lugdb.* 2. p. 213.

Habitat in montis Kalenberg, f. Cecii parte orientali, in collibus circa Leytæpontum, in montibus circa Hiedldorff, Burckersdorff, Dornbach, aliisque.

STELLERIA.

1. *STELLERIA* foliis linearibus, floribus quadrifidis. *Linn. Sp. pl.* 559.

Passerina. *Baub. hist.* 3. p. 456.

Passerina Tragi. *Hall. Jen. Rupp.* 64.

Lithospermum linariæ folio germanicum. *Baub. pin.* 259.

Thymelæa linariæ folio vulgaris. *Tournef. inst.* 594.

Habitat in monte Leopoldsberg dicto monti Cecio vicino, & ad vallum suburbicum Viennensem directe supra templum ad B. M. auxiliatricem dictum.

TRIGYNIA.

POLYGONVM.

POLYGONVM caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Linn. Sp. pl. 360. Mat. med. 189.*

Bistorta foliis ovato-oblongis acuminatis. *Hort. Ups. 95.*

Bistorta major radice magis intorta. *Bauh. pin. 192.*

Bistorta major. *us. hist. 2. p. 68.*

Bistorta. *Cam. epit. 683.*

Habitat ad alpium jugum præsertim in Schneeberg.

POLYGONVM caule simplicissimo monostachyo, foliis lanceolatis. *Linn. Sp. pl. 360.*

Bistorta foliis lanceolatis. *Fl. Lapp. 152. Fl. Suec. 321.*

Bistorta minor. *Clus. hist. 2. p. 63.*

Bistorta alpina minor. *Bauh. pin. 192.*

Habitat in alpis Breininæ, & Schneecalpen jugis tenui gramine obsitis.

POLYGONVM floribus pentandris semidigynis, staminibus corolla longioribus. *Linn. Sp. pl. 361.*

Perficaria florum staminibus quinis corollam superantibus, stylo bifido. *Hort. Cliff. 41.*

Perficaria floribus pentandris digynis, corolla staminibus brevioribus. *Fl. Suec. 318.*

Potamogeton salicis folio. *Bauh. pin. 193.*

, Perficaria palustris fluitans, foliis brevioribus & latioribus, florum spica speciosa, purpurea, compactiore. *Hall. Jen. Rupp. 98.*

Habitat in stagno danubiali ad viam regiam Nussdorffensem, circa Draskirchen, & Leytæpontum. β. circa Neapolim Aultriæ, Draskirchen, Ebersdorff alibique in fossis & paludibus.

POLYGONVM floribus hexandris semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis. *Linn. Sp. pl. 361.*

Perficaria floribus hexandris semidigynis. *Fl. Suec. 320.*

Perficaria florum staminibus senis, stylo bifido. *Hort. Cliff. 46.*

Perficaria urens f. Hydropiper. *Bauh. pin. 101.*

Hydropiper. *Dodon. pempt. 607.*

Habitat in subhumidis pratis, fossis ε: præsertim in insulis Danubialibus, & circa Wilfersdorff.

5. *Polygonum* floribus hexandris digynis, spicis ovatis oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis. *Linn. Sp. pl.* 361.

Perficaria floribus hexandris digynis. *Fl. Suec.* 319.

Perficaria mitis. *Baub. hist.* 3. p. 779. *Fl. Lapp.* 71.

Perficaria mitis maculosa, & non maculosa. *Baub. pin.* 101.

- β. *Perficaria* mitis cum maculis ferrum equinum referentibus. *Tournef. inst.* 509.

Habitat passim inter hortos Erdbeerenses Viennæ, alibi in cultis. β. ibidem & in valle Döblingensi rarius.

6. *Polygonum* floribus heptandris digynis, foliis ovatis, caule erecto, stipulis hirtis. *Linn. Sp. pl.* 362.

Perficaria florum staminibus sex, pluribusque, stylo duplici. *Hort. Cliff.* 42.

Helxine foliis ovatis, caule recto inermi. *Hort. upf.* 96.

Perficaria orientalis, nicotianæ folio, calyce florum purpureo. *Tournef. coroll. inst.* 38.

Hospitatur passim in hortis sub dio.

7. *Polygonum* floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Linn. Sp. pl.* 362.

Polygonum caule procumbente herbaceo, foliis lanceolatis integerrimis. *Mat. med.* 186.

Polygonum. *Fl. Suec.* 322.

Polygonum latifolium. *Baub. pin.* 281.

- β. *Polygonum* oblongo angusto folio. *Baub. pin.* 281. *Fl. Lapp.* 153.

Habitat ubique ad vias circa Viennam & Leytæpontum, præsertim in cæmeterio ecclesiæ metropolitanæ Viennæ. β. circa Weinhaus, & in area arcis Leytæpontanæ Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

8. *Polygonum* foliis cordato-sagittatis, caule erectiusculo inermi, feminum angulis æqualibus. *Linn. Sp. pl.* 364.

Helxine caule erectiusculo inermi, foliis cordato-sagittatis feminibus integerrimis. *Hort. Upf.* 96.

Helxine caule erectiusculo inermi, foliis cordato-sagittatis. *Fl. Suec.* 324.

Fagopyrum vulgare erectum. *Tournef. inst.* 511. *Hall. Jen. Rupp.* 98.

Fagopyrum. *Dodon. pempt.* 512.

Fagotriticum. *Baub. hist.* 2. p. 223.

Frumentum Saracenicum. *Cam. epit.* 187.

Erysimum cereale folio hederaceo *Baub. pin.* 27.

Ocymum cereale. *Tabern. hist.* 276.

Habitat passim inter segetes, & olera circa Leytæpontum, alibique.

POLYGONUM foliis cordatis, caule volubili, floribus planiusculis. *Linn. Sp. pl.* 364.

Helxine caule volubili. *Fl. Lapp.* 154. *Fl. Suec.* 323.

Fagopyrum vulgare scandens. *Tournef. inst.* 511.

Convolvulum nigrum. *Dodon. pempt.* 396.

Convolvulus minor semine triangulo. *Baub. pin.* 294.

Habitat Viennæ infra Erdbeer inter hortos oleraceos, in fossa valli suburbici Viennensis ad hortum olim S. P. Eugenii, & in agris ibi vicinis.

TETRAGYNIA.

PARIS.

PARIS. *Linn. Sp. pl.* 367.

Paris foliis quaternis. *Fl. Lapp.* 155. *Fl. Suec.* 325.

Paris Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 94.

Herba Paris. *Tournef. inst.* 233. *Dodon. pempt.* 444.

Solanum quadrifolium bacciferum. *Baub. pin.* 167.

Aconitum salutiferum. *Tabern. hist.* 720.

Habitat copiose in insula olim Germanniana, nunc Haueriana Fischamentæ, in Tabor, alibique in insulis danubialibus, & in sylvis.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA

MONOGYNIA.

LAVRVS.

LAVRVS foliis lanceolatis venosis perennantibus, floribus quadrifidis dioicis. *Hort. Cliff.* 155. *Hort. Ups.* 98. *Mat. med.* 194.

Laurus vulgaris. *Bauh. pin.* 460.

Laurus. *Dodon. pempt.* 849. *Dalech. hist.* 351.

Hospitatur passim in hortis, æstate in areis, hyeme in frigidariis, præsertim in horto S. P. de Schwarzenburg Viennæ.

TRIGYNIA.

RHEVM.

1. *RHEVM* foliis glabris, petiolis subsulcatis. *Linn. Sp. pl.* 371.

Rheum foliis glabris. *Hort. Ups.* 98.

Rheum. *Hort. Cliff.* 155.

Rhaponticum folio lapathi majoris glabro. *Bauh. pin.* 116.

Hospitatur sub dio in hortulo botanico fratris Honorii apud FF. Misericordiæ in suburbio leopoldino Viennæ.

2. *RHEVM* foliis subvillosis, petiolis æqualibus. *Linn. Sp. pl.* 372.

Rheum foliis subvillosis. *Hort. Ups.* 98.

Rhabarbarum finense, folio crispo, flagellis rarioribus, & minoribus. *Amm. herb.* 206.

Rhabarbarum folio longiori hirsuto crispo, florum thyrso longiori, & tenuiori. *Amm. ruth.* 9.

Acetosa montana. folio cubitali oblongiore crispo, floribus in subviridi luteolis Messerschmidii. *Amm. ruth.* 226.

Hospitatur sub dio ibidem, & apud Dominum de Spies in area monialium ad St. Jacobum Viennæ.

HEXAGYNIA.

BVTOMVS.

1. *BVTOMVS.* *Fl. Lapp.* 159. *Fl. Suec.* 328.

Butomus flore roseo. *Tournef. inst.* 270.

Juncus floridus major. *Bauh. pin.* 112.

Sedo affinis juncoides umbellata palustris. *Moris. hist.* 3. p. 468. s. 12. t. 5. f. 1.

Glandiolus aquatilis. *Dodon pempt. 601.*

Habitat circa Neapolim Austriæ, in stagno danubiali supra Rosaviam Viennæ, in fossis novæ viæ Laxenburgensis, & in fluvio Leyta ad hortum Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach Leytæponti, alibique.

CLASSIS X.

DECANDRIA

MONOGYNIA.

DICTAMNVS.

DICTAMNVS. *Hort. Ups. 102.*

Dictamnus albus vulgo s. Fraxinella. *Bauh. pin. 222.*

Fraxinella. *Clus. hist. 1. p. 99.*

Habitat in monticulo regio inter Fischamentam, & Enzersdorff sito, in valle Döblingensi, inter Salmersdorff & Weidling, in saltibus circa Leytæpontum & latifontum, alibique passim in sylvis montanis.

R V T A.

RVTA foliis decompositis. *Hort. Ups. 162.*

Ruta hortensis latifolia. *Bauh. pin. 336.*

Ruta hortensis. *Lob. hist. 506.*

Ruta graveolens hortensis. *Dodon. pempt. 119.*

Hospitatur ubique in hortis oleraceis sub dio.

M E L I A.

MELIA foliis bipinnatis. *Fl. Zeylon. 162.*

Melia foliis decompositis. *Hort. Cliff. 161.*

Azedarach. *Dodon. pempt. 848.*

Arbor fraxini folio flore cæruleo. *Bauh. pin. 415.*

Pseudo—Sycomorus. *Cam. epit. 181.*

Hospitatur Viennæ in hortis curiosorum æstate in area hyeme in frigidariis.

RHODODENDRON.

1. RHODODENDRON foliis ciliatis nudis, corollis infundibuliformibus. *Linn. Sp. pl.* 392.
Ledum foliis glabris ciliatis ovatis, flore tubuloso. *Hall. helv.* 418.
Ledum alpinum. *Clus. hist.* 1. p. 82.
Balsamum alpinum. *Lob. icon.* 468.
 Habitat in alpe Breinina, & Schneeberg.
2. RHODODENDRON foliis ciliatis, corollis rotatis. *Linn. Sp. pl.* 392.
Ledum foliis serpilli ad margines ciliis instar pilosis, flore purpureo. *Mich. gen.* 225. t. 106.
Chamæcistus hirsuta. *Bauh. pin.* 466.
Chamæcistus VIII. *Clus. hist.* 1. p. 76.
 Habitat in jugo montis Schneeberg.

ARBUTVS.

1. ARBUTVS caulibus procumbentibus foliis rugosis ferratis.
Fl. Lapp. 161.
Vitis idæa foliis oblongis albicantibus. *Bauh. pin.* 470.
Vitis idæa. *Clus. hist.* 1. p. 61.
 Habitat in Schneecalpen.

PYROLA.

1. PYROLA staminibus adscendentibus, pistillo declinato.
Fl. Suec. 330.
Pyrola staminibus, & pistillis declinatis. *Fl. Lapp.* 169.
Pyrola tuba incurva. *Hall. it. helv.* 29.
Pyrola Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 292.
Pyrola rotundifolia major. *Bauh. pin.* 191.
Pyrola l. vulgatiore. *Clus. hist.* 2. p. 119.
 Habitat passim in sylvis, præsertim circa Dornbach, & Mu-robacium.
2. PYROLA pedunculis umbellatis. *Fl. Suec.* 333.
Pyrola frutescens arbuti flore. *Bauh. pin.* 191. *Moris. hist.* 3. p. 505. s. 12. t. 10. f. 5.
Pyrola 3. fruticans. *Clus. hist.* 2. p. 117.
 Habitat in locis umbrosis montis Schneeberg.

1. PYROLA scapo unifloro. *Fl. Lapp.* 167. *Fl. Suec.* 334.

Pyrola rotundifolia minor. *Bauh. pin.* 191.

Pyrola flore singulari Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 292.

Pyrola IV. minima. *Clus. hist.* 2. p. 118.

Habitat in alpibus, præsertim in alpe Breinina, & Schneeberg, sicut etiam in valle Rosenaviam inter & Schneeberg.

D I G Y N I A.

C H R Y S O S P L E N I V M.

1. CHRYSOSPLENIUM foliis alternis. *Fl. Suec.* 317.

Chrysosplenium foliis pediculis oblongis insidentibus.
Tournef. inst. 146.

Sedum palustre luteum majus foliis pediculis longis insidentibus. *Moris. hist.* 3. p. 477. f. 12. t. 8. f. 8.

Saxifraga aurea foliis pediculis oblongis insidentibus.
Raj. hist. 206.

Habitat copiose in locis opacis humentibus sylvæ Dornbacensis.

S A X I F R A G A.

1. SAXIFRAGA foliis radicatis aggregatis lingulatis cartilagineo-ferratis, caule paniculato. *Linn. Sp. pl.* 398.

Saxifraga foliis lingulatis radicalibus margine cartilagineo acute ferratis, floribus paniculatis. *Fl. Suec.* 356.

Saxifraga foliorum marginibus cartilagine crenatis.
Hort. Cliff. 168.

Saxifraga foliis radicalibus in orbem positis ferraturis cartilagineis. *Fl. Lapp.* 177. t. 2. f. 2.

Cotyledon media, foliis oblongis ferratis. *Bauh. pin.* 285.

β. Cotyledon minor foliis subrotundis ferratis. *Bauh. pin.* 285. *prodr.* 133.

Habitat in alpe Breinina, in valle inter novem Ecclesias, & montem Schneeberg medio milliari ante Durrenstein,
β. in summo jugo montis Schneeberg.

2. SAXIFRAGA foliis linearibus subtus punctatis aggregatis recurvatis, caule multifloro. *Linn. Sp. pl.* 399.

Saxifraga alpina minima foliis cæsiis deorsum incurvis.
Tournef. inst. 253.

Sedum alpinum album foliis compactis. *Baub. pin.* 284.

Sedum alpinum minimum foliis cinereis, flore candido.
Scheuchz. alp. 341. 141. t. 21. f. 1.

Sedum minus IX. sive *alpinum* III. *Clus. hist.* 2. p. 61.

Habitat in alpe Breinina, & Schneecalpen.

3. *SAXIFRAGA* foliis cordato-ovalibus retusis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato. *Linn. Sp. pl.* 401.

Geum foliis petiolatis retusis, ora cartilaginea ferrata, caule ramoso. *Hall. helv.* 400.

Sanicula montana rotundifolia minor. *Baub. pin.* 243.

Habitat in alpe Breinina.

4. *SAXIFRAGA* foliis caulinis lineari-subulatis sparsis nudis inermibus, caulibus decumbentibus. *Linn. Sp. pl.* 403.

Saxifraga foliis linearibus sparsis glabris. *Fl. Suec.* 357.

Saxifraga foliis subulatis sparsis. *Fl. Lapp.* 178.

Sedum alpinum, flore pallido. *Baub. pin.* 284.

Sedum minus IV. sive *alpinum* I. *Clus. hist.* 2. p. 60.

Habitat in Schueeberg.

5. *SAXIFRAGA* foliis caulinis reniformibus dentatis petiolatis. *Linn. Sp. pl.* 403.

Saxifraga foliis reniformibus acute crenatis, caule ramoso folioso. *Hort. Cliff.* 167.

Sanicula montana rotundifolia major. *Baub. pin.* 243.

Sanicula alpina. *Cam. epit.* 764.

Habitat in alpe Breinina, & Schneeberg.

6. *SAXIFRAGA* foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata. *Fl. Suec.* 350.

Saxifraga rotundifolia alba. *Baub. pin.* 309.

Saxifraga alba. *Dodon. pempt.* 316.

Saxifraga IV. *Cam. epit.* 719.

Habitat in alpis Breininæ locis umbrosis ubi sylva in ejus jugo desinit.

7. *SAXIFRAGA* foliis caulinis palmato-lobatis; caulinis sessilibus, caule ramoso bulbifero. *Linn. Sp. pl.* 403.

Saxifraga ad folia bulbos gerens. *Baub. pin.* 309.

Sedum bicornè, rotundifolium erectum, radice granulata, & ad caulem tubercula proferens. *Moris. hist.*

3. p. 474. s. 12. t. 9. f. 24.

Habitat in monticulo regio Fischamentam inter, & Enzersdorff sito, ultra Dornbach versus Neustift, in valle Döblingensi, alibique in sylvis, pratisque umbrosis saxosis.

SAXIFRAGA foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis,
caule erecto ramoso. *Fl. Suec.* 353.

Saxifraga verna annua humilior. *Tournef. inst.* 252.

Sedum tridactylites tectorum. *Baub. pin.* 235.

Paronychia altera. *Dodon. pempt.* 113.

Habitat copiose in locis umbrosis & humidis montis Schneeberg.

SAXIFRAGA foliis radicatis aggregatis linearibus integris
trifidisque, caule erecto subnudo subbifloro. *Linn.*

Sp. pl. 404.

Saxifraga foliis simplicibus, & trifidis, caule pæne
aphyllo-paucifloro. *Hall. helv.* 405.

Sedum tridactylites alpinum minus. *Baub. pin.* 284.

Habitat in alpe Breinina.

SCHLERANTHVS.

SCHLERANTHVS calycibus fructus patulis. *Fl. Suec.* 348.

Knawel Rivini & Tragi. *Hall. Jen. Rupp.* 3.

Polygonum gramineo folio majus erectum. *Baub. pin.*
281.

Polygonum montanum vermiculatæ foliis. *Baub. pin.*
281.

Habitat in arvis arenosis præsertim circa Döbling.

SCHLERANTHVS calycibus fructus clausis. *Fl. Suec.* 349.

Knawel incanum, flore majore, perenne. *Raj. angl.* 3.
p. 160. *t.* 5. *f.* 1.

Alchimilla gramineo folio, majore flore. *Vaill. paris.* 4.
t. 1. *f.* 5.

Habitat in campis apricis arenosis, præsertim circa Weinhaus.

SAPONARIA.

SAPONARIA calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis.
Hort. Ups. 106.

Saponaria major lævis. *Baub. pin.* 206.

Saponaria vulgaris. *Baub. hist.* 3. *p.* 346. *Cam. epit.* 152.

Lychnis sylvestris, quæ Saponaria vulgo. *Tournef. inst.*
336. *Hall. Jen. Rupp.* 117.

Habitat in pratis & hortorum ambulacris Leytæponti; ad viam
regiam Drasckirchenfem, alibique in locis gramineis.

SAPONARIA calycibus pyramidatis quinquangularibus, fo-
liis ovatis acuminatis sessilibus. *Hort. Ups.* 107.

Lychnis segetum rubra, foliis perfoliatis. *Baub. pin.* 204.
Vaccaria. Dodon. pempt. 104.

Habitat inter segetes circa Leytæpontum, & Fischamentam,
 in arvis Viennæ inter hortum olim S. P. Eugenii, & No-
 focomium ad St. Marcum sitis, alibique passim in agris.

D I A N T H V S.

1. *DIANTHVS* floribus aggregatis fasciculatis, squamis caly-
 cycinis ovato-subulatis tubum æquentibus, foliis
 lanceolatis. *Linn Sp. pl.* 409.

Caryophyllus hortensis barbatus latifolius. Baub. pin. 208.

β. *Caryophyllus hortensis angustifolius. Baub. pin.* 209.

Hospitatur ubique in hortis sub dio.

2. *DIANTHVS* floribus aggregatis fasciculatis, squamis caly-
 cinis lanceolatis villosis tubum æquantibus. *Fl. Suec.*
 345.

Caryophyllus barbatus sylvestris. Baub. pin. 208.

Armeria sylvestris altera. Lob. icon. 448.

Habitat in sylvis circa Dornbach, Medling, & Latifon-
 tum, alibique.

3. *DIANTHVS* floribus aggregatis capitatis, squamis caly-
 cinis ovatis obtusis muticis tubum superantibus.
Linn. Sp. pl. 410.

Dianthus floribus aggregatis, capitulo magno, squamis
 calycinis ovatis, obtusis magnis. *Hort. Ups.* 106.

Caryophyllus sylvestris fasciculatis floribus. Hall. Jen.
Rupp. 119.

Caryophyllus sylvestris prolifer. Baub. pin. 209.

Armeria prolifera. Lob. icon. 449.

Habitat in asperis apricis montosis circa Dornbach, Burckers-
 dorff, & Petersdorff.

4. *DIANTHVS* floribus solitariis, squamis calycinis subovatis
 brevissimis, corollis crenatis. *Hort. Ups.* 104.

Caryophyllus hortensis. Raj. hist. 986.

Caryophyllus hortensis simplex flore majore. Baub. pin.
 208.

Hospitatur ubique in hortis vel sub dio, vel hyeme in frigida-
 riis.

5. *DIANTHVS* floribus solitariis, squamis calycinis lanceola-
 tis binis, corollis crenatis. *Fl. Suec.* 342.

Caryophyllus minor repens nostras. Raj. hist. 988.

Caryo-

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius. Baub. pin. 209.

Betonica coronaria f. Caryophyllus minor, folio viridi nigricante, repens. Baub. hist. 3. p. 329.

Habitat in pratis circa Leytæpontum, Murobacium, & Ladendorff.

• *DIANTHVS floribus solitariis, squamis calycinis subulatis patulis tubum æquantibus, corollis crenatis. Hort. Ups. 104.*

Caryophyllus sinensis supinus, leucosii folio, flore unico. Tournes. act. 1705. p. 348. f. 5.

Hospitatur passim in hortis Viennæ, præsertim in hortulo Domini de Spies ad monasterium monialium ad St. Jacobum sito.

• *DIANTHVS floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis multifidis fauce pubescentibus. Linn. Sp. pl. 411.*

Dianthus floribus solitariis petalis multifidis basi canaliculatis. Hort. Ups. 105.

Dianthus petalis multifidis. Fl. Lapp. 170.

Caryophyllus flore tenuissime dissecto. Baub. pin. 209.

Caryophyllus sylvestris V. Clus. hist. 1. p. 283.

• *β. Caryophyllus sylvestris VI. Clus. hist. 1. p. 209.*

Caryophyllus sylvestris, flore laciniato odoratissimo. Baub. pin. 210.

Habitat in montis Hamburgensis parte Septentrionem respiciente, & in montibus Medlingensibus. β. in prato Domini Decani Fischamentensis, seminibus ut videtur hortorum quiscuiliis ex suo horto illuc delatis.

Hospitatur vero β. passim in hortis sub dio.

• *DIANTHVS caulibus unifloris, squamis calycinis ovatis, corollis multifidis, foliis linearibus. Fl. Suec. 343.*

Caryophyllus sylvestris humilis flore unico. Baub. pin. 209.

Caryophyllus sylvestris I. Clus. hist. 1. p. 282.

Armerius flos tertius. Dodon. pempt. 176.

Habitat in monte Hamburgensi.

• *DIANTHVS caule unifloro, corollis crenatis, squamis calycinis exterioribus tubum æquantibus, foliis linearibus obtusis. Linn. Sp. pl. 412.*

Caryophyllus pumilus latifolius. Baub. pin. 209. prodr. 104.

Caryophyllus sylvestris, flore magno inodoro hirsuto. Baub. pin. 209.

Caryophyllus sylvestris 2. *Clus. hist. 1. p. 283. fig. 1.*

Habitat in alpe Breinina, & in Schneeberg.

10. *DIANTHVS* calycibus quinquangularibus, squamis calycinis lanceolatis æqualibus, foliis subulatis. *Linn. Sp. pl. 413.*

Dianthus calyce lato, & brevissimo. Hall. helv. 381.

Caryophyllus saxifragus strigosior, f. Caryophyllus sylvestris flore minimo. Baub. pin. 211.

Lychnis pumila caryophyllata, flore rubello, italica Hæmorrhoidalis aldrovandi. Barr. rar. 64. t. 998.

Habitat retro hortum S. P. Eugenii Viennæ. *Hujus cauliculi squamis binis, vel tribus in basi sunt obfiti.*

TRIGYNIA.

CVCVBALVS.

1. *CVCVBALVS* calycibus campanulatis, petalis distantibus, fructu colorato, ramis divaricatis. *Linn. Sp. pl. 414.*

Cucubalus caule ramoso, floribus trigynis, fructu colorato globoso. Hort. Ups. 109.

Alsine scandens baccifera. Baub. pin. 250.

Alsine repens. Dodon. pempt. 403.

Habitat Viennæ in horto Favoritæ Leopoldinæ, sicut etiam in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach Leytæponti, alibique in insulis Danubialibus.

2. *CVCVBALVS* calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnudis. *Fl. Suec. 360.*

Cucubalus calycibus ovatis hermaphroditis. Fl. Lapp. 180.

Muscipula pratensis vesicaria. Hall. Jen. Rupp. 125.

Lychnis sylvestris, quæ Behen album vulgo. Baub. pin. 205.

Been album officinarum. Baub. hist. 3. p. 356.

Been album sive Polemonium. Dodon. pempt. 172.

Melandryum plinii quibusdam. Clus. hist. 1. p. 293.

Habitat circa Dornbach, Fischamentam, & Weinhaus alibique in montibus, & pratis siccioribus.

3. *CVCVBALVS* caule dichotomo, petalis quadrifidis. *Linn. Sp. pl. 415.*

Lychnis

Lychnis viscosa angustifolia major. *Bauh. pin. 205.*

Lychnis sylvestris X. *Clus. hist. 1. p. 291.*

Caryophyllus minimus humilis alter exoticus, flore candido amœno. *Lob. icon. 445.*

Habitat in alpe Breinina, & Schneealpen.

CUCUBALVS floribus dioicis, petalis setaceis indivisis.

Linn. Sp. pl. 415.

Lychnis viscosa, flore muscoso. *Bauh. pin. 206.*

Sesamoides magnum Salmanticum. *Clus. hist. 1. p. 295.*

Otites Tabern. *Hall. Jen. Rupp. 125.*

Habitat copiose in pascuis Fischamentensibus versus Enzersdorff sitis, & in vallo illo tempore assedii Viennensis a Turcis circa Weinhaus facto.

CUCUBALVS acaulis. *Linn. Sp. pl. 415.*

Lychnis alpina pumila, folio gramineo. *Bauh. pin. 206.*

Silene acaulis. *Fl. Lapp. 184. Fl. Suec. 368.*

Ocymoides muscosus *Pon. Bald. 341.*

Muscus alpinus lychnidis flore. *Bauh. hist. 3. p. 767.*

Habitat in alpe Breinina.

S I L E N E.

SILENE petalis bifidis, floribus lateralibus secundis cernuis, caule recurvato. *Linn. Sp. pl. 417.*

Silene foliis lanceolatis, caule paniculato, floribus nutantibus calyce striato, corolla involuta. *Fl. Suec. 366.*

Muscipula montana hirsuta. *Hall. Jen. Rupp. 125.*

Lychnis montana viscosa alba latifolia. *Bauh. pin. 205.*

Lychnis IX. *Clus. hist. 1. p. 291.*

Polemonium petræum Gesneri *Bauh. hist. 3. p. 351.*

Habitat inter Salmersdorff, & Weidling, alibique in dumetis & montibus passim.

SILENE calycibus decemangularibus: dentibus tubum æquantibus. *Linn. Sp. pl. 419.*

Cucubalus calycibus fructus ovatis erectis: angulis decem: alternis venosis. *Hort. Ups. 109.*

Lychnis noctiflora. *Bauh. pin. 205. Hall. Jen. Rupp. 116. Raj. hist. 994.*

Ocymoides noctiflorum. *Cam. hort. 109. t. 34.*

Ocymoides non speciosum. Baub. hist. 3.p. 344.

Habitat circa Dornbach, & ad sinistram viæ Nusdorffensis alibique.

Hospitatur ubique in hortis sub dio.

STELLARIA.

1. *STELLARIA* foliis cordatis petiolatis, pedunculis ramosis
Linn. Sp. pl. 421.

Alfine altissima nemorum. Baub. pin. 251. Boerhaav. Lugdb. 1. p. 208.

Alfine montana hederacea maxima. Col. nephr. 1. p. 289. t. 290.

Alfine major repens perennis. Baub. hist. 3.p. 362.

Alfine major. Dodon. pempt. 29.

Habitat passim in sylvis præsertim circa Murobacium, & in nemoribus insularum Danubialium.

2. *STELLARIA* foliis lanceolatis ferrulatis, petalis bifidis.
Linn. Sp. pl. 422.

Alfine foliis lanceolatis. Fl. Suec. 371.

Alfine pratensis gramineo folio ampliore. Tournef. inst. 243.

Caryophyllus holosteus arvensis, flore majore. Baub. pin. 210.

Holosteum. Lob. icon. 46.

Gramen. Fuchs. hist. 136.

Habitat in principio sylvæ Grinzingensis ea parte sitæ, quæ montem Kalenberg seu Cecium respicit, sicut etiam in pratibus Murobacensis locis umbrosis, & in fruticetis vallis Brühl retro Medling.

3. *STELLARIA* foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis. *Linn. Sp. pl. 422.*

Alfine pratensis gramineo folio angustiore. Tournef. inst. 243.

Caryophyllus arvensis glaber, flore minore. Baub. pin. 210.

Gramen floridum minus. Tabern. icon. 232.

Habitat in sepibus, seu inter frutices ad agrorum margines sitos juxta viam Dornbacensem.

A R E N A R I A.

ARENARIA foliis ovatis acutis petiolatis nervosis. *Fl.*

Suec. 374.

Arenaria plantaginis folio. *Hall. Jen. Rupp.* 113.

Spergula plantaginis folio. *Dill. Giff.* 58.

Alfene folio plantaginis chabræi 450. *Baub. hist.* 3. p. 364.

Habitat hinc inde in arvis præsertim in iis extra portam valli suburbici Viennensis ad St. Marcum dictam Simmering versus sitis.

ARENARIA foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce brevioribus. *Fl. Su.* 73.

Arenaria foliis subovatis acutis sessilibus. *Hort. Cliff.* 173.

Arenaria multicaulis serpillifolia. *Hall. Jen. Rupp.* 114.

Spergula multicaulis. *Dill. Giff.* 58.

Alfene minor multicaulis. *Baub. pin.* 251.

Alfene minor. *Fuchs.* 23.

Alfene minima. *Baub. hist.* 3. p. 364.

Habitat in agris, hortis, & muris passim, præsertim in mænis Viennensibus inter portam Stubensem, & Carinthiacam.

ARENARIA foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus. *Fl. Suec.* 376.

α. Arenaria campestris flore purpureo - cæruleo. *Hall. Jen. Rupp.* 113.

Spergula purpurea. *Baub. hist.* 3. p. 722. *Chabr.* 549.

Alfene spergulæ facie minor, sive spergula minor flosculo subcæruleo. *Baub. pin.* 251. *prodr.* 119.

Alfene petastemon, vaginulis ad foliorum ortum squalentibus. *Hall. helv.* 387.

β. Arenaria foliis linearibus longitudine internodiorum. *Hort. Cliff.* 173.

Arenaria maritima. *Hall. Jen. Rupp.* 113.

Spergula marina nostras. *Baub. hist.* 3, p. 772. *Raj. hist.* 1034.

Alfene spergulæ facie media. *Baub. pin.* 251.

Habitat *α.* in vallo suburbico Viennensi inter portam Hernalensem, & Lichtenthal. *β.* circa parvam Cellam Marianam varius, copiosius autem in pratis Latifontanis ad lacum Nischiteriensem multo sæpe ab incolis Zick dicto scatentem sitis, & per eundem sæpius inundatis.

4. *ARENARIA* foliis subulatis, caule paniculato, pedunculi simplicibus, capsulis erectis, petalis calyce brevioribus. *Linn. Sp. pl.* 424.

Alfine tenuifolia. Baub. hist. 3. p. 364. Vaill. paris. 7. t. 3 f. 1.

Habitat in monte Schneeberg.

5. *ARENARIA* foliis setaceis, caule superne nudiusculo calycibus subhirsutis. *Linn. Sp. pl.* 424.

Alfine alpina junceo folio. Baub. pin. 251. prodr. 118.

Lychnoides juniperifolio, perennis. Vaill. paris. 121.

Habitat in montibus Medlingensibus.

P E N T A G Y N I A.

C O T Y L E D O N.

1. *COTYLEDON* foliis subrotundis planis integerrimis. *Hort. Cliff.* 276.

Cotyledon africana frutescens, folio longo, & angusto, flore flavescente. Comm. rar. 23. t. 23.

Sedum Africanum frutescens incanum, foliis orbiculatis. Herm. lugdb. 549. t. 551.

Sedum arborescens promontorii bonæ spei. Stapel. 335. Breyn. prodr. 47.

Hospitatur passim in hortis magnatum, & curiosorum æstate in areis, hyeme in frigidariis, vel caldariis, præsertim in horto S. P. de Schwarzenburg Viennæ, & in horto Domini Maximiliani in platea Alstergassen ibidem, sicut etiam in horto Gersthoofensi olim Domini de Lama, & in horto Leytæpontano Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

S E D U M.

1. *SEDUM* foliis planiusculis ferratis, corymbo folioso, caule erecto. *Linn. Sp. pl.* 430.

Sedum foliis planiusculis patentibus ferratis, corymbo terminali. Fl. Suec. 386.

Fabaria officinarum. Hall. Fl. Jen. Rupp. 128.

Telephium vulgare. Baub. pin. 287.

Telephium album. Fuchs. hist. 800.

Telephium alterum, five *Crassula*. *Dodon. pempt. 130.*
Anacampseros vulgo Faba crassa. *Baub. hist. 3. p. 681.*
Tournef. inst. 264.

Habitat in locis siccissimis ad agrorum, & vinearum margines, præsertim supra Nussdorff in montis petrosi parte Septentrionem respiciente, & ad vineas Julaschienses, ac Leytæpontanas.

SEDUM foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, Cyma ramosa. *Fl. Suec. 387.*

Sedum minus teretifolium album. *Baub. pin. 283. Hall. Jen. Rupp. 128.*

Sedum minus folio longiusculo, tereti. *Baub. hist. 3. p. 690.*

Vermicularis f. illecebra major. *Lob. hist. 205.*

Sempervivum minus alterum. *Dodon. pempt. 129.*

Habitat in petris, & muris passim præsertim in mœniis Vienneis, & Leytæpontanis.

SEDUM foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. *Fl. Suec. 389.*

Sedum parvum acre flore luteo. *Baub. hist. 3. p. 694. Hall. Jen. Rupp. 128.*

Sedum minus Vill. causticum. *Clus. hist. 2. p. 111.*

Sempervivum minus vermiculatum acre. *Baub. pin. 283.*

Illecebra f. sempervivum tertium. *Dodon. pempt. 129.*

Habitat passim in collibus, muris, & agrorum vinearumque limitibus siccissimis, præsertim inter Salmersdorff, & Weidling, circa Grinzing, supra Petersdorff, & circa Dornbach.

OXALIS.

OXALIS scapo unifloro, foliis ternatis, radice squamoso-articulata. *Fl. Suec. 385.*

Oxalis foliis ternatis, scapo unifloro. *Fl. lapp. 194.*

Oxys flore albo. *Tournef. inst. 88.*

Acetofella vulgaris, & officinarum. *Hall. Jen. Rupp. 127.*

Trifolium acetosum vulgare. *Baub. pin. 330.*

Trifolium acetosum. *Dodon. pempt. 578.*

Habitat in Tabor, circa Grinzing, & Weidling, circa Latifontum, alibique in sylvis passim.

A G R O S T E M M A.

1. AGROSTEMMA hirsuta, calycibus corollam æquantibus, petalis integris nudis. *Linn. Sp. pl.* 435.

Agrostemma. Fl. Suec. 383.

Nigellastrum. Dodon. pempt. 173.

Pseudo-Mclanthium. Dalech. hist. 438.

Lychnis segetum major. Bauh. pin. 204.

Githago. Trag. hist. 128.

Lolium. Fuchs. hist. 127.

Habitat ubique inter segetes.

2. AGROSTEMMA tomentosa, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. Ups.* 115.

Lychnis coronaria Dioscoridis sativa. Bauh. pin. 203.

Lychnis coronaria. Dodon. pempt. 170. *Lob hist.* 181.

Hospitatur passim in hortis vel sub dio hyeme stramine tecta, vel in frigidariis tempore hyemali, præsertim in horto Excellentissimi Comitum Ernesti ab Harrach Leytæponti.

L Y C H N I S.

1. LYCHNIS floribus fasciculatis fastigiatis. *Hort. Ups.* 115.

Lychnis hirsuta, flore coccineo major. Bauh. pin. 203.

Lychnis Chalcedonica miniata. Lob hist. 183.

Flos Constantinopolitanus. Dodon. pempt. 178.

Hospitatur sub dio ubique in hortis.

2. LYCHNIS petalis quadrifidis, fructu subrotundo. *Hort. Cliff.* 174. *Fl. Suec.* 384.

Caryophyllus pratensis, flore laciniato simplici, seu Flos cuculi Bauh. pin. 210.

Armerius sylvestris. Dodon. pempt. 177.

Odontites plinii simplici flore. Clus. hist. 1. p. 292.

Habitat in pratis subhumidis ubique, præsertim circa Leytæpontum, & Fischamentam.

3. LYCHNIS petalis integris. *Linn. Sp. pl.* 436.

Silene floribus pentagynis, capsulis quinquelocularibus. Fl. Suec. 364.

Viscaria Rivini. Hall Jen. Rupp. 126.

Lychnis sylvestris viscosa rubra angustifolia. Bauh. pin. 205. *Boerhaav. lugdb.* 1. p. 212.

Lychnis sylvestris IV. Clus. hist. 1. p. 289.

Odontidi, five flori cuculi affinis, *Lychnis sylvestris* L.

Clus. Pann. 4. Baub. hist. 3. p. 348.

Habitat passim in montanis præsertim supra Dornbach, circa Meding, Baden, & Latirontum.

LYCHNIS floribus dioicis. *Linn. Sp. pl. 437.*

Cucubalus floribus dioicis. *Fl. Suec. 361.*

Cucubalus caule composito calycibus ovato oblongis.

Fl. lapp. 182.

Lychnis sylvestris f. *aquatica* purpurea simplex. *Baub. pin. 204.*

Melandium plinii genuinum. *Clus. hist. 1. p. 294.*

β. *Cucubalus* floribus hermaphroditis pentagynis, capsulis unilocularibus. *Hort. Cliff. 170.*

Lychnis sylvestris alba simplex. *Baub. pin. 204.*

Habitat passim in locis gramineis hortorum, & in pratis præsertim circa Dornbach, Döbling, & Leytæpontum ubi β. sæpius occurrit.

CERASTIVM.

CERASTIVM erectum villoso-viscosum. *Fl. Suec. 379.*

Cerastium corolla calyci æquali. *Fl. lapp. 193.*

Cerastium hirsutum viscosum. *Dill. Giss. 41.*

Myosotis hirsuta altera viscosa. *Tournef. inst. 245. Vaill. paris. 142. t. 30. f. 1.*

Alsine hirsuta altera viscosa. *Baub. pin. 251.*

Habitat passim in arvis, ad vias circa Viennam nec non ad vallum suburbicum Viennensem inter Hernals, & Lichtenthal, ac Lerchenfeld.

CERASTIVM foliis lineari-lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce majoribus. *Fl. Suec. 381.*

Cerastium foliis calycibusque hirsutis. *Hort. Cliff. 174.*

Myosotis arvensis hirsuta, flore majore. *Tournef. inst. 245. Vaill. paris. 141. t. 30. f. 4.*

Caryophyllus arvensis hirsutus, flore majore, *Baub. pin. 210.*

Holosteum Caryophyllæum. *Tabern. icon. 233.*

Habitat passim cum priore, præsertim inter Hernals & Dornbach ad agrorum limites, & in pomariis, ac cultis circa Leytæpontum.

CERASTIVM foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, fructibus pendulis. *L. v. Sp. pl. 439.*

Alfine major. *Baub. pin. 250.*

Alfine maxima solanifolia. *Mentz. pug. 2. t. 1. f. 3.*

Habitat in insulis Danubialibus, præsertim in Tabor ad dextram, & in prato Murobacensi, alibique.

S P E R G V L A.

1. SPERGULA foliis verticillatis, floribus decandris. *Fl. Suec. 377.*

Spergula fructu pendulo. *Fl. lapp. 190.*

Spergula. *Dodon. pempt. 537.*

Arenaria arvensis vulgatio. *Hall. Jen. Rupp. 112.*

Alfine spergula dicta major. *Baub. pin. 251.*

Habitat in agris passim.

2. SPERGULA foliis oppositis subulatis lævibus caulibus simplicibus. *Linn. Sp. pl. 440.*

Spergula foliis oppositis, pedunculis simplicibus. *Fl. Suec. 378.*

Spergula minor foliis Knawel flore majusculo albo. *Dill. Giff. 158.*

Arenaria palustris. *Hall. Jen. Rupp. 112.*

Arenaria. *Baub. hist. 3. p. 723.*

Alfine pusilla, folio capillaceo, flosculo albo. *Boerhaav. lugdb. 1. p. 209.*

Alfine arenaria dicta. *Vaill. paris. 7.*

Alfine nodosa germanica. *Baub. pin. 251.*

Polygonum foliis gramineis alterum. *Loef. pruss. 204. t. 64.*

Habitat in lapidicina Weinhausensis parte Occidentali.

D E C A G Y N I A.

P H Y T O L A C C A.

1. PHYTOLACCA foliis integerrimis. *Hort. Ups. 117.*

Phytolacca vulgaris. *Dill. elth. 318. t. 239. f. 309.*

Solanum racemosum americanum. *Pluk. alm. 353. t. 225. f. 3.*

Hospitatur passim in hortis sub dio.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA

MONOGYNIA.

ASARVM.

ASARVM foliis reniformibus obtusis binis. *Linn. Sp. pl.* 442.

Afarum foliis subcordatis petiolatis. *Fl. Suec.* 392.

Afarum. *Baub. pin.* 197. *Dodon. pempt.* 358. *Cam. epit.* 19.

Habitat ultra Dornbach, inter Salmersdorff & Weidling, circa Murobadium, Mannersdorff, & Leytæpontum, alibique in opacis.

PORTVLACA.

PORTVLACA foliis cuneiformibus, floribus sessilibus. *Hort. Ups.* 146.

Portulaca foliis cuneiformibus verticillatis sessilibus, floribus sessilibus. *Hort. Cliff.* 207.

Portulaca angustifolia sylvestris. *Baub. pin.* 288.

β Portulaca latifolia sativa. *Baub. pin.* 288.

Portulaca domestica. *Lob. icon.* 388.

Habitat in arvis, & ruderatis passim, præsertim circa Perschling, & in horto Leytæpontano Excellentissimi Domini Comitis Ernesti ab Harrach. β. in eodem horto olim sata.

Hospitatur autem β. ubique in hortis oleraceis sub dio.

LYTHRVM.

LYTHRVM foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris. *Linn. Sp. pl.* 446.

Lythrum foliis oppositis. *Fl. Suec.* 393.

Lythrum floribus verticillatis. *Fl. lapp.* 197.

Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis. *Tournef. inst.* 253.

Lyfimachia spicata purpurea. *Baub. pin.* 246.

Lyfimachia purpurea communis major. *Clus. hist. 2. p. 51.*

Habitat *passim ad fluxum Leyta dictum, ad rivulum vallis Döblingensis, ad rivulum prati Murobacensis, circa Neapolim Austriæ, alibique in fossis, & ad ripas fluviorum.*

2. *LYTHRUM* foliis alternis linearibus, floribus hexandris. *Hort. Ups. 118.*

Lythrum foliis alternis. *Hort. Cliff. 178.*

Salicaria Hyssopi folio latiore. *Hall. Jen. Rupp. 147. t. vj. Tournef. inst. 253.*

Hyssopifolia *Baub. pin. 218.*

Habitat *supra Burckersdorff in uliginosis ad primum rivulum, qui ex montibus in torrentem Viennensem fluit.*

D I G Y N I A.

A G R I M O N I A.

1. *AGRIMONIA* foliis caulinis pinnatis, fructibus hispidis. *Linn. Sp. pl. 448.*

Agrimonia foliis omnibus pinnatis fructibus hispidis. *Fl. Suec. 394. Hort. Ups. 118.*

Eupatorium veterum s. *Agrimonia.* *Baub. pin. 321.*

Eupatorium. *Fuchs. hist. 244. Cam. epit. 756.*

β. *Eupatorium odoratum.* *Baub. pin. 321.*

Habitat *passim in pratis circa Leytæpontum, & Viennam nec non ad margines sylvarum, præsertim in senticetis prati Murobacensis ubi etiam β. occurrit.*

T R I G Y N I A.

R E S E D A.

1. *RESEDA* foliis lanceolatis integris, calycibus quadrifidis. *Linn. Sp. pl. 448.*

Reseda foliis simplicibus lanceolatis integris. *Fl. Suec. 439.*

Luteola herba salicis folio. *Baub. pin. 100. Tournef. inst. 423.*

Lutum herba. *Dodon. pempt. 356.*

Pseudostruthium. Cam. epit. 356.

Habitat in sylva Dornbacensi, in valle Breinina, circa Grinzing & Leytæpontum, in vallo suburbico Viennensi, alibi-
bique ad vias, & ad pagos.

2. *RESEDA* foliis omnibus trifidis, inferioribus pinnatis.
Hort. Ups. 149.

Reseda vulgaris. Baub. pin. 100. Raj. hist. 1053.

Reseda lutea. Baub. hist. 3. p. 467.

Habitat ubique circa Leytæpontum, & Viennam, alibi-
que in montosis cretaceis.

EUPHORBIA.

1. *EUPHORBIA* aculeata nuda multangularis, aculeis gemi-
natis. *Hort. Ups. 138.*

Euphorbium Cerei effigie, caulibus crassioribus spinis
validioribus armatum. *Comm. hort. 1. p. 21. t. 11. Boer-
haav. lugdb. 1. p. 258.*

Euphorbium. Baub. pin. 387. Dodon. pempt. 378.

Hospitatur hinc inde in caldariis magnatum.

2. *EUPHORBIA* inermis imbricata tuberculis foliolo lineari
instructis. *Hort. Ups. 139.*

Tithymalus aizoides africanus, simplici squamato caule,
chamænerii folio. *Comm. præl. 58. t. 8. & p. 23.
57. t. 7.*

Hospitabatur olim in caldario Favoritæ Videntis Viennæ a
Domino Zinner culta, qua nunc in Gymnasium mutata
quorsum delata fuerit ignoro.

3. *EUPHORBIA* umbella trifide dichotoma, involucellis ova-
tis, foliis integerrimis obovatis petiolatis. *Linn.
Sp. pl. 456.*

Euphorbia foliis obverse ovatis integerrimis, umbella
universali trifida triphylla, partialibus dichotomis
diphyllis. *Fl. Suec. 437.*

Esula rotundifolia non crenata. *Hall. Jen. Rupp. 272.*

Tithymalus parvus annuus, foliis subrotundis non cre-
natis *Peplus* dictus. *Raj. syn. 3. p. 256.*

Peplus s. *Esula rotunda. Baub. pin. 292.*

Peplus. Fuchs. hist. 603. Dodon pempt. 375.

Habitat in cultis oleraceis passim, præsertim Viennæ, & Ley-
tæponti.

4. *EUPHORBIA* umbella trifida: dichotoma, involucellis lanceolatis, foliis linearibus. *Linn. Sp. pl.* 456.

Euphorbia inermis, foliis alternis linearibus acutis, umbella universali trifida, partialibus dichotomis diphyllis. *Hort. Upf.* 143.

Tithymalus f. *Esula* exigua. *Baub. pin.* 291.

Esula minima Tragi. *Dalech. hist.* 1656.

- β. *Tithymalus* f. *Esula* exigua foliis obtusis. *Baub. pin.* 291. *prodr.* 132.

Habitat in cultis, & agris passim. β. circa lapidicinam Dornbacensem.

5. *EUPHORBIA* umbella quadrifida: dichotoma, foliis oppositis integerrimis. *Linn. Sp. pl.* 457.

Euphorbia inermis, foliis oppositis lanceolatis integerrimis, umbella universali quadrifida tetraphylla, ulterioribus dichotomis. *Hort. Cliff.* 140. *Mat. med.* 256.

Esula major Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 272.

Lathyris major. *Baub. pin.* 293.

Lathyris f. *Cataputia* minor. *Baub. hist.* 3. app. 880.

Habitat copiose in hortulo chirurgi Leytæpontani olim sata.

6. *EUPHORBIA* umbella quinquefida: bifida, involucellis subovatis, foliis lanceolatis obtusis integerrimis. *Linn. Sp. pl.* 457.

Tithymalus montanus non acris. *Baub. pin.* 292.

Pityusa f. *Esula* minor altera, floribus rubris. *Lobel. icon.* 358.

Habitat circa Fischamentam hinc inde in agris ast rarius.

7. *EUPHORBIA* umbella quinquefida: trifida: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus ferratis. *Linn. Sp. pl.* 459.

Euphorbia foliis crenatis, umbella universali quinquefida pentaphylla, partialibus trifidis, propriis triphyllis. *Fl. Suec.* 436.

Euphorbia inermis, foliis subrotundis crenatis. *Fl. lapp.* 220.

Esula solifera. *Hall. Jen. Rupp.* 272.

Tithymalus helioscopius. *Baub. pin.* 291. *Cam. epit.* 963.

Habitat in arvis, & cultis passim circa Viennam, & Leytæpontum.

8. *EUPHORBIA* umbella quinquefida: subquadrifida: dichotoma, involucellis primariis tetraphyllis, foliis ferratis lanceolatis sessilibus. *Linn. Sp. pl.* 460.

Euphor-

Euphorbia inermis, foliis alternis lanceolatis amplexicaulibus subferratis, umbella universali quinquefida pentaphylla, partialibus bifidis. *Hort. Ups.* 141.

Esula latifolia arvensis. *Hall. Jen. Rupp.* 272.

Tithymalus arvensis latifolius germanicus. *Bauh. pin.* 291.

Tithymalus platyphyllos. *Fuchs. hist.* 813.

Habitat passim in agris circa Viennam, præsertim in Dras-kirchenibus, & Leytæpontanis.

EUPHORBIA umbella multifida: dichotoma, involucellis subcordatis, petalis subbicornibus, ramis sterilibus foliis uniformibus. *Linn. Sp. pl.* 461.

Euphorbia inermis, foliis lanceolato-linearibus, involucri universalis foliis quinis ovato-acutis, partialis semiorbiculatis. *Hort. Ups.* 141.

Esula minor. *Dalech. hist.* 1653. *Dodon. pempt.* 374.

Habitat in campestribus, & agrorum limitibus passim, sicut etiam in vallo suburbico Viennensi retro hortum olim S. P. Eugenii.

O. EUPHORBIA umbella multifida: dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus foliis setaceis, caulinis lanceolatis. *Linn. Sp. pl.* 461.

Euphorbia inermis, foliis confertis linearibus, umbella universali multifida, partialibus dichotomis: foliolis subrotundis. *Hort. Ups.* 142.

Esula Rivini, & officinarum. *Hall. Jen. Rupp.* 271.

Tithymalus cyparissias. *Bauh. pin.* 291. *Dalech. hist.* 1644.

Tithymalus cupressinus. *Tabern. hist.* 990. *Lob. icon.* 356.

Habitat passim in campis, montosis, insulisque Danubialibus, & in ipso vallo suburbico Viennensi.

I. EUPHORBIA umbella multifida: bifida, involucellis ovatis, foliis laceolatis, ramis sterilibus. *Linn. Sp. pl.* 462.

Euphorbia foliis lanceolatis, umbella universali multifida polyphylla, partialibus trifidis triphyllis, propriis dichotomis. *Fl. Suec.* 438.

Tithymalus palustris fruticosus. *Bauh. pin.* 292.

Esula major. *Dalech. hist.* 1653. *Dodon. pempt.* 374.

Habitat inter arundines circa Neapolim Austriæ.

2. EUPHORBIA umbella sexfida: dichotoma, involucellis ovalibus, foliis integerrimis, ramis nullis, capsulis verrucosis. *Linn. Sp. pl.* 462.

Tithymalus latifolius hispanicus. *Baub. pin. 291. Tabern. hist. 987.*

Tithymalus hibernicus, vasculis muricatis erectis. *Dill. elth. 387. t. 290. f. 374.*

Habitat in monticulo regio inter Fischamentam, & Enzersdorff sito.

D O D E C A G Y N I A.

S E M P E R V I V V M.

1. *SEMPERVIVUM* caule arborecente lævi ramoso. *Linn. Sp. pl. 464.*

Sempervivum caule inferne nudo lævi ramoso. *Hort. Usp. 118.*

Sedum majus arborescens flosculis candidis. *Baub. pin. 282.*

Sedum majus legitimum. *Clus. hist. 2. p. 58.*

Hospitatur passim in hortis magnatum, & curiosorum Viennæ, præsertim in horto S. P. de Schwarzenburg, ibidem & in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach Leytæponti æstate in arvis, & apricariis, hyeme in frigidariis.

2. *SEMPERVIVUM* foliis ciliatis, propaginibus patentibus. *Linn. Sp. pl. 464.*

Sempervivum foliis radicalibus carnosis ciliatis, caulibus imbricatis membranaceis, corymbo racemoso reflexo. *Fl. Suec. 395.*

Sempervivum tectorum majus. *Hall. Jen. Rupp. 165.*

Sempervivum majus alterum, sive Barba Jovis. *Dodon. pempt. 127.*

Sedum majus vulgare. *Baub. pin. 283.*

Habitat ubique in tectis muris.

3. *SEMPERVIVUM* foliis ciliatis, propaginibus globosis. *Linn. Sp. pl. 464.*

Sempervivum foliis radicalibus in globum congestis ciliatis, propaginibus globosis. *Hort. Cliff. 180.*

Sempervivum tectorum minus. *Hall. Jen. Rupp. 165.*

Sedum majus vulgari simile, globulis decidentibus. *Moris. hist. 3. p. 472. s. 12. t. 7. f. 18.*

Sedum vulgari magno simile. *Baub. hist. 3. p. 688.*

Habitat inter saxa in montibus Medlingensibus, & Petersdorffensibus, sicut etiam in alpe Breinina, & Schneeberg.

CLAS-

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA.

CACTVS.

CACTVS subrotundus tectus tuberculis ovatis barbatis.
Hort. Ups. 119.

Echino melocactus minor lactescens, tuberculis f. mammillis majoribus. *Herm. p. 136. t. 136.*

Ficoides f. Ficus americana sphaerica tuberculata lactescens, flore albo, fructu rubro pyramidalis. *Comm. hort. 1. p. 105. t. 55.*

Hospitatur aestate in apricariis, hyeme in caldariis Nobilium, & curiosorum passim, praesertim Viennae in horto S. P. de Schwarzenburg, & Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

CACTVS subrotundus quatuordecim-angularis. *Hort. Ups. 119.*

Melocactus Indiae occidentalis. *Baub. pin. 384.*

Echino Melocactus. *Clus. exot. 92. t. 92.*

Hospitatur cum priori.

CACTVS quadrangularis longus erectus: angulis compressis *Hort. Ups. 119.*

Cereus erectus minor, fructu spinoso, costarum numero varians. *Herm. par. 117.*

Hospitatur cum prioribus in horto S. P. de Schwarzenburg Viennae, & in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach Leytæponti.

CACTVS repens subquinquangularis. *Linn. Sp. pl. 367.*

Cactus scandens, angulis quinque pluribusque obtusis. *Hort. Ups. 121.*

Cereus americanus major articulatus, flore maximo nocte se aperiente f. suavissimum odorem spirante. *Volk. hesp. 1. p. 133. t. 234.*

Hospitatur cum prioribus, praesertim in horto Viennensi S. P. de Schwarzenburg, & in horto Leytæpontano Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach plerumque heptagonus.

5. *CACTVS* articulato - prolifer, articulis ovatis, spinis setaceis. *Linn. Sp. pl.* 468.

Cactus compressus articulatus ramosissimus, articulis ovatis: spinis setaceis *Hort. Ups.* 120.

Opuntia vulgo herbariorum. *Bauh. hist.* 1. p. 154.

Ficus Indica, folio spinoso, fructu majore. *Bauh. pin.* 458.

Hospitatur passim cum præcedentibus, & præsertim in horto Rohravienfi Excellentissimi Comitis Caroli ab Harrach, ac in horto Leytæpontano Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

PHILADELPHVS.

- I. *PHILADELPHVS* foliis subdentatis. *Linn. Sp. pl.* 471.

Philadelphus. *Hort. Ups.* 122.

Syringa alba f. *Philadelphus athenæi.* *Bauh. pin.* 399.

Frutex coronarius. *Clus. hist.* 1. p. 55.

Hospitatur passim in hortis sub dio, præsertim Leytæponti.

MYRTVS.

- I. *MYRTVS* floribus solitariis involucro diphylo. *Hort. Ups.* 123.

Myrtus communis italica. *Bauh. pin.* 468.

β. *Myrtus minor vulgaris.* *Bauh. pin.* 469.

Hospitatur passim in hortis Nobilium, & curiosorum, æstate in apricariis, hyeme in frigidariis præsertim Viennæ in horto S. P. de Schwartzenburg, & Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

PVNICA.

- I. *PVNICA.* *Hort. Ups.* 122.

Malus punica sylvestris. *Bauh. pin.* 438.

Malus punica fativa. *Bauh. pin.* 438.

Malus punica. *Cam. epit.* 130. 131.

β. *Balaustia* flore pleno majore, & minore. *Bauh. pin.* 438.

Hospitatur passim in hortis æstate in apricariis, hyeme in frigidariis.

AMYGDALVS.

AMYGDALVS foliorum ferraturis omnibus acutis. *Hort.*

Ups. 123.

Persica molli carne, & vulgaris. Baub. pin. 440.

Persica rubra. Cam. epit. 145.

Hospitatur ubique in hortis, & vineis sub dio.

AMYGDALVS foliis petiolatis: ferraturis infimis glandulosis. *Hort. Ups.* 123.

Amygdalus sylvestris. Baub. pin. 442.

β. Amygdalus fativa. Baub. pin. 441.

Amygdalus, Dodon. pempt 798.

γ. Amygdalus amara. Tournef. inst. 627.

Hospitatur passim in hortis sub dio. γ. præsertim in horto Stockiano, & in horto Domini de Götz in suburbio Viennæ.

PRVNVS.

PRVNVS floribus racemosis, foliis deciduis basi subtribus biglandulosis. *Linn. Sp. pl. 473.*

Padus glandulis duabus basi foliorum subjectis. Fl. Suec. 396.

Padus foliis annuis. Fl. lapp. 198.

Padus germanica folio deciduo. Hall. Jen. Rupp. 135.

Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli. Baub. pin. 451.

Cerasus racemosa quibusdam, aliis Padus. Baub. hist. 1. p. 228.

Cerasia nigra, racemosa. Tabern. icon. 988.

Habitat passim in sylvis, nemoribus, & ad sepes, præsertim circa Dornbach, Fischamentam, & Leytæpontum.

PRVNVS floribus racemosis, foliis semper virentibus dorso biglandulosis. *Linn. Sp. pl. 474.*

Padus glandulis duabus dorso foliorum innatis. Hort. Ups. 126.

Padus exotica, folio amplo, crasso semper virente, Hall. Jen. Rupp. 135.

Cerasus folio laurino. Baub. pin. 450.

Laurocerasus. Cus. hist. 1. p. 4. Cam. hort. t. 23. Tournef. inst. 627. t. 403. Bauh. hist. 1. p. 420.

Hospitatur hinc inde in hortis Nobilium, & curiosorum, præsertim Viennæ in horto Excellentissimi Comitis Ferdinandi ab Harrach, æstate in apricario, hyeme in frigidario.

3. *PRUNUS* floribus sessilibus, foliis subcordatis. *Linn. Sp. pl. 474.*

Prunus foliis ovato - cordatis. Hort. Ups. 124.

Mala armeniaca majora. Bauh. pin. 443.

Mala armenica majora, nucleo dulci. Bauh. pin. 442.

Malus armeniaca minor. Bauh. pin. 442.

Hospitatur ubique in hortis sub dio.

4. *PRUNUS* pedunculis simplicibus, foliis ovato - lanceolatis conduplicatis. *Linn. Sp. pl. 474.*

Cerasus foliis ovato - lanceolatis. Hort. Ups. 125.

Cerasus sylvestris ac major, fructu subdulci: nigro colore inficiente. Bauh. pin. 450.

β. Cerasus pumila. Bauh. pin. 450.

Habitat passim in sylvis. & ad pagos præsertim in valle Döblingensi, circa Dornbach, & in saltibus Leytæpontanis.

β. in vepretis, & ad sepes circa Dornbach, & Leytæpontum.

5. *PRUNUS* pedunculis simplicibus, foliis lanceolato-ovatis convolutis. *Linn. Sp. pl. 475.*

Prunus inermis, foliis lanceolato - ovatis. Hort. Ups. 124.

Prunus. Bauh. pin. 443.

Habitat passim in vineis, & ad pagos.

6. *PRUNUS* spinosa, foliis lanceolatis. *Fl. Suec. 397.*

Prunus sylvestris. Bauh. pin. 444. Tabern. icon. 992.

Habitat ubique in vepretis, sylvis, & vinearum marginibus, præsertim in insulis danubialibus Fischamentæ.

D I G Y N I A.

C R A T Æ G V S.

1. *CRATÆGVS* foliis ovatis inæqualiter ferratis subtus tomentosis. *Fl. Suec. 398.*

Cratægus folio subrotundo serrato subtus incano. Tournef. inst. 633.

Cratægus alpinus alni folio incano. Hall. Jen. Rupp. 136.
Mespilus alnifolio subtus incano, Aira Theophrasti.
Raj. Syn. 453.

Sorbus alpina. Baub. hist. 1. p. 65.

Alni effigie lanato folio major. Baub. pin. 452.

Habitat in montibus sylvestris circa Latifontum, in monticulo vallis Döblingensis, ac in ambulacro inter Trautmannsdorff, & Leytæpontum.

2. *CRATÆGVS foliis cordatis septangulis: lobis infimis divaricatis. Linn. Sp. pl. 476.*

Sorbus torminalis, & Cratægus Theophrasti. Baub. hist. 1. p. 63.

Sorbus torminalis. Cam. epit. 162.

Mespilus, apii folio, sylvestris non spinosus. Sorbus torminalis. Baub. pin. 454.

Habitat in monticulo regio Fischamentam inter & Enzersdorff, supra Weidling, in sylvis Leytæpontanis, latifontanis, Breininis, aliisque passim.

3. *CRATÆGVS foliis obtusis bitrifidis ferratis. Fl. Suec. 399.*

Mespilus apii folio sylvestris spinosa, f. Oxyacantha. Baub. pin. 454. Tournef. inst. 642.

Oxyacantha f. spina acuta. Dodon. pempt. 751.

Habitat ubique in vepretis, & marginibus sylvarum, præsertim in insulis danubialibus.

TRIGYNIA.

SORBUS.

1. *SORBUS foliis pinnatis utrinque glabris. Hall. belv. 250.*

Sorbus foliis pinnatis. Fl. Suec. 400.

Sorbus aucuparia. Baub. hist. 1. p. 62.

Sorbus sylvestris foliis domesticæ similibus. Baub. pin. 415.

Sorbus sylvestris, alpina. Lob. icon. 107.

Ornus. Dodon. pempt. 834.

Aucuparia Rivini. Hall. Jen. Rupp. 140.

Habitat in valle Breinina, & in ambulacro Ehrensbrunnensi, alibique.

2. *SORBUS foliis pinnatis subtus tomentosis. Hall. belv. 351.*

Sorbus. Dodon. pempt. 802.

Sorbus sativa. Baub. pin. 415.

Sorbus legitima. *Clus. hist. 1. p. 10.*

Habitat passim in pomariis rusticorum, & in vineis, præsertim circa Leytæpontum.

P E N T A G Y N I A.

M E S P I L V S.

1. MESPILVS inermis, foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, calycibus acuminatis. *Hort. Ups. 129.*

Mespilus germanica, folio laurino non serrato. *Baub. pin. 453.*

Mespilus. *Dodon. pempt. 801.*

β. Mespilus folio laurino major. *Baub. pin. 453.*

Hospitatur ubique in hortis.

2. MESPILVS inermis foliis ovalibus ferratis, cauliculis hirsutis. *Linn. Sp. pl. 478.*

Mespilus inermis, foliis ovalibus ferratis acutis. *Hort. Cliff. 189.*

Alni effigie lanato folio minor. *Baub. pin. 452.*

Vitis idæa. III. *Clus. hist. 1. p. 62.*

Habitat in montibus circa Petersdorff, Medling, & Baden.

3. MESPILVS foliis ovatis integerrimis. *Fl. Suec. 403.*

Mespilus folio subrotundo, fructu rubro. *Tournef. inst. 642.*

Chamæ Mespilus Gesneri. *Clus. hist. 1. p. 60.*

Chamæ Mespilus Cordi. *Baub. pin. 452.*

Cotoneaster folio rotundo non serrato. *Baub. pin. 452.*

Cotoneaster. *Baub. hist. 1. p. 73. Hall. Jen. Rupp. 137.*

Epimelis. *Dalech. hist. 198.*

Habitat in montibus circa Petersdorff, & Baden cum priore.

P Y R V S.

1. PYRVS foliis ferratis, floribus corymbosis. *Linn. Sp. pl. 1200.*

Pyrus foliis ferratis, pomis basi productis. *Fl. Suec. 401. Hort. Ups. 130.*

Pyrus sylvestris. *Baub. pin. 439. Dodon. pempt. 800.*

Habitat ubique fere in sylvis, præsertim in nemoribus insularum Danubialium.

2. PYRUS foliis ferratis umbellis sessilibus, *Linn. Sp. pl. 1200.*
 Pyrus foliis ferratis, pomis basi concavis. *Fl. Suec. 402.*
Hort. Ups. 130.

Malus sylvestris. *Baub. pin. 435. Dodon. pempt. 789.*

Habitat passim cum priore præsertim in insulis Danubialibus.

3. PYRUS foliis integerrimis. *Hort. Cliff. 160.*

Malus cotonea sylvestris. *Baub. pin. 435.*

β. Malus cotonea major. *Baub. pin. 434.*

γ. Malus cotonea minor. *Baub. pin. 434.*

Cotonea, & Cydonia. *Lob. hist. 580.*

Habitat hinc inde in vepretis, & jsepibus præsertim circa Dornbach, & Fischamentam.

Hospitatur β. & γ. ubique in hortis sub dio.

MESEMBRYANTHEMUM.

1. MESEMBRYANTHEMUM acaule, foliis linguiformibus altero margine crassioribus. *Hort. Ups. 128.*

β. Mesembryanthemum folio linguiformi latiore. *Dill. eltb. 236. t. 184. f. 225.*

Ficoides astra acaulos, foliis latissimis crassissimis lucidis conjugatis, flore aureo amplo sine pediculo. *Boerhaav. lugdb. 1. p. 292.*

Hospitatur æstate in apricario, hyeme in caldario horti Leytæpontani Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

SPIRÆA.

1. SPIRÆA foliis supradecompositis, spicis paniculatis, floribus dioicis. *Linn. Sp. pl. 490.*

Aruncus. *Hort. Cliff. 463. Gron. Virg. 121.*

Drymopogon Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 124.*

Drymopogon I. *Tabern. icon. 777.*

Ulmaria floribus in longas spicas congestis. *Boerhaav. lugdb. 1. p. 295.*

Barba capræ floribus oblongis. *Baub. pin. 163.*

Barba capræ. *Cam. hort. 26. t. 9.*

Habitat in valle Breinina, supra lapidicinam Rosenaviensem, ad molam sinistram non procul Alt Lembach, circa Christophen, in valle Clam. alibique in montanis.

2. SPIRÆA foliis pinnatis: foliolis uniformibus ferratis, caule herbaceo, floribus cymosis. *Linn. Sp. pl. 490.*

Fili.

Filipendula foliis pinnatis : foliolis uniformibus. *Fl. Suec.* 404.

Filipendula vulgaris. *Bauh. pin.* 162. *Tournef. inst.* 293.

Filipendula. *Dodon. pempt.* 56. *Cam. epit.* 603.

Oenanthe, Filipendula. *Lob. hist.* 420.

Habitat passim in pascuis & pratis, præsertim circa Fisehamen-
tam, & Leytæpontum, undique circa monticulum regium
Enzersdorffensem, circa Dornbach, in prato Muroba-
censi, inter Salmersdorff, & Weidling, alibique.

3. SPIRÆA foliis pinnatis, impari majore lobato, floribus
cymosis. *Linn. Sp. pl.* 490.

Filipendula folio impari majore trifido. *Fl. lapp.* 201.

Ulmaria. *Tournef. inst.* 265. *Clus. hist.* 2. p. 198. *Hall. Jen.*
Rupp. 101. *Bauh. hist.* 3. p. 488.

Barba Capræ floribus compositis. *Bauh. pin.* 164.

Regina prati. *Dodon. pempt.* 57.

Habitat circa Dras-Kirchen, in valle Breinina, in monte
Schneeberg, circa Altlembach in valle Clam, alibique in
pratis uliginosis, umbrosis.

P O L Y G Y N I A.

R O S A.

1. ROSA inermis, calycis foliolis indivisis, fructu oblōngo.
Hall. helv. 348.

Rosa sylvestris, odoratissimo rubro flore. *Bauh. pin.* 483.

Hospitatur passim in hortis sub dio.

2. ROSA caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus semi-
pinnatis. *Fl. Suec.* 406.

Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato. *Bauh.*
pin. 483.

Habitat passim in dumetis.

3. ROSA caule petiolisque aculeatis, calycis foliolis indivisis.
Fl. Suec. 407.

Rosa campestris spinosissima, flore albo odorato. *Bauh.*
pin. 483.

Rosa pumila spinosissima, foliis pimpinellæ glabris, flo-
re albo. *Bauh. hist.* 2. p. 40.

Habitat ad agrorum margines passim, præsertim inter Dornbach
& Hernals, ac circa Leytæpontum.

4. Ro-

4. Rosa caule aculeato, pedunculis hispidis, calycibus semipinnatis glabris. *Linn. Sp. pl. 491.*
Rosa multiplex media. Baub. pin. 482.
Rosa centifolia batavica H. Clus. hist. 1. p. 114.
Hospitatur passim in hortis sub dio.
5. Rosa caule aculeato, pedunculis lævibus, calycibus semipinnatis glabris. *Linn. Sp. pl. 492.*
Rosa alba vulgaris major. Baub. pin. 482.
Habitat hinc inde in vepretis, & ad initia sylvarum præsertim inter Latifontum, & Leytæpontum pleno autem flore.
Hospitatur passim in hortis.
6. Rosa caule aculeato, foliolis quinis glabris perennantibus. *Linn. Sp. pl. 492.*
Rosa semper virens Jungermanni. Clus. hist. 2. app. alt. Dill. elth. 326. t. 246. f. 318.
Rosa moschata semper virens. Baub. pin. 482.
Hospitatur in hortis magnatum, præsertim olim in horto Favoritæ Videntis Viennæ.

R V B V S.

1. R V B V S foliis quinato - pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Fl. Suec. 408.*
Rubus idæus spinosus. Baub. pin. 479.
Rubus idæus. Dodon. pempt. 743.
Habitat circa Dornbach, NUSDORFF, & copiose circa Burckersdorff.
2. R V B V S foliis ternatis nudis, caule aculeato. *Fl. Suec. 410.*
Rubus caule aculeato reflexo perenni, foliis ternatis. Fl. Lapp. 205.
Rubus repens, fructu cæsius. Baub. pin. 479.
Rubus minor, fructu cæruleo. Baub. hist. 2. p. 59.
Rubus minor. Dodon. pempt. 742.
Habitat in dumetis, & agris passim præsertim circa Rodaun, & in Insulis danubialibus Fischamentæ.
3. R V B V S foliis quinato - digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. *Fl. Suec. 409.*
Rubus vulgaris sive Rubus fructu nigro. Baub. pin. 479.
Rubus. Cam. epit. 751.
Habitat copiose circa Leytæpontum in vepretis alibique passim præsertim circa Dornbach, & Burckersdorff.

FRAGARIA.

1. FRAGARIA flagellis reptans. *Hort. Ups. 133. Fl. Suec. 414.*

Fragaria vulgaris. Baub. pin. 326. Fl. Lapp. 209.

β. *Fragaria fructu parvi pruni magnitudine. Baub. pin. 327.*

Habitat ubique in sylvis.

Hospitatur β. passim in hortis oleraceis.

POTENTILLA.

1. POTENTILLA foliis pinnatis ferratis, caule repente. *Fl. Lapp. 210. Fl. Suec. 415.*

Potentilla. Baub. pin. 321. Cam. epit. 758.

Argentina. Dodon. pempt. 600.

Pentaphylloides argentum alatum, seu Potentilla. Tournef. inst. 292.

Habitat ubique ad semitas, vias, ad ripas, inque pascuis depressis circa Viennam, Dornbach, & Leytæpontum.

2. POTENTILLA foliis pinnatis alternis: foliolis quinis ovatis crenatis, caule erecto. *Hort. Cliff. 193.*

Pentaphylloides erectum. Baub. hist. 2. p. 398.

Quinquefolium fragiferum. Baub. pin. 326. Clus. hist. 2. p. 107. N. v.

Habitat ad Leytaberg; in sylva supra Mannersdorff, sicut etiam inter Dornbach, & Neustift.

3. POTENTILLA foliis quinatis cuneiformibus incisus subtus tomentosus, caule erecto. *Linn. Sp. pl. 497.*

Potentilla foliis digitatis, caule erecto corymboso. Fl. Suec. 417.

Quinquefolium folio argenteo. Baub. pin. 325.

Pentaphyllum minus. Cam. epit. 760.

Habitat in monte vallis Döblingensis, in montibus petrosis circa Leytæpontum, supra Grinzing, in vallo suburbico Viennensi præsertim inter Hernals, & Lichtenthal, alibique.

4. POTENTILLA foliis radicalibus quinatis acute ferratis, caulinis ternatis, caule declinato. *Fl. Suec. 419.*

Quinquefolium minus repens aureum. Baub. pin. 325.

Quinquefolii quarti flavo flore secunda species. Clus. hist. 2. p. 106.

Pentaphyllum parvum hirsutum. Raj. hist. 612.

Habitat passim in pascuis siccis, copiose autem ad fossas sylvam Leytæpontanam ad Nosocomium spectantem cingentes.

5. *POTENTILLA* foliis digitatis apice conniventi-ferratis, caulibus filiformibus procumbentibus, receptaculis hirsutis. *Linn. Sp. pl.* 498.

Pentaphyllum I. majus albo flore. *Clus. hist.* 2. p. 105.

β. *Pentaphyllum* II. minus albo flore. *Clus. hist.* 2. p. 105.

Pentaphyllum argenteum alpinum flore albo. *Raj. hist.* 614.

Habitat in sylvosis circa Weidling, Dornbach, Pezlsdorff, & Leytepontum. β. inter saxa in summis jugis alpibus Breinæ, & Schneeberg.

T O R M E N T I L L A.

1. *TORMENTILLA* caule erecto. *Linn. Sp. pl.* 500.

Tormentilla. *Cam. epit.* 685. *Fl. Lapp.* 213. *Fl. Suec.* 421.

Tormentilla sylvestris. *Baub. pin.* 326.

Habitat circa Dornbach, Neustift, Claustro-Neoburgum, Murobadium, & in ipsis alpinis.

G E V M.

1. *GEVM* floribus erectis, fructu globoso: aristis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Fl. Suec.* 423.

Caryophyllata vulgaris. *Baub. pin.* 321.

Caryophyllata. *Dodon. pempt.* 137.

Habitat circa Dornbach, & Murobadium, in Tabor alibi in locis umbrosis.

2. *GEVM* floribus nutantibus, fructu oblongo: aristis plumosis. *Fl. Suec.* 424.

Geum rivale. *Gesn. hort.* 260. *Fl. Lapp.* 216.

Caryophyllata aquatica, nutante flore. *Baub. pin.* 321. *Hall. Jen. Rupp.* 108.

Caryophyllata alpina nutante flore. *Clus. hist.* 2. p. 103.

Caryophyllata Septentrionalium. *Lob. icon.* 694.

Habitat in locis udis montium Breininorum, alpisque Breinæ, Schneeberg, & Wexel.

3. *GEVM* flore erecto solitario, fructu oblongo: aristis plumosis. *Linn. Sp. pl.* 501.

Caryophyllata pinnis confertioribus extrema subrotunda, tubis erectis. *Hall. belv.* 336.

Caryophyllata alpina lutea. *Baub. pin.* 322.

Caryophyllata alpina aureo flore. *Clus. hist.* 2. p. 103.

Caryophyllata montana. *Cam. epit.* 727.

β. Caryophyllata alpina minor. *Baub. pin. 322. Prodr. 139.*
 Caryophyllata alpina minima, flore aureo. *Barr. var. 588.*
t. 399.

Caryophyllata alpina omnium minima. *Pon. Bald. 342.*
 Habitat in alpe Breinina, Wexel, & Schneeberg, β in sum-
 mis jugis alpis Breininæ, & Schneeberg perpetua fere nive
 obstitis, ubi omnium minima, & subinde plane a caulis reperitur.

D R Y A S.

I. DRYAS octopetala, foliis simplicibus. *Linn. Sp. pl. 501.*
 DRYAS, *Fl. Lapp. 215. Fl. Suec. 425.*

Caryophyllata alpina, chamædryosfolio. *Moris. hist. 2.*
p. 432. s. 4. t. 26. f. 9. Tournef. inst. 295. Raj. hist.
608. Syn. 3. p. 253.

Chamædryas alpina, cisti flore. *Baub. pin. 248.*

Chamædryas montana frutescens durior. *Lob. icon. 495.*

Chamædryas 3. five montana. *Clus. hist. 1. p. 351.*

Chamædryas alpina, flore fragariæ alba. *Baub. hist. 3. p.*
290.

Habitat sat copiose in alpe Breinina, & Schneeberg.

C O M A R V M.

I. COMARVM. *Fl. Lapp. 214. Fl. Suec. 422. Hall. belv. 337.*

Pentaphylloides palustre rubrum. *Tournef. inst. 298.*

Pentaphyllum palustre. *Cord. hist. 95.*

Quinquefolium palustre rubrum. *Baub. pin. 325.*

Habitat in pratis udis Fischamentensibus.

C L A S S I S XIII.

P O L Y A N D R I A

M O N O G Y N I A.

A C T Æ A.

I. A C T Æ A racemo ovato, fructibusque baccatis, *Linn. Sp.*
pl. 504.

Actæa. *Fl. Suec. 431. Hort. Ups. 138.*

Actæa

Actæa caule inermi. Fl. Lapp. 217.

Christophoriana vulgaris nostra racemosa, & ramosa.
Tournef. inst. 299.

Christophoriana. Clus. hist. 2. p. 86.

Aconitum bacciferum. Baub. pin. 182.

Habitat in monte, & sylva supra Grinzing, circa Dornbach,
& in valle Breinina.

CHELIDONIVM.

CHELIDONIVM pedunculis umbellatis. Linn. Sp. pl. 505.

Chelidonium pedunculis multifloris umbellatis. Fl. Suec.
430. Hort. Ups. 137.

Chelidonium majus vulgare. Baub. pin. 144.

Chelidonium majus. Fuchs. hist. 865.

Habitat ubique ad muros & sèpes, præsertim circa Leytæpontum.

CHELIDONIVM pedunculis unifloris, foliis amplexicauli-
bus sinuatis, caule glabro. Linn. Sp. pl. 506.

Chelidonium glabrum pedunculis unifloris. Hort. Ups.
137.

Glaucium flore luteo. Tournef. inst. 254.

Papaver corniculatum luteum. Baub. pin. 171.

Papaver corniculatum, flavo flore. Clus. hist. 2. p. 91.

Habitat hinc inde in pomariis præsertim Viennæ in suburbio via-
regia dicto in horto Rösleriano, & in horto Excellentis-
simi Comitis Ernesti ab Harrach Leytæponti.

CHELIDONIVM pedunculis unifloris, foliis sessilibus pin-
natifidis, caule hispido. Linn. Sp. pl. 506.

Glaucium hirsutum flore phœniceo. Tournef. inst. 254.

Papaver cornutum, phœniceo flore. Clus. hist. 2. p. 91.

Habitat copiosè in vallo suburbico Viennensi ad hortum olim
S. P. Eugenii, alibique in pomariis.

PAPAVER.

PAPAVER capsula hispida, scapo unifloro nudo hispido,
foliis bipinnatis. Linn. Sp. pl. 507.

Papaver perenne, pilis rigidissimis, foliis pinnatis, flo-
re hirsuto. Hall. helv. 304.

Argemone alpina, Coriandri folio. Baub. pin. 172.

Habitat in Schneeberg.

PAPAVER capsulis glabris globosis, caule piloso multi-
floro, foliis pinnatifidis incisis. Linn. Sp. pl. 507.

Papaver foliis pinnatifidis hispidis, fructu ovato. Fl.

Suec. 428.

Papaver erraticum majus. Baub. pin. 171.

Papaver rhoeas prius: Dalech. hist. 439.

β. Papaver erraticum minus. Baub. pin. 171.

Habitat ubique inter segetes, & in agrorum marginibus. β. in vallo suburbico Viennensi & in agris siccioribus.

3. *PAPAVER calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incis. Linn. Sp. pl. 508.*

Papaver caule multifloro, foliis simplicibus glabris incisis caulinis. Hort. Ups. 135.

Papaver hortense semine albo. Baub. pin. 170.

β. Papaver hortense, semine nigro. Baub. pin. 170.

Hospitatur passim in hortis sub dio.

ARGEMONE.

1. *ARGEMONE capsulis quinquevalvibus, foliis spinosis. Linn. Sp. pl. 508.*

Argemone. Hort. Ups. 135.

Papaver spinosum. Baub. pin. 171. prodr. 93. t. 92. Clus. hist. 2. p. 93.

Hospitatur sub dio in hortulo botanico fratris Honorii in suburbio Leopoldino apud FF. Misericordiæ Viennæ.

NYMPHÆA.

1. *NYMPHÆA calyce magno pentaphyllo. Fl. Lapp. 218. Fl. Suec. 426.*

Nymphæa lutea major. Baub. pin. 193. Clus. hist. 2. p. 77.

Nymphæa lutea. Cam. epit. 635.

Habitat in fossis Neapolis austriæ, in fluvio Leyta, alibique in piscinis & paludibus passim.

2. *NYMPHÆA foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. Linn. Sp. pl. 510.*

Nymphæa alba major. Baub. 193.

Nymphæa alba. Dodon. pempt. 585.

Habitat passim cum præcedente.

TILIA.

1. *TILIA floribus nectario destitutis. Linn. Sp. pl. 514.*

Tilia. Fl. Suec. 432. Dodon. pempt. 838.

Tilia

- Tilia fœmina*, folio majore. *Baub. pin.* 426.
 β. *Tilia montana* maximo folio. *Baub. pin.* 426.
 γ. *Tilia fœmina* folio minore. *Baub. pin.* 426.
Habitat passim in sylvis, pratis & hortorum ambulacris.

C I S T V S.

1. *Cistus* arborescens, foliis ovatis petiolatis utrinque hirsutis, alis nudis. *Linn. Sp. pl.* 524.
Cistus fœmina folio salviæ. *Baub. pin.* 464.
Cistus fœmina. *Clus. hist.* 1. p. 60.
Hospitatur in horto olim Favoritæ Videntis a Domino Zinner culta.
2. *Cistus* suffruticosus exstipulatus procumbens, foliis oppositis villosis subtus tomentosis. *Linn. Sp. pl.* 525.
Chamæcistus foliis myrti minoris incanis. *Baub. pin.* 466.
Chamæcistus foliis myrti Tarentinæ canis, & cinereis. *Baub. hist.* 2. p. 18.
Chamæcistus III. *Clus. hist.* 1. p. 74.
Habitat in monte Cecio seu Kalen- aut Gallenberg, & in monte Hamburgensi, alibique.
3. *Cistus* suffruticosus stipulatus, foliis oblongis, calycibus lævibus. *Linn. Sp. pl.* 527.
Chamæcistus serpilli folio nigricante, & hirsuto, flore aureo odorato. *Baub. hist.* 2. p. 17.
Chamæcistus II. *Clus. hist.* 1. p. 73.
Habitat in alpe Breinina.
4. *Cistus* suffruticosus procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis subpilosis. *Linn. Sp. pl.* 528.
Cistus stipulis quaternis, foliis oblongis utrinque nudis caule procumbente. *Fl. Suec.* 433.
Chamæcistus vulgaris flore luteo. *Baub. pin.* 460. *Loes. pruss.* 43. t. 8.
Flos solis, Panax chironium. *Cam. epit.* 501.
Helianthemum germanicum. *Tabern. icon.* 1062.
Helianthemum vulgare flore luteo. *Tournef. inst.* 249.
Habitat supra Petersdorff versus Gishübel, supra Grinzing, circa Dornbach, & Murobacium, ac passim in pascuis siccis, & in agrorum marginibus elatioribus juxta vias publicas.

DIGYNIA.

PÆONIA.

1. PÆONIA. *Hort. Ups.* 149.

α. Pæonia foliis difformiter lobatis. *Hall. herb.* 311.

Pæonia communis seu fœmina. *Baub. pin.* 323.

Pæonia fœmina. *Fuchs. hist.* 202. *Lob. icon.* 602.

β. Pæonia foliis lobatis ex ovato-lanceolatis. *Hall. herb.* 311.

Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas. *Baub. pin.* 323.

Pæonia mas. *Lob. icon.* 684.

Hospitatur passim in hortis sub dio.

TRIGYNIA.

DELPHINIUM.

1. DELPHINIUM nectariis monophyllis, caule subdiviso. *Fl. Suec.* 440.

Delphinium segetum, flore cæruleo. *Tournef. inst.* 426.

Consolida regalis arvensis. *Baub. pin.* 142.

Consolida regalis. *Cam. epit.* 521.

Flos regius sylvestris. *Dodon. pempt.* 252.

Habitat ubique inter segetes, ad agrorum margines, & in vallo suburbico Viennensi.

2. DELPHINIUM nectariis monophyllis, caule simplici. *Hort. Ups.* 150.

Consolida regalis hortensis, flore majore, & simplici. *Baub. pin.* 142.

Consolida regalis flore majore, & multiplici. *Baub. pin.* 142.

Consolida regalis hortensis flore minore. *Baub. pin.* 142.

Flos regius. *Dodon. pempt.* 531.

Hospitatur passim in hortis sub dio.

3. DELPHINIUM nectariis diphyllis, foliis palmatis: lobis integris. *Hort. Ups.* 150.

Staphisagria. *Baub. pin.* 324. *Dodon. pempt.* 366.

Hospitatur sub dio in hortulo botanico fratris honorii in suburbio Viennensi Leopoldino, ex montibus Silesiam, a Moravia, ac Bohemia distinguuntibus vulgo Riesengebürg, dictis, ubi habitat, allata, & seminibus propagata.

ACONITUM.

ACONITUM foliis palmatis multifidis villosis. *Linn. Sp. pl.* 532.

Aconitum foliis peltatis multifidis petalo supremo cylindraceo. *Fl. Lapp.* 211. *Fl. Suec.* 441.

Aconitum lycoctonum luteum. *Bauh. pin.* 183.

Aconitum II. *Cam. epit.* 827.

Napellus flore luteo Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 290.

Habitat supra Grinzing ad radices montium, & ad latera alpium, præsertim Breininæ,

ACONITUM foliorum laciniis linearibus superne latioribus linea exaratis. *Fl. Suec.* 442.

Aconitum cæruleum f. Napellus. I. *Bauh. pin.* 183.

Napellus verus. *Lob. hist.* 387.

Napellus. *Dodon. pempt.* 442.

Napellus flore minore Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 290.

Habitat copiosè in alpe Breinina.

PENTAGYNIA.

AQUILEGIA.

AQUILEGIA nectariis incurvis. *Hort. Ups.* 152.

Aquilegia sylvestris. *Bauh. pin.* 144.

β. Aquilegia hortensis simplex. *Bauh. pin.* 144.

γ. Aquilegia hortensis multiplex flore magno. *Bauh. pin.* 144.

ε. Aquilegia flore roseo multiplici. *Bauh. pin.* 144.

Habitat circa Murobacium, in monticulo regio Fischamentensi, in sylva sita inter Leytæpontum & Enzersdorff, alibique in nemoribus saxosis. β. γ. ε. hospitantur passim in hortis sub dio.

NIGELLA.

NIGELLA floribus involucro folioso cinctis. *Hort. Ups.* 153.

Nigella angustifolia, flore majore simplici cæruleo. *Bauh. pin.* 145.

Melanthium Sylvestre. *Math. Diosc.* 529. *Lob. icon.* 741.

Melanthium Damascenum. *Dodon. pempt.* 304.

β. *Nigella flore majore pleno cæruleo. Baub. pin. 145.*

Melanthium Damascenum, flore pleno. Clus. hist. 2. p. 207. t. 208.

Hospitatur passim in hortis sub dio.

2. *NIGELLA* pistillis quinis, petalis integris, capsulis turbinatis. *Linn. Sp. pl. 535.*

Nigella arvensis cornuta. Baub. pin. 145.

Melanthium sylvestre alterum. Cam. epit. 553,

Habitat ubique in agris circa Leytæpontum præsertim copiose juxta semitam, quæ Nischiterium ducit, non procul a domo Venatoris Leytæpontani, & passim alibi in arvis.

P O L Y G Y N I A.

A N E M O N E.

1. *ANEMONE* foliis trilobis integerrimis. *Linn. Sp. pl. 538.*

Hepatica. Fl. Suec. 445. Hort. Ups. 155.

Hepatica flore simplici cæruleo. Hall. Jen. Rupp. 159.

Hepatica trifolia cæruleo flore. Clus. hist. 2. p. 247.

Trifolium hepaticum flore simplici. Baub. pin. 330.

Trinitas. Cam. epit. 585. Hall. belv. 320.

Ranunculus tridentatus, vernus, flore simplici cæruleo.

Tournef. inst. 286.

β. *Hepatica flore simplici rubro. Cels. Ups. 17.*

γ. *Hepatica flore simplici albo. Cels. Ups. 16.*

Habitat in sylvis lapidosis circa Hiedldorff, Burckersdorff, & Dornbach. β. & γ. in monte Cecio seu Kalenberg, aut Gallenberg cum priore.

2. *ANEMONE* pedunculo involucrato, petalis rectis, foliolis bipinnatis. *Linn. Sp. pl. 539.*

Pulsatilla foliis decompositis pinnatis, flore nutante: limbo erecto. Fl. Suec. 446.

Pulsatilla folio crassiore, & majore flore. Baub. pin. 177.

Pulsatilla. Cam. epit. 398. Dodon. pempt. 433.

Pulsatilla vulgaris dilutiore flore. Clus. hist. 1. p. 246.

Habitat supra lapidicinam Dornbacensem, inter Leytæpontum & lapidicinam cæsaream vulgo Kaisersteinbruch, circa Schwechat & Grinzing, ac passim alibi in campis sylvestribus exaridis, collibusque apricis.

3. *ANEMONE* pedunculo involucrato, petalis apice reflexis foliis bipinnatis. *Linn. Sp. pl. 539.*

Pul.

Pulsatilla foliis decompositis pinnatis, flore pendulo :
limbo reflexo. *Fl. Suec.* 447.

Pulsatilla flore minore nigricante. *Baub. pin.* 177.

Pulsatilla vulgaris saturatiore flore. *Clus. hist.* 1. p. 246.

Pulsatilla altera. *Dodon. pempt.* 433.

Habitat in monte Cecio seu Kalenberg, supra Grinzing,
circa Dornbach, & undique circa Leytæpontum in apricis
& aridis.

• *ANEMONE* foliis radicalibus ternato - decompositis, invo-
lucro folioso. *Linn. Sp. pl.* 539.

Pulsatilla foliis decompositis ternatis. *Hort. Ups.* 155.

Anemone tenuifolia, simplice flore. *Baub. pin.* 174.

β. *Anemone* tenuifolia multiplex rubra. *Baub. pin.* 176.

Hospitatur passim in hortis.

• *ANEMONE* foliis caulinis ternatis connatis supradecom-
positis multifidis, feminibus hirsutis caudatis. *Linn.*
Sp. pl. 539.

Anemone sylvestris II. *Clus. hist.* 1. p. 245.

Pulsatilla flore albo. *Baub. pin.* 177. *Lob. icon.* 282.

Habitat in Elscher, & alpe Durrenstein.

• *ANEMONE* pedunculo nudo, feminibus subrotundis hir-
sutis. *Linn. Sp. pl.* 540.

Anemone feminibus hirsutis. *Fl. Suec.* 449.

Anemone sylvestris alba major. *Baub. pin.* 176. *Hall.*
Jen. Rupp. 161.

Anemone sylvestris I. *Clus. hist.* 1. p. 244.

Anemone IV. *Dodon. pempt.* 434.

Anemone magna alba plurima parte anni florens. *Baub.*
hist. 3. p. 411.

Habitat in monte supra Lapidicinam Dornbacensem, circa
Döbling, Dornbach, & Gersthoof, alibique in col-
libus & agrorum marginibus.

• *ANEMONE* feminibus acutis, foliolis incis, caule uniflo-
ro. *Fl. Suec.* 450.

Anemone nemorosa flore majore. *Baub. pin.* 176.

Anemone V. *Dodon. pempt.* 435.

Anemonoides flore albo. *Boerhaav. Lugdb.* 1. p. 36.

Anemonoides flore majore. *Dill. Gifs.* 39. *Gen. nov.* 107.

Nemorosa flore roseo albo expanso. *Hall. Jen. Rupp.*
160.

Ranunculus sylvarum. *Clus. hist.* 1. p. 247.

Ranunculis phragmites albus vernus. *Tournef. inst.* 285.
Habitat in sylvis supra Petersdorff, circa Hiedldorff, Burckersdorff, & Dornbach.

8. ANEMONE feminibus acutis, foliolis incisis, petalis subrotundis, caule subbifloro. *Linn. Sp. pl.* 541. *Fl. Suec.* 451.

Anemonoides flore luteo bino, & terno. *Boerhaav. Lugdb.* 1. p. 36.

Anemone - Ranunculus flore luteo. *Dill. Giff.* 39. *Gen. nov.* 107.

Nemorosa flore minore, luteo, modo unico, modo gemello, modo terno. *Hall. Jen. Rupp.* 161.

Ranunculus nemorosus luteus. *Bauh. pin.* 178. *Lob. icon.* 674.

Ranunculus phragmites luteus nemorosus. *Bauh. hist.* 3. p. 413.

Habitat in valle Döblingensi, in sylva Burckersdorffensi, & Dornbacensi, alibique in nemoribus.

9. ANEMONE floribus umbellatis, feminibus depresso-ovalibus nudis. *Linn. Sp. pl.* 542.

Anemone multiflora, semine lævi latissimo, petalis senis ex rotundo acutis. *Hall. helv.* 30.

Ranunculus montanus hirsutus humilior narcissi flore. *Bauh. pin.* 182

Ranunculi montani 2. species altera. *Clus. hist.* 1. p. 235.

Habitat in alpe Breinina, & Schneeberg.

CLEMATIS.

1. CLEMATIS foliis compositis decompositisque, foliolis ovatis integerrimis. *Hort. Cliff.* 225.

Clematis cæruleo vel purpurea repens. *Bauh. pin.* 300.

Clematis altera. *Clus. hist.* 1. p. 122.

Clematis cærulea, flore pleno. *Bauh. pin.* 300.

Hospitatur hinc inde in hortis Viennæ sub dio, præsertim in horto Domini Gansl non procul ab ecclesia ad St. Carolum dicta, sito.

2. CLEMATIS foliis pinnatis, foliolis cordatis scandentibus. *Linn. Sp. pl.* 544.

Clematis latifolia integra. *Bauh. hist.* 2. p. 125.

Clematis tertia. *Cam. epit.* 697.

β. Cle-

β. *Clematis latifolia dentata*. *Baub. hist.* 2. p. 125.

Vitalba. *Dodon. pempt.* 404.

Habitat passim in sepibus & dumetis, præsertim insularum danubialium circa Fischamentam, in Brader, circa Murobacium ad margines vinearum Prellekirchensium, alibique β. in Tabor, in valle Breinina, & passim alibi cum præcedente.

CLEMATIS foliis pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, caule erecto. *Hort. Ups.* 155.

Flammula recta. *Baub. pin.* 300.

Flammula altera. *Dodon. pempt.* 406.

Flammula. *Cam. epit.* 698. *Clus. hist.* 1. p. 124.

Habitat in monticulo regio Fischamentam inter & Enzersdorff, sito, passimque in insulis danubialibus.

CLEMATIS foliis simplicibus ovato-lanceolatis. *Hort. Ups.* 156.

Clematis cærulea erecta. *Baub. pin.* 300.

Clematis cærulea pannonica. *Clus. hist.* 1. p. 123.

Habitat in prato Murobacensi, circa Leytæpontum & alibi.

THALICTRUM.

THALICTRUM foliis sexpartitis, floribus cernuis. *Linn. Sp. pl.* 546.

Thalictrum caule folioso, foliolis caulinis acutis, panicula divaricata, floribus nutantibus. *Fl. Suec.* 454.

Thalictrum minus. *Baub. pin.* 337. *Dodon. pempt.* 58.

Ruta pratensis minor. *Tabern. icon.* 55.

Habitat in valle ante Durrenstein, & in montibus Medlingensibus.

Thalictrum foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. *Hort. Cliff.* 226.

Thalictrum pratense angustissimo folio. *Baub. pin.* 337. *prodr.* 146. t. 146.

Habitat in valle Breinina.

THALICTRUM caule folioso sulcato, panicula multiplici erecta. *Fl. Suec.* 453.

Thalictrum pratense. *Fl. Lapp.* 224.

Thalictrum majus, filiqua angulosa s. striata. *Baub. pin.* 336.

Thalictrum magnum. *Dodon. pempt.* 58.

Habitat in Tabor, in pratis Draskirchensibus, in insula Thulnensi majore, alibique.

A D O N I S.

1. ADONIS floribus octopetalis, fructibus subcylindricis.
Hort. Ups. 156.

Adonis radice annua. *Hort. Cliff. 31.*

α. Adonis sylvestris, flore phæniceo ejusque foliis longioribus. *Bauh. pin. 178.*

Adonis arvensis flore phæniceo, & ochroleuco. *Hall. Jen. Rupp. 159.*

Adonis flore pallido. *Cam. epit. 648.*

Ranunculus foliis Anthemidis, floribus rubicundis, & splendentibus. *Cæsalp. 546.*

Ranunculus arvensis, foliis chamæmeli flore phæniceo, & citrino. *Tournef. inst. 291.*

β. Adonis hortensis flore minore atro-rubente. *Bauh. pin. 178.*

Ranunculis arvensis, flore minore atro-rubente, foliis chamæmeli. *Tournef. inst. 291.*

Eranthemum. *Dodon. pempt. 260.*

Flos adonis. *Clus. hist. 1. p. 336.*

Habitat in arvis Minckendorffensibus, inter segetes circa Leytæpontum, alibique.

Hospitatur β. hinc inde in hortis sub dio.

2. ADONIS flore dodecapetalo, fructu ovato. *Linn. Sp. pl. 547.*

Adonis radice perenni. *Fl. Suec. 456.*

Adonis perennis dodecapetalos. *Hall. helv. 319.*

Adonis montanus, perennis, flore amplo, luteo. *Hall. Jen. Rupp. 158.*

Adonis præcox perennis, flore luteo, caule plano. *Moris. hist. 3. p. 26. s. 6. t. 9. f. 1.*

Ranunculus fœniculaceis foliis, hellebori nigri radice. *Tournef. inst. 291.*

Helleborus niger tenuifolius, buphthalmi flore. *Bauh. pin. 186.*

Helleborus Hippocratis. *Tabern. icon. 721.*

Buphthalmum. *Dodon. pempt. 261.*

Habitat supra Petersdorff, ad viam quæ ducit Gishübel, in montibus Badensibus, ac copiose undique circa Leytæpontum in senticetis & agrorum marginibus.

R A N V N C V L V S.

RANUNCULUS foliis cordatis angulatis petiolatis. *Fl. Suec.* 460.

Ranunculus vernus rotundifolius major, & minor. *Tournef. inst.* 286.

Ficaria. *Dill. Gifs.* 39. *Gen. nov.* 108.

Ficaria vulgaris. *Hall. Jen. Rupp.* 159.

Chelidonium minus. *Fuchs. hist.* 866. *Dodon. pempt.* 49.

Chelidonia rotundifolia major, & minor. *Bauh. pin.* 167.

Habitat ubique in insulis danubialibus, in pomariis circa Leytæpontum, in valle Döblingensi, alibique passim in pratis sylvestribus succulentioribus.

RANUNCULUS foliis reniformibus subtrilobis crenatis, caulino sessili, floralibus lanceolatis, caule subbifloro. *Linn. Sp. pl.* 550.

Ranunculus grumosa radice III. *Clus. hist.* 1. p. 239.

Aconitum pardalianches I. f. Thora major. *Bauh. pin.* 184.

Thora major. *Cam. epit.* 825.

Ptora Valdensium. *Lob. icon.* 604.

Habitat in Schneeberg, & Erscher.

RANUNCULUS foliis radicalibus reniformibus crenatis incis; caulinis digitatis linearibus, caule multifloro. *Fl. Suec.* 462.

Ranunculus nemorosus f. sylvaticus, folio subrotundo. *Bauh. pin.* 178.

Ranunculus I. Sylvestris. *Dalech. hist.* 1028.

Habitat passim in sylvis, pomariis, & pascuis humidioribus.

RANUNCULUS foliis inferioribus palmatis, summis digitatis, fructibus oblongis. *Fl. Suec.* 463.

Ranunculus palustris, apii folio lævis. *Bauh. pin.* 180.

Ranunculus palustris rotundiore folio. *Lob. hist.* 382.

Ranunculus Sylvestris I. *Dodon. pempt.* 426.

Habitat ad ripam fluvii Fischæ, Leytæque, ad stagnum danubiale ad viam regiam Nussdorffensem situm, ad fossas suburbiorum Viennensium Leopoldini & Viden, alibique in pratis uliginosis.

RANUNCULUS foliis omnibus quinatis lanceolatis incisoferratis. *Hort. Ups.* 156.

Ranunculus montanus aconiti folio, albus: flore majore, & minore. *Bauh. pin.* 182.

Ranunculus montanus IV. *Clus. hist. 1. p. 236.*

Habitat in *Sylvosis montis Schneeberg*, & *Wexel*.

6. *RANUNCULUS* foliis ternatis biternatisque, foliolis trifidis incis, caule inferne ramoso. *Linn. Sp. pl. 552.*

Ranunculus foliis tripartitis laciniatis, caule inferne ramoso, radice tuberosa. *Hort. Ups. 156.*

Ranunculus grumosa radice, ramosus. *Bauh. pin. 181.*

Ranunculus asiaticus polyclonos s. *grumosa* radice 2. *Clus. hist. 1. p. 241.*

Hospitatur in hortis passim partim sub dio, partim ut citius floreat in frigidariis; unde apud *Adonides* omnes ejus varietates à *Clarissimo Linnæo* *Sp. pl. recensitæ* occurrunt, inter quos *PP. Capucini* excellunt.

7. *RANUNCULUS* foliis supra decompositis, caule simplicissimo unifolio, radice tuberosa. *Hort. Cliff. 230.*

Ranunculus rutaceo folio, flore suave rubente. *Bauh. pin. 181.*

Ranunculus præcox I. *rutæ folio*. *Clus. hist. 1. p. 232.*

Habitat in *Schneeberg*.

8. *RANUNCULUS* foliis radicalibus subcordatis obtusis tripartitis: lobis tribolatis; caulino lanceolato integerrimo, caule unifloro. *Linn. Sp. pl. 553.*

Ranunculus caule aphylo unifloro, foliis subrotundis semitrifidis. *Hall. helv. 326.*

Ranunculus alpinus humilis rotundifolius, flore majore, & minore. *Bauh. pin. 181.*

Ranunculi montani I. species 1. & 2. *Clus. hist. 1. p. 234.*

Habitat in *Schneeberg*.

9. *RANUNCULUS* calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis compositis. *Fl. Suec. 469.*

Ranunculus radice simplici globosa. *Hall. helv. 323.*

Ranunculus bulbosus. *Lobel. icon. 666. Fl. lapp. 229.*

Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotunda. *Bauh. pin. 179.*

Ranunculus tuberosus. *Dodon. pempt. 431.*

Habitat in *valle Döblingensi*, in pomario horti *P. Montecuculi* in suburbio *Leopoldino Viennæ*, in insulis *danubialibus*, in pascuis, & sylvarum locis gramineis circa *Fischamentum*, & *Leytæpontum*, alibique.

10. *RANUNCULUS* calycibus patulis, pedunculis sulcatis, stolonibus repentibus, foliis compositis. *Fl. Suec. 468.*

Ra-

Ranunculus pratensis repens hirsutus. Baub. pin. 179.
Fl. lapp. 230.

Ranunculus pratensis, & hortensis reptante cauliculo.
Lob. hist. 379.

Ranunculus hortensis I. Dodon. pempt. 425.

Habitat ad viam regiam Minckendorffensem in pratis, infra Salmersdorff ubi etiam flore pleno occurrit, & passim alibi in pratis, & hortis oleraceis.

1. *RANUNCULUS* calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis: summis linearibus. *Fl. Suec. 466.*

Ranunculus foliis peltatis quinquangularibus multipartitis: laciniis linearibus, caule multifloro. Hort. Cliff. 231.

Ranunculus pratensis erectus acris. Baub. pin. 178. Fl. Lapp. 228.

Ranunculus hortensis II. Dodon. pempt. 426.

β. Ranunculus hortensis erectus, flore pleno. Baub. pin. 179.

Habitat ubique in pratis, & pascuis.

Hospitatur β. passim in hortis sub dio.

2. *RANUNCULUS* foliis tripartitis acute sinuatis tomentosis. *Linn. Sp. pl. 554.*

Ranunculus foliis radicalibus pinnatis. Sauv. Monsp. 227.

Ranunculus montanus, lanuginosus, foliis ranunculi pratensis repentis. Baub. pin. 132. prodr. 96.

Ranunculus magnus valde hirsutus, flore luteo. Baub. hist. 3. p. 417.

Habitat in sylva retro Dornbach, ac passim alibi in nemoribus.

3. *RANUNCULUS* feminibus aculeatis, foliis superioribus decompositis linearibus. *Fl. Suec. 470.*

Ranunculus arvensis echinatus. Baub. pin. 179.

Ranunculus sylvestris III. Dodon. pempt. 427.

Habitat passim in arvis, & inter segetes.

4. *RANUNCULUS* foliis filiformi-ramosis, calycibus appendiculatis. *Hort. Ups. 157.*

Ranunculus ceratocephalus, feminibus fulcatis in spicam adactis. Moris. hist. 2. p. 440. s. 4. t. 28. f. 22.

Myosurus foliis ramosis. Hort. Cliff. 117.

Melampyrum luteum minimum. Baub. pin. 234.

Habitat inter segetes, in arvis, & in agrorum marginibus retro hortum olim S. P. Eugenii & circa Nosocomium ad S. Marcum sitis Vienna.

15. *RANUNCULUS* foliis submersis capillaceis, emerfis peltatis. *Linn. Sp. pl.* 556.

Ranunculus foliis inferioribus capillaceis, superioribus peltatis. *Fl. Lapp.* 234.

Ranunculus aquaticus folio rotundo, & capillaceo. *Bauh. pin.* 180.

Ranunculus aquatilis. *Dodon. pempt.* 587.

- β. *Ranunculus* foliis submersis capillaceis. *Fl. Suec.* 472.

Habitat in stagno danubiali ad viam regiam Nusdorffensem ac passim alibi in fossis, rivulis, & paludibus, β. præsertim in Steinbachl rivulo in Leytam fluente, ac in fossis ad viam Margarethen inter & Ebergassing, alibique cum α.

T R O L L I V S.

1. *TROLLIUS* corollis conniventibus, nectareis longitudine staminum. *Linn. Sp. pl.* 556.

Trollius. *Hall. Jen. Rupp.* 162.

Helleborus niger, *Ranunculi* folio, flore globoso majore. *Tournef. inst.* 272.

Helleborus flore clauso erecto petiolato, caule simplicissimo. *Fl. Suec.* 474.

Helleborus caule simplici, flore pedunculato. *Fl. lapp.* 226.

Helleboro - ranunculus, flore luteo globoso. *Boerhaav. Lugdb.* 1. p. 297.

Pseudo - Helleborus ranunculoides flore globoso. *Moris hist.* 3. p. 467. s. 12. t. 2. f. 2.

Ranunculus flore globoso. *Dodon. pempt.* 430.

Ranunculus flore globoso quibusdam *Trollius* flos. *Bauh. hist.* 3. p. 419.

Habitat in Schneeberg, & in alpe Breinina.

I S O P Y R V M.

1. *ISOPYRUM* stipulis ovatis, petalis obtusis. *Linn. Sp. pl.* 557.

Thalictrum batrachoides, flore albo, italicum. *Bocc. Mus.* 84. t. 79. f. 1.

Ranunculus nemorosus, *thalictri* folio. *Bauh. pin.* 178. Ra.

Ranunculus præcox II. Thalictri folio. *Clus. hist. 1. p. 233.*

Habitat in sylva Hiedldorffensi ad sinistram, in saltus Leytabergenſis & Mannersdorffensis locis umbrosis.

HELLEBORVS.

1. HELLEBORVS flore folio insidente. *Hort. Ups. 158.*

Helleborus ranunculoides præcox tuberosus, flore luteo.

Moris. hist. 3. p. 459, s. 12. t. 2. f. 4.

Helleborus niger tuberosus, ranunculi folio flore luteo.

Tournef. inst. 272.

Ranunculus cum flore in medio folio, radice tuberosa.

Baub. hist. 3. p. 414.

Aconitum unifolium luteum, bulbosum. *Baub. pin. 183.*

Aconitum luteum minus. *Dodon. pempt. 440.*

Habitat in monte Cecio seu Kalenberg, aut ut alij volunt Gallenberg.

2. HELLEBORVS scapo sub-unifloro subnudo, foliis pedatis.

Linn. Sp. pl. 558.

Helleborus scapo florifero subnudo, petiolo communi bipartito. *Hort. Cliff. 227.*

Helleborus niger flore roseo. *Baub. pin. 186.*

Elleborus niger legitimus. *Clus. hist. 1. p. 274.*

Veratrum nigrum I. *Dodon. pempt. 383.*

Habitat in valle, & ad alpem Breininam, ad pedem montis Schneeberg, ac passim in montanis.

3. HELLEBORVS caule multifloro folioso, foliis digitatis.

Linn. Sp. pl. 558.

Helleborus caule æquali folioso, foliis radicalibus caulem tandem superantibus. *Hort. Ups. 158.*

Helleborus niger hortensis flore viridi. *Baub. pin. 185.*

Veratrum nigrum II. *Dodon. pempt. 388. Clus. hist. 1. p. 275.*

Habitat in sylva Hiedldorffensi cum Isopyro, versus Murobacium ad sinistros montes ultra rivum, in monte Cecio seu Kalenberg, & passim alibi in montanis.

CALTHA.

1. CALTHA. *Fl. Lapp. 227. Fl. Suec. 473.*

Caltha palustris flore simplici. *Baub. pin. 276.*

Populago flore majore. *Tournef. inst. 273.*

Populago major. Tabern. icon. 750.

Pseudo. Helleborus ranunculoides pratensis rotundifolius simplex. Moris. hist. 3. p. 461.

Ranunculus latifolius. Dalech. hist. 1036.

Habitat in Tabor, & passim in insulis danubialibus, ac ubique in pratis udis circa Leytæpontum, alibique.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

A J V G A.

1. **A** J V G A tetragono - pyramidalis. *Fl. Suec. 475.*
Consolida media pratensis cærulea. Baub. pin. 260.
Consolida media genevensis. Baub. hist. 3. p. 432.
Bugula foliis angulose dentatis, caule simplici. Hall. helv. 635
Bugula montana Rivini. Hall. Jen. Rupp. 231.
Habitat hinc inde in pratis montanis & sylvestris circa Latifontum, Medling, Murobacium, & Leytæpontum.
2. **A** J V G A foliis tomentosis, calycibus hirsutis. *Linn. Sp. pl. 561.*
Bugula carneo flore. Clus. hist. 2. p. 43.
Habitat in pratis Murobacensibus.
3. **A** J V G A stolonibus reptatricibus. *Linn. Sp. pl. 561.*
Ajuga foliis obovatis crenatis, caule simplicissimo, stolonibus reptatricibus. Gort. Gelr. 330.
Teucrium foliis obverse ovatis crenatis, caule simplicissimo, stolonibus reptatricibus. Hort. Cliff. 301.
Roy. Lugdb. 306.
Consolida media pratensis cærulea. Baub. pin. 260.
Bugula. Dodon. pempt. 135.
Habitat in insulis danubialibus passim, in valle Döblingensi, ac undique circa Leytæpontum alibique.

TEUCRIVM.

1. TEUCRIVM foliis multifidis floribus verticillatis urrinque ternis. *Linn. Sp. pl. 562.*

Teucrium foliis aliquoties trifidis, floribus verticillatis. *Hort. Cliff. 301.*

Botrys chamædryoides. *Bauh. pin. 138.*

Chamæpitys altera. *Dodon. pempt. 46.*

Habitat in arvis Fischamentensibus inter furnum lateritium, & vineas sitis.

2. Teucrium foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus axillaribus. *Hort. Ups. 160.*

Teucrium foliis simpliciter trifidis. *Hort. Cliff. 301.*

Chamæpitys lutea vulgaris s. folio trifido. *Bauh. pin. 249.*

Chamæpitys prima. *Dodon. pempt. 46.*

Habitat in arvis Azckersdorffensibus, Leytæpontanis, aliisque passim.

3. TEUCRIVM foliis integerrimis ovatis utrinque acutis, racemis secundis villosis. *Linn. Sp. pl. 564.*

Teucrium foliis ovatis utrinque acutis integerrimis, floribus solitariis utrinque digestis. *Hort. Ups. 159.*

Chamædrys incana maritima frutescens, foliis lanceolatis. *Tournef. inst. 205.*

Marum cortusi. *Bauh. hist. 3. p. 242. Hall. Jen. Rupp. 220.*

Pseudo-Marum. *Riv. mon. irr.*

Hospitatur in hortis æstate in apricariis, hyeme in frigidariis passim, præsertim Rohraviæ in horto Excellentissimi Comitum Caroli ab Harrach, & Leytæponti in horto Excellentissimi Comitum Ernesti ab Harrach.

4. TEUCRIVM foliis oblongis sessilibus dentato-ferratis, floribus geminis axillaribus caule diffuso. *Linn. Sp. pl. 565.*

Teucrium foliis ovato-lanceolatis serrulatis sessilibus, floribus sæpius binatis. *Fl. Suec. 476.*

Chamædrys palustris allium redolens. *Moris. hist. 3. p. 423.*

Scordium. *Bauh. pin. 247. Cam. epit. 588. Dodon. pempt. 126.*

Habitat in valle Döblingensi, ac passim in pratis uliginosis Leytæpontanis, alibique.

5. *TEUCRIUM* foliis ovatis inciso-crenatis petiolatis, floribus subverticillatis. *Linn. Sp. pl.* 565.
Chamædryas major repens. Baub. pin. 248.
Chamædryas. Riv. mon. irreg.
β. Chamædryas minor repens. Baub. pin. 248.
Habitat in apricis & montosis fruticetis passim, specialiter copiose in monticulo regio Fischamentensi, ad viam inter Leytæpontum & Vinden, circa Dornbach, Draskirchen, & Döbling, alibique.
6. *TEUCRIUM* corymbo terminali, foliis lanceolatis integerrimis. *Linn. Sp. pl.* 565.
Teucrium foliis lanceolatis integerrimis petiolatis, spicis laxis subrotundis. Hort. Cliff. 302.
Polium lavendulæ folio. Baub. pin. 220.
Polium majus. Cord. hist. 124. b.
Ajuga folio integro. Riv. mon. irr.
Habitat in siccis & saxosis hinc inde præsertim in monte ther- nis Badensibus imminente, & in monte Hamburgensi.

S A T V R E J A.

1. *SATVREJA* verticillis lanuginosis, dentibus calycinis fetaceis pilosis. *Linn. Sp. pl.* 567.
Thymus verticillis lanuginosis, dentibus calycinis fetaceis pilosis. Hort. Ups. 160.
Thymbra hispanica, majorannæ folio. Tournef. inst. 197.
Marum. Rivini. Hall. Jen. Rupp. 234.
Marum vulgare f. Clinopodium. Dodon. pempt. 271.
Sampfucus f. Marum mastichen redolens. Baub. pin. 224.
Mastichina. Boerhaav. Lugdb. 1. p. 156.
Clinopodium quibusdam, Mastichina Gallorum. Baub. hist. 3. p. 2. 243.
Hospitatur hinc inde in hortis Viennæ æstate in apricariis, hyeme in frigidariis, præsertim in horto Domini Maximiliani in suburbio Allstergassen dicto.
2. *SATVREJA* pedunculis dichotomis lateralibus solitariis, foliis mucronatis. *Linn. Sp. pl.* 568.
Satureja pedunculis dichotomis, verticillis concatenatis. Hort. Ups. 161.
Satureja montana. Baub. pin. 218.
Satureja durior. Baub. hist. 3. p. 372.

Satureja perennis. *Riv. mon. irr.*

Calamintha frutescens, saturejæ folio, facie, & odore.

Tournef. inst. 194.

Melissa foliis linearibus integerrimis. *Hort. Cliff. 303.*

Thymbra. *Dodon. pempt. 288.*

Hospitatur in variis hortis vel sub dio, vel æstate in apricariis, hyeme in frigidariis, præsertim olim in horto Favoritæ

Videntis copiosè à Domino Zinner colebatur.

3. SATVREJA pedunculis bifloris. *Hort. Ups. 161.*

Satureja hortensis. *Baub. pin. 218.*

Satureja altera. *Cam. epit. 437.*

Thymus erectus annuus, foliis lanceolato-linearibus.

Hort. Cliff. 306.

Habitat nunc passim in hortis oleraceis olim sata.

H Y S S O P V S.

1. HYSSOPVS spicis secundis. *Hort. Ups. 162.*

Hyssopus officinarum cærulea f. spicata. *Baub. pin. 217.*

Hyssopus vulgaris. *Dodon. pempt. 287.*

Hospitatur sub dio passim in hortis, præsertim in horto Leytæpontano Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach ubi flore cæruleo, albo, & rubro occurrit, quæ varietates ex uno semine nimirum à planta flore rubro desumpto natæ sunt, certo experimento colorem floris secundum solum, & clima variare.

N E P E T A.

1. NEPETA floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ferratis. *Linn. Sp. pl. 570.*

Nepeta floribus interrupte spicatis pedunculatis. *Hort. Ups. 163. Fl. Suec. 486.*

Nepeta Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 230.*

Cataria major vulgaris. *Tournef. inst. 202.*

Cataria herba. *Dodon. pempt. 99.*

Men ha Cataria vulgaris, & major. *Baub. pin. 228.*

Habitat inter commissuras laterum in gradibus aræ horti Favoritæ Videntis in qua olim exoticæ conservabantur, & Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach probabiliter olim culta.

L A V A N D V L A.

1. LAVANDULA foliis lanceolatis integris, spicis nudis.

Hort. Ups. 162.

Lavendula angustifolia. Baub. pin. 216.

Lavendula altera. Dodon. pempt. 273.

β. *Lavendul latifolia. Baub. pin. 216.*

Hospitatur passim in hortis sub dio areolas cingens.

2. LAVANDULA foliis duplicato - pinnatifidis. *Hort. Ups. 162.*

Lavendula folio dissecto. Baub. pin. 216.

Lavendula multifido folio. Clus. hist. 1. p. 345.

*Hospitatur hinc inde in hortis, specialiter olim æstate in apri-
cario, hyeme in frigidario Favoritæ Videntis.*

B E T O N I C A.

1. BETONICA spica interrupta corollarum lacinia intermedia
labii inferioris emarginata. *Fl. Suec. 487. Hort. Ups.*

164.

Betonica. Dodon. pempt. 40. Hort. Cliff. 310.

Betonica purpurea. Baub. pin. 235.

β. *Betonica alba. Baub. pin. 235.*

*Habitat passim circa Grinzing, Dornbach, Murobacium, &
Leytæpontum β. cum priore, ast varius.*

2. BETONICA verticillata, calycibus spinosis. *Hort. Ups. 165.*

Stachys foliis lanceolatis sessilibus basi attenuatis. Hort.

Cliff. 310.

Betonica arvensis annua, flore ex albo flavescente.

Tournesf. inst. 203.

*Betonica foliis inter diffitos verticillos longioribus el-
lipticis serratis. Hall. helv. 645.*

Sideritis arvensis latifolia glabra. Baub. pin. 233.

Alyssum majus. Tabern. hist. 929.

β. *Betonica foliis inter verticillos diffitos brevibus in ari-
stam terminatis integris. Hall. helv. 646.*

Sideritis vulgaris hirsuta, erecta. Baub. pin. 233.

Sideritis vulgaris I. Clus. hist. 2. p. 39.

*Habitat passim in arvis præsertim circa Leytæpontum. β. in
agrorum, vinearum, & sylvarum marginibus, ac juxta vias
inter frutices præsertim circa Fischamentam & Leytæ-
pontum.*

S I D E R I T I S.

SIDERITIS herbacea decumbens, calycibus spinosis, labio superiore trifido. *Linn. Sp. pl.* 575.

Sideritis montana, parvo varioque flore. *Bauh. pin.* 233.

Sideritis montana, parvo flore nigro purpureo, capite medio croceo. *Col. elph. I. p.* 198. *t.* 196.

Cunila calycum labio spinoso: superiore trifido, inferiore bipartito. *Hort. Ups.* 169.

Marrubiastrum sideritis folio, caliculis aculeatis, flore flavo limbo atro purpureo. *Tournef. inst.* 190.
Boerhaav. Lugdh. I. p. 171.

Habitat *passim in arvis circa Leytæpontum, Azkersdorff, Ladendorff, & Kirchstetten, aliisque.*

M E N T H A.

MENTHA floribus spicatis, foliis oblongis ferratis. *Hort. Ups.* 168.

α. Mentha spicis solitariis interruptis, foliis lanceolatis ferratis sessilibus. *Hort. Cliff.* 306.

Mentha angustifolia spicata. *Bauh. pin.* 227.

Mentha III. IV. *Dodon. pempt.* 95.

β. Mentha spicis confertis, foliis ferratis tomentosis sessilibus. *Hort. Cliff.* 306.

Mentha sylvestris folio longiore. *Bauh. pin.* 227.

Menthastrum spicatum, folio longiore candicante. *Bauh. hist. 3. p.* 321.

γ. Mentha sylvestris, rotundiore folio. *Bauh. pin.* 223.

Habitat *in valle Döblingensi, ad rivulos circa Dornbach, Burckersdorff, & Moosbrunn, in paludosis circa Leytæpontum, ac passim in insulis danubialibus, ubi varietates promiscue occurrunt.*

MENTHA floribus spicatis, foliis cordatis dentatis undulatis sessilibus. *Hort. Ups.* 168.

Mentha crispa danica seu Germanica speciosa. *Moris. hist. 3. p.* 367. *s. II. t. 6. f. 1.*

Mentha crispa. *Riv. mon. irr.*

Hospitatur *passim in hortis, & inter olera sub dio.*

MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis ferratis petiolatis, staminibus corolla longioribus. *Fl. Suec.* 482.

Mentha rotundifolia palustris f. *aquatica* major. *Baub. pin.* 227. *Hall. Jen. Rupp.* 229.

Mentha aquatica five *Sisymbrium*. *Baub. hist.* 3. part. 2. p. 123.

Sisymbrium sylvestre. *Dalech. hist.* 677.

Calamintha aquatica, *Calamentum aquaticum*. *Tabern. icon.* 353.

Habitat in *scrobibus* circa *Campum Liliaceum* vulgo *Lilienfeld*, & *Perschlingam*.

4. *MENTHA* floribus verticillatis, foliis ovatis acutis serratis, staminibus corollam æquantibus. *Linn. Sp. pl.* 577.

Mentha floribus verticillatis, foliis ovatis acute serratis. *Fl. Suec.* 481.

Mentha arvensis verticillata procumbens. *Moris. hist.* 3. p. 369. s. 11. t. 7. f. 5.

Calamintha arvensis verticillata. *Baub. pin.* 229.

Habitat circa *Schwechat*, & in arvis *Leytæpontanis præsertim ad vineas Adelsbergenses sitis*.

5. *MENTHA* floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus. *Linn. Sp. pl.* 577.

Mentha aquatica f. *Pulegium vulgare*. *Tournef. inst.* 189.

Pulegium latifolium. *Baub. pin.* 222.

Pulegium. *Fuchs. hist.* 199. *Dodon. pempt.* 282.

Habitat in paludosis piscuis inter *Leytæpontum*, & *Rohrham*, alibique passim.

G L E C O M A.

1. *GLECOMA* foliis reniformibus crenatis. *Fl. Suec.* 483.

Chamæclema vulgare. *Boerhaav. Lugdb.* 1. p. 172.

Chamæcissus. *Fuchs. hist.* 876.

Chamæcissus f. *Hedera terrestris*. *Baub. hist.* 3. p. 855.

Calamintha humilior folio rotundiore. *Tournef. inst.* 194.

Hedera terrestris Rivini, & officinarum. *Hall. Jen. Rupp.* 232.

Hedera terrestris vulgaris. *Baub. pin.* 306.

Habitat ad sēpes & ruderata, ac in pomariis ubique.

2. *GLECOMA* foliis cordatis oblongis crenatis, caule hispidō erecto. *Linn. Sp. pl.* 578.

Sideritis calycibus subinermibus. *Fl. Suec.* 488.

Sideritis alfinis trislaginis folio. *Bauh. pin.* 233. *prodr.*

III.

Sideritis humilis lato obtuso folio. *Raj. Syn.* 3. p. 242.

Sideritis hederulæ folio. *Park.* 587.

Marrubiastrum vulgare. *Tournef. inst.* 190.

Stachys arvensis minima. *Riv. irr. mon.* *Hall. Jen. Rupp.* 227.

Habitat in arvis, & inter segetes præsertim circa Leytæpontum.

L A M I V M.

LAMIUM foliis cordatis acuminatis ferratis petiolatis. *Fl. Suec.* 493.

Lamium vulgare album sive Archangelica flore albo. *Park. theatr.* 604.

Lamium album non fœtens folio oblongo. *Bauh. pin.* 231.

Galeopsis. *Cam. epit.* 865.

Galeopsis sive urtica iners floribus albis. *Bauh. hist.* 3. p. 322.

3. Lamium folio oblongo, flore rubro. *Park. theatr.* 606.

Lamium purpureum, non fœtens folio oblongo. *Bauh. pin.* 231.

Galeopsis sive urtica iners flore purpurascente, majore, folio non maculato. *Bauh. hist.* 3. p. 321.

Galeopsis Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 224.

Habitat passim cum β. ad sêpes circa Dornbach, Neustift, & Leytæpontum, sicut etiam in Tabor, & in valle Döblingensi.

LAMIUM foliis cordatis obtusis petiolatis. *Fl. Suec.* 494.

Lamium purpureum fœtidum folio subrotundo seu Galeopsis Dioscoridis. *Bauh. pin.* 230.

Lamium rubrum. *Raj. hist.* 558.

Galeopsis minor. Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 224.

Galeopsis s. urtica iners folio, & flore minore. *Bauh. hist.* 3. p. 323.

Urtica iners altera. *Dodon. pempt.* 153.

Habitat ubique in agris, hortisque oleraceis circa Viennam, & Leytæpontum.

LAMIUM foliis floralibus sessilibus amplexicaulibus obtusis. *Fl. Suec.* 495.

Lamium folio caulem ambiente minus. *Bauh. pin.* 23.

Galeopsis folio caulem ambiente Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 225.

Galeopsis f. urtica iners minor, folio caulem ambiente
Bauh. hist. 3. app. 853.

Morsus Gallinæ folio Hederulæ alter. *Lob. icon.* 463.

Alsines species. *Tabern. icon.* 714.

Habitat passim in agris, & cultis præsertim Leytæponti
horto oleraceo Excellentissimi Comitæ Ernesti ab Harrae.

G A L E O P S I S.

I. GALEOPSIS internodiis caulinis æqualibus: verticillis
omnibus remotis. *Linn. Sp. pl.* 579.

Galeopsis ramis summis pubescentibus. *Fl. Suec.* 492.

Galeopsis patula segetum flore purpurascente, & albo
Tournef. inst. 185.

Sideritis arvensis angustifolia rubra. *Bauh. pin.* 233.

Ladanum segetum Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 226.

Ladanum verticillis paucioribus, flore purpureo. *Dill.*
Giff. 135.

Tetrahit. *Dill. gen. nov.* 103. t. 3.

Alyssum Galeni, flore purpureo. *Tabern. icon.* 541.

Habitat passim inter segetes & in arvis præsertim circa Gersthooft
Laxenburg, & Leytæpontum.

2. GALEOPSIS internodiis superne incrassatis, verticillis sum-
mis subcontiguis. *Linn. Sp. pl.* 579.

Galeopsis ramis summis strigosis. *Fl. Suec.* 491.

Galeopsis corolla rubra aut alba. *Fl. Lapp.* 237.

Galeopsis procerior, caliculis aculeatis flore purpura-
scente & albo. *Tournef. inst.* 185.

Urtica aculeata, foliis ferratis. *Bauh. pin.* 232.

Cannabis spuria Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 226.

Cannabis sylvestris quorundam urticæ inerti affinis. *Bauh.*
hist. 3. app. 854.

Cannabina flore purpurascente. *Boerhaav. lugdb.* 1. p. 159.

Ladanum verticillis crebrioribus, flore purpureo: caule
fulcrato. *Dill. Giff.* 135.

β. Galeopsis corolla flava: labio inferiore maculato. *Fl.*
Lapp. 237.

Galeopsis altera caliculis aculeatis, flore flavescente.
Tournef. inst. 185.

Cannabis spuria flore majore Rivini. Hall. Jen. Rupp.
226.

Cannabina flore magno luteo, labiis purpureis. Boerhaav.
Lugdb. 1. p. 159.

Ladanum verticillis crebrioribus, flore flavescente, caule
fulcrato. Dill. Giff. 135.

Habitat inter segetes & olera præsertim in agris extra vallum sub-
urbicum Viennensem ad St. Marcum sitis, B. & in hortis ole-
raceis Erdbeerenfibus, in insula danubiali Thulnenfi, & in
Monte Schneeberg, alibique ad sæpes.

GALEOPSIS verticillis sexfloris: involucro tetraphyllo.
Linn. Sp. pl. 580.

Galeopsis sive urtica iners, flore luteo. Bauh. hist. 3. p. 323.
Hall. Jen. Rupp. 227. Tournef. inst. 185.

Galeopdolon. Dill. gen. nov. 103. Fl. Giff. 49.

Leonurus foliis ovatis serratis acutis. Fl. Suec. 497.

Lamium flore luteo. Riv. mon. irr.

Lamium folio oblongo luteum. Bauh. pin. 231.

Urtica iners tertia, sive lamium luteo flore. Dodon. pempt.
153.

Habitat inter Dornbach & Neustift, in valle Döblingensi,
in monte Schneeberg, & copiose in sylva Leytæpöntum in-
ter & Lapidicinam Cæsaream sita.

STACHYS.

STACHYS verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. Fl.
Suec. 489.

Stachys foliis cordatis acuminatis petiolatis, floribus
laxe spicatis. Hall. herb. 642.

Stachys sylvatica, Rivini. Hall. Jen. Rupp. 227.

Galeopsis legitima. Clus. hist. 2. p. 35.

Galeopsis procerior fœtida spicata. Tournef. inst. 185.

Galeopsis s. urtica iners magna fœtidissima. Bauh. hist. 3.
app. 853.

Lamium maximum sylvaticum fœtidum. Bauh. pin. 231.

Urtica heraclea. Tabern. icon. 536.

Habitat circa Dornbach, & Murobacium, in Brader, Tabor,
aliisque locis nemorosis.

STACHYS verticillis sexfloris, foliis lineari-lanceolatis se-
miamplexicaulibus. Fl. Suec. 490.

Stachys palustris Rivini. Hall. Jen. Rupp. 227.

Stachys palustris foetida. *Baub. pin.* 236.

Stachys aquatica. *Tabern. icon.* 577.

Galeopsis palustris, Betonicæ folio, flore variegato
Tournef. inst. 185.

Galeopsis angustifolia foetida. *Baub. hist.* 3. *app.* 854.

Habitat passim ad fluvios, rivulos, præsertim supra Grinzing
Latifontum, & circa Leytæpontum.

3. *STACHYS verticillis multifloris, foliorum serraturis im-*
bricatis. *Linn. Sp. pl.* 581.

Stachys verticillis quadraginta floris, caule lanato. *Hor-*
Ups. 170.

Stachys major germanica. *Baub. pin.* 236.

Stachys. Fuchsi hist. 765. t. 766. *Baub. hist.* 3. p. 319
Diosc. Lobel. icon. 530.

Stachys montana. *Riv. irr. mon.*

Habitat in principio sylvæ ad dextram prati Murobacensis sita
alibique in montosis.

B A L L O T A.

- I. *BALLOTA foliis cordatis indivisis serratis.* *Fl. Suec.* 484.

Ballote. *Fuchs. hist.* 154. *Cam. epit.* 572. *Tournef. inst.* 185
Mathiol. 825.

Marrubiastrum Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 226.

Marrubium nigrum, foetidum. *Baub. pin.* 230.

Habitat passim ad sepes & domos præsertim in valle Breinina
circa Grinzing, & ubique circa Leytæpontum etiam intra
Civitatem.

M A R R V B I V M.

- I. *MARRUBIVM foliis ovato-lanceolatis serratis, calycibus*
quinquedentatis denticulis setaceis. *Linn. Sp. pl.* 582.

Marrubium album latifolium peregrinum. *Baub. pin.* 230
Moris. hist. 3. p. 577. s. 11. t. 9. f. 8.

Marrubium alterum pannonicum. *Clus. hist.* 2. p. 34.

β. *Marrubium album angustifolium peregrinum.* *Baub. pin.*
230.

Habitat ubique in agrorum marginibus, & juxta vias circa Ley-
tæpontum, sicut etiam retro hortum olim S. P. Eugeni
Viennæ.

2. *MARRUBIVM calycibus decedentatis, dentibus setacei-*
uncinatis. *Fl. Suec.* 485.

Mar

Marrubium album vulgare. *Bauh. pin.* 230.

Marrubium vulgare. *Clus. hist.* 2. p. 34.

Habitat Viennæ inter hortos Erdbeerenses, retro hortum olim S. P. Eugenii cum priore, statimque extra Stubenthor, ac alibi in ruderatis.

LEONVRVS.

LEONVRVS foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Fl. Suec.* 496.

Marrubium Cardiaca dictum. *Bauh. pin.* 230.

Cardiaca. *Fuchs. hist.* 572.

Habitat copiose in dumetis ad fossam confinia Latifonti & Vinden, distinguentem sitis, in rubro supra Burckersdorff ad dextram torrentis Viennensis, ubi in eundem primis rivulus influit, sito. Ad domos Latifonti, & Grinzingæ, alibique passim in ruderatis.

PHLOMIS.

PHLOMIS foliis subrotundis tomentosis crenatis, involucris lanceolatis. *Linn. Sp. pl.* 584.

Phlomis involucris tomentosis lanceolatis, foliis cordatis villosis, caule fruticoso. *Hort. Ups.* 171.

Verbascum latis Salviæ foliis. *Bauh. pin.* 240.

Verbascum sylvestre alterum. *Dodon. pempt.* 146.

β. Phlomis cretica fruticosa, folio subrotundo, flore luteo. *Tournef. cor.* 10.

Phlomis latifolia capitata lutea grandiflora. *Dill. elth.* 316. t. 237. f. 306.

Hospitatur hinc inde in hortis, præsertim β. in horto Domini Maximiliani in platea Alstergassen Viennæ æstate in apricatio, hyeme in frigidario.

PHLOMIS foliis lanceolatis serratis, involucris linearibus nudis, calycibus, decagonis decedentatis. *Linn. Sp. pl.* 587.

Leonurus foliis obtuse serratis. *Hort. Cliff.* 312.

Leonurus capitis bonæ spei. *Breyn. cent.* 171. t. 86.

Cardiaca Africana perennis, foliis linearibus, floribus longissimis phæniceis villosis. *Herm. Lugdb.* 115. *Hall. Jen. Rupp.* 228.

Stachys africana frutescens angustifolia, flore longissimo phœniceo, Leonurus dicta. Moris. hist. 3. p. 383 s. II. t. 19. f. 17.

Hospitatur passim in hortis, præsertim Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach, æstate in apricario, hyeme in frigidario.

M O L V C C E L L A.

1. *MOLVCCELLA calycibus quinque dentatis : denticulis æqualibus. Hort. Ups. 172.*

Molucca lævis. Dodon. pempt. 92.

Mollucca Rivini. Hall. Jen. Rupp. 228.

Melissa moluccana odorata. Baub. pin. 229.

Hospitatur hinc inde in hortis sub dio, præsertim in horto Excellentissimi Domini Comitis Ferdinandi ab Harrach Viennæ.

C L I N O P O D I V M.

1. *CLINOPODIVM capitulis subrotundis hispidis, bracteis fetaceis. Linn. Sp. pl. 587.*

Clinopodium foliis ovatis, capitulis verticillatis. Fl. Suec. 479.

Clinopodium origano simile. Baub. pin. 224.

Clinopodium quorundam origani facie. Baub. hist. 3. part. 2. p. 250.

Clinopodium. Cam. epit. 563.

Habitat supra Salmersdorff, & in prato Murobacensi.

O R I G A N V M.

1. *ORIGANVM spicis aggregatis longis prismaticis rectis, bracteis membranaceis, calyce duplo longioribus. Linn. Sp. pl. 589.*

Origanum folio subrotundo. Baub. pin. 223. Hall. Jen. Rupp. 236.

Origanum monspeliense pulchrum. Cam. epit. 468.

Habitat in monte supra NUSDORFF, varius.

2. *ORIGANVM spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. Linn. Sp. pl. 590.*

Origanum foliis ovatis, spicis laxis erectis confertis paniculatis. Fl. Suec. 480.

Ori-

Origanum sylvestre. Baub. pin. 223.

Origanum sylvestre seu vulgare. Fuchs. hist. 522.

*Habitat passim in vepretis circa Dornbach, Grinzing, Mu-
robacium, & Leytæpontum.*

3. *ORIGANVM foliis ovalibus obtusis, spicis subrotundis
compactis pubescentibus. Hort. Ups. 151.*

Majorana vulgaris. Baub. pin. 224.

Amaracus vulgator. Lob. icon. 498.

β. *Majorana tenuifolia. Baub. pin. 224.*

Majorana hortensis odorata perennis. Moris. hist. 3.p. 359.

*Hospitatur copiosè sub dio in agris, hortisque oleraceis Nischite-
rii, ac passim alibi in hortis β. æstate in arvis & apricariis,
hyeme in frigidariis hortorum Viennæ, & præsertim Ley-
tæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab
Harrach.*

T H Y M V S.

• *THYMVS floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis
planis obtusis basi ciliatis. Fl. Suec. 477.*

*Thymus repens, foliis planis, floribus verticillato - spi-
catis. Hort. Cliff. 306.*

Serpyllum vulgare minus. Baub. pin. 220.

Serpyllum vulgare. Dodon. pempt. 277.

β. *Serpyllum vulgare majus. Baub. pin. 220.*

γ. *Serpyllum foliis citri odore. Baub. pin. 220.*

*Habitat passim ad vias regias in agrorum marginibus, in pascuis
& montosis. β. & γ. ad rubetum supra Burckersdorff co-
piosè.*

• *THYMVS erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verti-
cillato - spicatis. Hort. Ups. 160.*

Thymus vulgaris folio tenuiore. Baub. pin. 219.

β. *Thymus vulgaris folio latiore. Baub. pin. 219.*

Thymum durius. Dodon. pempt. 276.

Hospitatur passim in hortis sub dio præsertim oleraceis.

• *THYMVS floribus verticillatis, pedunculis unifloris, cau-
libus erectis subramosis, foliis acutis ferratis. Fl. Suec.
478.*

*Thymus caulibus vix ramosis, foliis ovatis acutis, pedun-
culis plurimis unifloris. Hort. Cliff. 306.*

Clinopodium arvense, ocymi facie. Baub. pin. 225.

Clinopodium vulgare. Lob. icon. 506. Clus. hist. 1.p. 354.

Acinos Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 233.

Ocimum sylvestre, Acinos. *Dodon. pempt.* 280.

Habitat circa Neudorff, Waring, Döbling, & Dornbach,
inter Salmersdorff, & Weidling, & juxta Weinhaus in val-
lo illo a Turcis tempore assedii Viennensis fato alibique.

4. THYMVS verticillis sexfloris, foliis obtusiusculis conca-
vis subserratis. *Linn. Sp. pl.* 591.

Clinopodium verticillis paucifloris in spicam congestis.
Hall. herb. 653.

Clinopodium montanum. *Baub. pin.* 225.

Acini pulchra species. *Baub. hist.* 3. p. 620.

Habitat in montibus Medlingensibus, Badensibusque.

M E L I S S A.

1. MELISSA racemis axillaribus verticillatis: pedicellis sim-
plicibus. *Linn. Sp. pl.* 592.

Melissa floribus ex alis inferioribus subsessilibus. *Hort.*
Ups. 163.

Melissa hortensis. *Baub. pin.* 229.

Apiastrum f. Melissophyllum. *Lob. hist.* 227.

Hospitatur ubique in hortis sub dio.

2. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis longitudine
florum. *Linn. Sp. pl.* 592.

Calamintha magno flore. *Baub. pin.* 229. *Riv. mon. irr.*

Calamintha montana præstantior. *Besl. eyf. æst.* 7. t. 7. f. 1.

Hospitatur hinc inde in hortis Viennæ præsertim olim in horto Fa-
voritæ Videntis.

3. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis longitudine
foliorum. *Linn. Sp. pl.* 593.

Melissa floribus ex alis superioribus pedunculo communi
confertis. *Mat. med.* 295.

Calamintha vulgaris & officinarum Germaniæ. *Baub. pin.*
228.

Calamintha montana. *Dodon. pempt.* 98.

Hospitatur hinc inde in hortis rhizotomarum.

4. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis folio longiori-
bus, caule decumbente. *Linn. Sp. pl.* 593.

Calamintha pulegii odore f. Nepeta. *Baub. pin.* 228.

Calamintha flore minore odore pulegii. *Baub. hist.* 3. part.
2. p. 229.

Pulegium sylvestre seu Calamintha altera. Dodon. pempt.

98.

Hospitatur sub dio in hortulo botanico fratris Honorii apud FF. Misericordiæ in suburbio Leopoldino Viennæ.

D R A C O C E P H A L V M.

DRACOCEPHALUM floribus spicatis, foliis bracteisque linearibus partitis spinosis. *Linn. Sp. pl. 595.*

Hyssopus spicis interruptis. Hort. Cliff. 364.

Hyssopus austriacus, magno flore, folio chamæpithios. Herm. lugdb. 330.

Chamæpithys cærulea austriaca, Baub. pin. 250.

Chamæpithys austriaca. Clus. hist. 2. p. 185.

Habitantem semel inveni monte Leopoldsberg, monti Cecio vicino, eandem vero nuper D. Mysley collega meus pariter ac Her- niariam, aliasque rarissimas plantas a me vel omissas vel non observatas copiose crescentem invenit; locum autem per litteras roganti non significavit. Nec ego, cum ex peritissimi hujus botanici syllabum plantarum austriacarum jam dudum desideratum, breviter publici juris fieri sperem, ulterius sollicitavi.

M E L I T T I S.

MELITTIS. Hort. Cliff. 390. Linn. Sp. pl. 597.

Melissa. Fuchsii Cam. hort. 99. 30. Lob. icon. 515.

Melissophyllum Rivini. Hall. Jen. Rupp. 232.

Lamium montanum. Melissæ folio. Baub. pin. 231.

Habitat inter Salmersdorff & Weidling, supra Petersdorff ad viam quæ ducit Gishübel inter frutices, circa Latifontum, & in Leytaberg, ac ad monasterium vulgo desertum dictum Mannersdorffii.

O C I M V M.

OCIMUM foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis. *Hort. Ups. 168.*

Ocimum caryophyllum majus. Baub. pin. 226.

Ocimum. Cam. epit. 308.

3. *Ocimum caryophyllum maximum. Baub. pin. 226.*

4. *Ocimum latifolium maculatum s. crispum. Baub. pin. 226.*

- δ. *Ocimum viride foliis bullatis. Baub. pin. 225.*
Hospitatur passim in hortis sub dio, præsertim omnes fere varietates in horto Leytæpontano Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.
2. *OCIMUM foliis ovatis integerrimis. Hort. Ups. 169.*
Ocimum minimum. Baub. pin. 226.
Ocimum minus. Dodon. pempt. 279.
Hospitatur sub dio in horto Leytæpontano Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach, & passim alibi cum præcedente.

SCUTELLARIA.

1. *SCUTELLARIA foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. Fl. Suec. 499.*
Cassida palustris, vulgatio, flore cæruleo. Tournefort. Hall. Jen. Rupp. 223.
Scutellaria. Riv. mon. irr.
Lyfimachia cærulea galericulata s. Gratiola cærulea. Baub. pin. 246.
Lyfimachia galericulata. Dalech. hist. 1060.
Tertianaria, aliis lyfimachia galericulata. Baub. hist. 3. p. 435.
Habitat hinc inde ad fluviorum, torrentium, & rivulorum ripas, in salicetis, præsertim Fischamentæ.

PRVNELLA.

1. *PRVNELLA foliis ovato oblongis petiolatis. Linn. Sp. pl. 600.*
Brunella major, folio non dissecto. Baub. pin. 260.
Brunella. Dodon. pempt. 136.
- β. *Brunella cærulea magno flore. Baub. pin. 261.*
Brunella prima non vulgaris. Clus. hist. 2. p. 43.
- γ. *Brunella minor alba laciniata. Baub. pin. 261.*
Habitat passim in pascuis præsertim circa Dornbach, Salmersdorff, Weidling, Döbling, & Grinzing, ubi varietates promiscue occurrunt.

ANGIOSPERMIA.

RHINANTHVS.

1. RHINANTHVS corollarum labio superiore compresso brevior. *Fl. Lapp.* 248. *Fl. Suec.* 503.

Pedicularis pratensis lutea f. Crista galli. *Baub. pin.* 163.

β. Crista galli angustifolia montana. *Baub. pin.* 163. *prodr.* 86.

Habitat in prato Murobacensi, in insula Geimanniana pratisque humidioribus Fischamentæ, ac passim alibi, β. in alpis Breininæ primo jugo.

EUPHRASIA.

1. EUPHRASIA foliis ovatis argute dentatis. *Fl. Lapp.* 247. *Fl. Suec.* 516.

Euphrasia officinarum. *Baub. pin.* 233.

Euphrasia minor. *Dill. app. ad Giff.* 53.

Euphrasia. *Cam. epit.* 767.

Habitat in Brader, in valle Döblingensi, in insula Geimanniana Fischamentæ, in valle Breinina, & in pratis circa Leytæpontum, alibique passim.

2. EUPHRASIA foliis linearibus : omnibus serratis. *Fl. Suec.* 517.

Euphrasia pratensis rubra, *Baub. pin.* 234.

Euphrasia altera. *Dodon. pempt.* 55.

Odontites. *Riv. mon. irr. Dill. gen. nov.* 117. *Hall. Jen. Rupp.* 239. *Tabern. icon.* 242.

Pedicularis serotina, purpurascente flore. *Tournef. inst.* 172.

Habitat inter Ladendorff, & Rusbach in pratis ad sinistram viæ sitis, sicut etiam in valle Breinina, alibique.

3. EUPHRASIA foliis linearibus serratis : superioribus integerrimis. *Linn. Sp. pl.* 604.

Euphrasia pratensis lutea. *Baub. pin.* 234.

Euphrasia lutea montana angustifolia major altera. *Col. ecphr.* 1. p. 204. t. 203.

Odontites flore luteo. *Tabern. & Rivini. Hall. Jen. Rupp.* 239.

Pedicularis serotina lutea. *Tournef. inst.* 172.

Habitat in monte Cecio seu Kalenberg, aut ut alii volunt Gallenberg, & in valle Breinina.

MELAMPYRVM.

1. MELAMPYRVM spicis quadrangularibus compactis obtusis imbricatis. *Linn. Sp. pl.* 605.
 Melampyrum spicis quadrangularibus compactis obtusis ciliatis. *Fl. Suec.* 510.
 Melampyrum cristatum. *Raj. hist.* 775. *Riv. mon. irr.* & *J. Baub. hist.* 3. p. 440. *Hall. Jen. Rupp.* 239.
 Melampyrum luteum angustifolium. *Baub. pin.* 234.
 Melampyrum luteum linariæ folio. *Baub. prodr.* 112.
 Habitat circa Waring & Leytæpontum in pratis asperis alibique.
2. MELAMPYRVM spicis conicis laxis laceris. *Fl. Suec.* 511.
 Melampyrum arvense. *Riv. mon. irr.*
 Melampyrum purpurascente coma. *Baub. pin.* 234. *Hall. Jen. Rupp.* 238.
 Parietaria sylvestris 3. *Clus. hist.* 2. p. 45.
 Triticum vaccinum. *Dodon. pempt.* 541.
 Habitat passim in agris arvisque, præsertim circa Leytæpontum, Waringam, Weidlingam, Döblingam, & Fischamentam.
3. MELAMPYRVM bracteis cordato-lanceolatis: summis coloratis sterilibus, calycibus lanatis. *Fl. Suec.* 512.
 Melampyrum sylvaticum. *Riv. irr. mon.* *Hall. Jen. Rupp.* 239.
 Melampyrum cærulea coma. *Baub. pin.* 234.
 Parietaria sylvestris I. *Clus. hist.* 2. p. 44.
 Habitat in valle Döblingensi, ubique in sylvis circa Leytæpontum, & passim alibi in nemoribus.
4. MELAMPYRVM florum conjugationibus remotis, corollis clausis. *Fl. Suec.* 513.
 Melampyrum foliis lanceolatis, florum paribus remotis. *Fl. lapp.* 240.
 Melampyrum luteum latifolium. *Baub. pin.* 243.
 Melampyrum montanum Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 239.
 Parietaria sylvestris II. *Clus. hist.* 2. p. 44.
 Habitat minus frequens in sepibus, & sylvarum marginibus inter Salmersdorff & Weidling ac Murobacium præsertim.

LATHRÆA.

1. LATHRÆA caule simplicissimo, corollis pendulis: labio inferiore trifido. *Fl. Suec.* 518.

Squa-

Squamaria Rivini & Loniceri. *Hall. Jen. Rupp.* 238.

Anblatum flore e rubro candicante. *Tournef. cor.* 48.

Anblatum. *Cord. hist.* 82.

Dentaria crocodylla. *Tabern. hist.* 1231.

Orobanche radice dentata major. *Baub. pin.* 88.

Habitat in opacis sylvæ Murobacensis, Burckersdorffensis trans vivum, & in saltibus Leytabergensibus supra Mannersdorff.

P E D I C V L A R I S.

1. PEDICULARIS caule ramoso, calycibus calloso-punctatis, corollis labio obliquis. *Linn. Sp. pl.* 607.

Pedicularis caule ramoso erecto, calycibus bifidis crenatis. *Hall. helv.* 621. *Fl. Suec.* 505.

Pedicularis. Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 240.

Pedicularis palustris alba elatior. *Tournef. inst.* 173.

Pedicularis pratensis rubra elatior. *Raj. hist.* 740.

Habitat in pratis paludosis, præsertim Murobacii, Fischamentæ, & Leytæponti.

2. PEDICULARIS caule ramoso, calycibus oblongis angulatis lævibus, corollis labio cordato, *Linn. Sp. pl.* 607.

Pedicularis caule ramoso, floribus solitariis, calycibus quinquefidis. *Fl. Suec.* 504.

Pedicularis pratensis purpurea. *Baub. pin.* 163.

Pedicularis humilior. *Hall. Jen. Rupp.* 240.

Pedicularis minor. *Riv. irr. mon. Dill. app. ad Giff.* 40.

Alectorolophi III. genus alterum. *Clus. hist.* 2. p. 211.

Fistularia. *Dodon. pempt.* 556.

Habitat in alpe Breinina, sicut etiam in pratis montosis siccioribus hinc inde circa Latifontum.

3. PEDICULARIS caule subramoso, corollis galea rostrato-acuminatis, calycibus subhirsutis. *Linn. Sp. pl.* 607.

Pedicularis alpina, foliis alternis: pinnulis incis, floribus sparsis rostratis purpureis. *Hall. helv.* 621. t. 16. f. 1.

Pedicularis alpina, filicis folio minor. *Baub. pin.* 163.

Alectorolophos alpina 3. minor. *Clus. hist.* 2. p. 210.

Habitat in alpe Durrenstein, & Etscher.

4. PEDICULARIS caule simplici, foliis quaternis. *Linn. Sp. pl.* 608.

Pedicularis alpina floribus purpureis spicatis, foliis pinatis verticillatis. *Hall. belv.* 623. t. 17. f. 1.

Alectorolophos alpina 2. floribus purpureis. *Clus. hist.* 2. p. 210.

Filipendula montana altera. *Baub. pin.* 163.

Habitat in Schneeberg, Etscher, & Durrenstein.

ANTIRRHINUM.

1. *ANTIRRHINUM* foliis ovatis alternis, caule flaccido. *Hort. Ups.* 175.

Antirrhinum foliis alternis ovatis. *Hort. Cliff.* 323.

Elatine. Riv. mon. irr.

Elatine folio subrotundo. *Baub. pin.* 252. *Hall. Jen. Rupp.* 242.

Elatine mas folio subrotundo. *Baub. hist.* 3. p. 372.

Veronica fœmina Fuchsi sive *Elatine. Dodon. pempt.* 42.

Habitat in arvis hinc inde, præsertim in Azkersdorffensibus.

2. *ANTIRRHINUM* foliis subquaternis linearibus, caule diffuso, floribus racemosis. *Linn. Sp. pl.* 615.

Linaria quadrifolia supina. *Baub. pin.* 213.

Linaria 3. stiriaca. *Clus. hist.* 1. p. 322.

Habitat in alpe Breinina, & Schneeberg.

3. *ANTIRRHINUM* foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis terminalibus sessilibus, floribus imbricatis. *Fl. Suec.* 501.

Antirrhinum foliis linearibus sparsis. *Hort. Cliff.* 325.

Linaria vulgaris lutea, flore majore. *Baub. pin.* 212.

Osyris Fuchs. *hist.* 543. *Cam. epit.* 930.

Habitat passim in vallo suburbico Viennensi, in Tabor, & ubique ad agrorum margines, juxta vias, ac in pomariis & ruderatis circa Leytæpontum.

4. *ANTIRRHINUM* foliis lanceolatis obtusis alternis, caule ramosissimo diffuso. *Hort. Cliff.* 324. *Fl. Suec.* 502,

Antirrhinum arvense minus. *Baub. pin.* 212.

Antirrhinum tertium. Cam. epit. 922.

Linaria pumila vulgatior arvensis. *Tournef. inst.* 169.

Linaria arvensis minima. *Riv. irr. mon.*

Habitat in monte supra Thermarum Badensium Scaturiginem.

5. *ANTIRRHINUM* corollis ecaudatis, calycibus rotundatis. *Hort. Ups.* 175.

Antirrhinum foliis lanceolatis petiolatis, calycibus brevissimis, racemo terminali. *Hort. Cliff.* 324. n. 4.

Antirrhinum majus alterum, folio longiore. *Baub. pin.* 211.

Antirrhinum. *Dodon. pempt.* 182. *Lob. icon.* 404.

Habitat in muris horti Leytæpontani Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach, olim ibidem cultum.

ANTIRRHINUM corollis ecaudatis, calycibus corolla longioribus. *Hort. Ups.* 176.

Antirrhinum foliis lanceolatis petiolatis, calycibus flores superantibus. *Hort. Cliff.* 324.

Antirrhinum arvense majus. *Baub. pin.* 212.

Antirrhinum sylvestre, *Phyteuma.* *Dodon. pempt.* 182.

Habitat in vallo suburbico Viennensi inter Hernalsensem & Lichtenthalensem portam. In horto olim Favoritæ Videntis nunc Gymnasii Theresiani, & in arvis trans ultimum pontem Danubialem extra Tabor.

SCROPHULARIA.

SCROPHULARIA foliis cordatis basi transversis, caule obtusiusculo. *Linn. Sp. pl.* 619.

Scrophularia foliis cordatis, racemo terminali. *Fl. Suec.* 520.

Scrophularia nodosa fœtida. *Baub. pin.* 235.

Scrophularia. *Cam. epit.* 866. *Dodon. pempt.* 50.

Habitat inter Salmersdorff, & Weidling, ac passim in nemoribus insularum Danubialium præsertim Fischamentæ.

SCROPHULARIA foliis cordatis, pedunculis axillaribus solitariis dichotomis. *Hort. Ups.* 177.

Scrophularia flore luteo. *Baub. pin.* 236. *prodr.* 112. t. 112,

Lamium pannonicum 2. exoticum. *Clus. hist.* 2. p. 38.

Hospitatur in hortulo botanico fratris Honorii apud FF. Misericordiæ in suburbio Leopoldino Viennæ sub dio.

DIGITALIS.

DIGITALIS calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtusis; labio superiore integro. *Hort. Ups.* 178.

Digitalis foliolis calycinis ovatis. *Hort. Cliff.* 318.

Digitalis purpurea folio aspero. *Baub. pin.* 243.

Digitalis purpurea. *Dodon. pempt. 168.*

Habitat in sylvis inter Dornbach, & Weidling, circa Mu-
robacium, & in monte Schneeberg.

OROBANCHE.

I. *OROBANCHE* caule simplicissimo pubescente, flaminibus
inclusis. *Linn. Sp. pl. 632.*

Orobanche caule simplicissimo. *Fl. Suec. 519.*

Orobanche major garyophyllum olens. *Baub. pin. 37.*

Orobanche l. *Clus. hist. 1. p. 270.*

Habitat passim in sylvis, agris, & pratis siccis præsertim circa
Burckersdorff, & Leytæpontum.

VITEX.

I. *VITEX* foliis digitatis, spicis verticillatis. *Linn. Sp. pl.*
938.

Vitex. *Cam. epit. 105. Rivini. Hall. Jen. Rupp. 249.*

Vitex foliis angustioribus cannabis modo dispositis.
Baub. pin. 475.

Agnus castus officinarum.

Hospitatur in borto S. P. de Schwarzenburg Viennæ, æstate in
apricario, hyeme in frigidario.

ACANTHVS.

I. *ACANTHVS* foliis sinuatis inermibus. *Hort. Ups. 181.*

Acanthus sativus f. mollis Virgilii. *Baub. pin. 383.*

Carduus Acanthus f. Branca ursi. *Baub. hist. 3. p. 75.*

Hospitatur hinc inde in hortis magnatum Viennæ, præsertim in
borto Viennensi S. P. de Schwarzenburg, æstate in aprica-
rio, hyeme in frigidario.

MELIANTHVS.

I. *MELIANTHVS* stipulis solitariis petiolo adnatis. *Hort. Ups.*
181.

Melanthus africanus. *Herm. lugdb. 414. t. 415.*

Hospitatur æstate in apricario, hyeme in frigidario S. P. de
Schwarzenburg Viennæ.

CLAS-

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA
SILICVLOSA.

MYAGRVM.

MYAGRVM filiculis ovatis pedunculatis polyspermis.
Fl. Suec. 541.

Myagrum sylvestre. Baub. pin. 109.

Alyssum segetum foliis auriculatis acutis. Tournef. inst. 217.

β. Myagrum fativum. Baub. pin. 109.

Camelina f. Myagrion. Dodon. pempt. 532.

Habitat inter segetes passim, in vallo suburbico Videnfi Viennæ in insula Geimanniana ad molam Fischamentæ.

Hospitatur β. passim inter linum in agris.

ANASTATICA.

ANASTATICA. *Hort. Ups. 183.*

Thlaspi Rosa de hiericho dictum. Moris. hist. 2. p. 228. s. 3. t. 25. f. 2. 3. Tournef. inst. 213.

Rosa hierochuntea vulgo dicta. Baub. pin. 484.

Rosa hierochuntica. Com. hort. t. 41.

Rosa de hiericho. Dalech. hist. 1796.

Hospitatur in horto Excellentissimi Comitis de Windischgratz Trautmannsdorffii.

DRABA.

DRABA caulibus nudis, foliis incis. *Fl. Suec. 523.*

Draba vulgaris caule nudo, polygoni folio hirsuto. Dill. gen. nov. 122. Giff. 40.

Alysson vulgare, polygoni folio, caule nudo. Tournef. inst. 217. Hall. Jen. Rupp. 84.

Bursa pastoris minor, loculo oblongo. Baub. pin. 108.

Bursa pastoris minima. Baub. hist. 2. p. 937.

Paronychia vulgaris. *Dodon. pempt. 112.*

Alfene minima. *Tabern. icon. 708.*

Habitat copiose extra sylvam Petersdorffensem in plaga Gieshübel respiciente, sicut etiam in agrorum marginibus, juxta viam inter Hernals, & Dornbach, alibique passim in aridis gramine tamen tenui vestitis.

LEPIDIVM.

1. *LEPIDIVM* floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. *Hort. Ups. 183.*

Lepidium foliis varie divisis incisisque. *Hort. Cliff. 331.*

Nasturtium sylvestre vulgatum. *Bauh. pin. 103.*

Nasturtium hortense. *Dodon. pempt. 711.*

- β. *Nasturtium hortense crispum.* *Bauh. pin. 104. prodr. 44. t. 43.*

Habitat in fossis suburbiorum Viennensium, Viden, Mazelsdorff, & Leopoldstadt, alibique præsertim circa Leytæpontum, & Moosbrunn.

Hospitatur β. sub dio in hortis oleraceis.

2. *LEPIDIVM* foliis lanceolatis, amplexicaulibus dentatis. *Linn. Sp. pl. 645.*

Draba umbellata f. *Draba major capitulis donata.* *Bauh. pin. 109. Moris. hist. 2. p. 313. t. 21. f. 1.*

Draba l. vulgaris. *Clus. hist. 2. p. 124.*

Habitat ubique in agrorum marginibus, & juxta vias publicas.

THLASPI.

1. *THLASTI* filiculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Fl. lapp. 251. Fl. Suec. 530.*

Thlaspi arvense, filiquis latis. *Bauh. pin. 105. Hall. Jen. Rupp. 86.*

Thlaspi cum filiquis latis. *Bauh. hist. 2. p. 923.*

Thlaspi latius. *Dodon. pempt. 712.*

Habitat in arvis, & agris passim, præsertim inter Hernals, & Dornbach, ac ad viam regiam Nusedorffensem sitis.

2. *THLASPI* filiculis subrotundis, foliis amplexicaulibus cordatis subserratis. *Linn. Sp. pl. 646.*

Thlaspi arvense perfoliatum majus. *Bauh. pin. 106.*

Thlaspi oleraceum. *Tabern. icon. 462.*

β. *Thlaspi*

β. *Thlaspi perfoliatum minus*. *Baub. pin.* 106.

Thlaspi 3. *pumilum*. *Clus. hist.* 2. p. 131.

Habitat *passim in arvis siccioribus*, *præsertim circa Dornbach*,
 & *Salmersdorff*, *alibique in vineis*, & *montibus*.

3. *THLASPI* siliculis subrotundis pilosis, foliis caulinis sagittatis hirsutis. *Linn. Sp. pl.* 646.

Thlaspi capsulis hirsutis. *Baub. hist.* 2. p. 922.

Thlaspi villosum capsulis hirsutis, *Baub. pin.* 106. *prodr.*
 212. t. 212.

Habitat *in vineis* & *arvis præsertim circa Döbling*, & *Grinzing*.

4. *THLASPI* siliculis subrotundis, foliis sagittatis dentatis incanis. *Fl. Suec.* 531.

Thlaspi arvense, *vaccariæ incano folio majus*. *Baub. pin.* 106.

Thlaspi latifolium. *Fuchs. hist.* 306.

Thlaspi vulgatus. *Baub. hist.* 2. p. 261. *Hall. Jen. Rupp.*
 85.

Thlaspi alterum. *Dodon. pempt.* 712.

Habitat *in arvis horumque marginibus*, *præsertim circa Heiligenstadt*, & *Lerchenfeld*.

5. *THLASPI* siliculis obcordatis, foliis radicalibus cuneiformibus integerrimis. *Linn. Sp. pl.* 647.

Thlaspi siliculis obverse cordatis, foliis imis spatulatis; summis amplexicaulibus sagittatis. *Sauv. monsp.* 121.

Thlaspi alpinum bellidis cæruleæ folio. *Baub. pin.* 106.

Thlaspi montanum 2. *Clus. hist.* 2. p. 131.

Habitat *in monte civitati Badensi imminente*.

6. *THLASPI* siliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Fl. Suec.* 532.

Bursa pastoris major folio sinuato. *Baub. pin.* 108. *Tournef. inst.* 216.

Bursa pastoria. *Baub. hist.* 2. p. 936. *Fuchs. hist.* 611. *Dodon. pempt.* 103.

β. *Bursa pastoris media*. *Baub. pin.* 103.

Habitat *ubique in cultis, agris, pomariis, vineis, ruderatis, & viis*. β. *præsertim in mœniis Viennensibus*.

COCHLEARIA.

• *COCHLEARIA* foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis. *Fl. lapp.* 256. *Fl. Suec.* 537.

Coch-

Cochlearia folio subrotundo. Bauh. pin. 110.

Cochlearia. Dodon. pempt. 594.

Hospitatur passim in hortis oleraceis sub dio.

2. *COCHLEARIA foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incis. Fl. Suec. 540.*

Cochlearia folio cubitali. Tournef. inst. 215.

Armoracia Rivini. Hall. Jen. Rupp. 87.

Raphanus sylvestris f. armoracia multis. Bauh. hist. 2. p. 851.

Raphanus rusticanus, crassa radice, lapathi folio. Lob. icon. 320.

Raphanus rusticanus. Bauh. pin. 96.

Raphanis magna. Dodon. pempt. 678.

Habitat hinc inde in arvis Minckendorffensibus, passim circa Leytæpontum, copiosè autem in fossis arcis Leytæpontanæ.

IBERIS.

1. *IBERIS foliis lanceolatis acuminatis: inferioribus ferratis; superioribus integerrimis. Hort. Ups. 184.*

Thlaspi umbellatum creticum iberidis folio. Bauh. pin. 106.

Draba f. Arabis f. Thlaspi Candia. Dodon. pempt. 713.

Thlaspidium creticum Rivini. Hall. Jen. Rupp. 271.

Nasturtium creticum quibusdam, flore rubente & albo. Bauh. hist. 2. p. 924.

Habitat in monte Leopoldsberg dicto monti Cecio seu Kalenberg aut Gallenberg vicino ad vinearum margines orientem respicientes.

Hospitatur autem sub dio passim in hortis.

2. *IBERIS foliis lanceolatis acutis subdentatis, floribus racemosis. Hort. Ups. 184.*

Thlaspi umbellatum arvense, iberidis folio. Bauh. pin. 106.

Thlaspi umbellatum arvense amarum. Bauh. hist. 925. Boerhaav. lugdb. 2. p. 7.

Thlaspidium foliis iberidis. Rivini. Hall. Jen. Rupp. 271.

Habitat in agris inter Weinhaus, & Hernals sitis.

ALYSSUM.

1. *ALYSSUM caule erecto, foliis lanceolatis incanis integerrimis, floribus corymbosis. Fl. Suec. 528.*

Alyf-

Alysson fruticosum incanum. *Tournef. inst.* 217. *Hall. Jen. Rupp.* 84.

Draba fruticosa incana. *Dill. app. ad Giff.* 17.

Thlaspi fruticosum incanum. *Baub. pin.* 108.

Thlaspi capsulis sublongis, incanum. *Baub. hist.* 2. p. 229.

Habitat passim in agrorum vinearumque marginibus circa Leytæpontum in area horti S. P. de Schwarzenberg Viennæ, in vallo suburbico Viennensi inter portam Hernalsensem, & Lichtenthalensem, in muris circa arcem Leytæpontanam, alibique in ruderalis.

C L Y P E O L A.

CLYPEOLA siliculis bilocularibus tetraspermis. *Linn. Sp. pl.* 652.

Thlaspi Alyssum dictum campestre majus. *Baub. pin.* 107.

Alyssum minimum. *Clus. hist.* 2. p. 133.

Habitat ubique in agrorum, vinearumque marginibus, muris, & ad vias; præsertim inter Hernals, & Dornbach.

B I S C U T E L L A.

BISCUTELLA siliculis orbiculato - didymis a stilo divergentibus. *Hort. Ups.* 185.

Thlaspidium monspeliense, hieracii folio hirsuto. *Tournef. inst.* 214. *Boerhaav. lugdb.* 2. p. 6.

Thlaspi biscutatum asperum hieracifolium & majus. *Baub. pin.* 107.

Thlaspi clypeatum. *Clus. hist.* 2. p. 133.

Thlaspi parvum, hieracifolium, sive lunaria lutea, monspeliensium, & leucojum luteum marinum, & biscutella. *Lob. icon.* 214.

Leucojum alyssoides, umbellatum, montanum. *Col. ecphr.* 1. p. 285.

Leucojum biscutatum, asperum, hieracifolium majus. *Moris. hist.* 2. p. 249.

Habitat in montibus Badensibus, Medlingensibusque in petris, & ad viam vallis Brühl, nec non in monte Leytaberg dicto. Alibique.

L V N A R I A.

LVNARIA siliculis oblongis. *Linn. Sp. pl.* 653.

Lunaria foliis cordatis. Fl. Suec. 529.

Lunaria major filiqua longiore. Baub. hist. 2. p. 882.

Viola lunaria major filiqua oblonga. Baub. pin. 203.

Viola latifolia, lunaria odorata. Clus. hist. 1. p. 297.

Viola lunaria II. Tabern. icon. 314.

Bulbonac radice rediviva, filiqua oblonga. Hall. Jen. Rupp. 84.

Habitat in valle Breinina, & in sylvis circa Neostadium se Neopolim Austriæ varius.

2. *LUNARIA filiculis subrotundis. Linn. Sp. pl. 653.*

Lunaria major filiqua rotundiore. Baub. hist. 2. p. 881.

Viola lunaria major filiqua rotunda. Baub. pin. 203.

Viola lunaris I. Tabern. icon. 313.

Viola latifolia. Dodon. pempt. 161. Dalech. hist. 805.

Bulbonac annuum, filiqua rotundiore, flore purpureo. Hall. Jen. Rupp. 83.

Hospitatur passim in hortis, præsertim Murobacii & in horto Viennensi Excellentissimi Comitis Ferdinandi ab Harrach, ab Excellentissimo Comite Friderico ab Harrach omnium primo ex Italia allata. Sub dio, biennis.

SILIQVOSA.

DENTARIA.

1. *DENTARIA foliis ternis ternatis. Linn. Sp. pl. 653.*

Dentaria foliis omnibus ternatis. Roy. Lugdb. 340.

Dentaria triphyllos. Baub. pin. 322. Clus. hist. 2. p. 121. n. 4.

Ceratia plinii. Col. ecphr. 1. p. 308. t. 307.

Habitat passim in umbrosis Austriæ sylvis, & ad radices montium, præsertim supra Grinzing in sylvæ principio ad fossa profundam montem Cecium seu Kalenberg respicientem.

2. *DENTARIA foliis inferioribus pinnatis, summis simplicibus. Fl. Suec. 565.*

Dentaria heptaphyllos baccifera. Baub. pin. 322.

Dentaria heptaphyllo baccifera. Clus. hist. 2. p. 121.

Habitat cum priore supra Grinzing, & circa Burckersdorf.

CARDAMINE.

1. *CARDAMINE foliis simplicibus ovatis integerrimis: petiolis longis. Fl. lapp. 206. t. 9. f. 2. Fl. Suec. 56.*

Nastur.

Nasturtium alpinum, bellidis folio, minus. *Baub. pin.*
105.

Plantula Cardamines æmula. *Clus. hist.* 2. p. 129.

Habitat in Etscher.

2. *CARDAMINE* foliis ternatis, caule subnudo. *Linn. Sp. pl.*
654.

Cardamine foliis ternatis. *Fl. Suec.* 563.

Cardamine alpina trifolia. *Clus. hist.* 2. p. 127.

Nasturtium alpinum trifolium. *Baub. pin.* 104.

Habitat in udis montis Schneeberg.

3. *CARDAMINE* foliis pinnatis, floribus apetalis. *Linn. Sp.*
pl. 655.

Cardamine foliis pinnatis: pinnis laciniatis. *Fl. Suec.* 561.

Cardamine annua, exiguo flore. *Tournef. inst.* 224,

Sisymbrii Cardamines species quædam insipida. *Baub. hist.*
2. p. 886.

Nasturtium minimum annuum, flore albo. *Moris. hist.* 2.
p. 221. s. 3. t. 4. f. 1.

Habitat in nemoribus insularum Danubialium, & præsertim in
Tabor.

4. *CARDAMINE* foliis pinnatis: foliolis radicalibus subro-
tundis; caulinis lanceolatis. *Linn. Sp. pl.* 656.

Cardamine foliis pinnatis: foliolis subrotundis integris.
Fl. Suec. 559.

Cardamin pratensis magno flore purpurascente. *Tour-
nef. inst.* 224. *Hall. Jen. Rupp.* 79. *Boerhaav. lugdb.* 2.
p. 16.

Nasturtium pratense magno flore. *Baub. pin.* 104.

Iberis Fuchsi, five *Nasturtium pratense sylvestre*. *Baub.*
hist. 2. p. 889.

Flos cuculi. *Dodon. pempt.* 592.

Habitat in prato uliginoso Döblingensi, in Tabor, & in insulis
Danubialibus Fischamentæ.

S I S Y M B R I V M.

5. *SISYMBRIVM* filiquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis
subcordatis. *Linn. Sp. pl.* 657. *Fl. Suec.* 552.

Sisymbrium aquaticum. *Tournef. inst.* 226. *Math.* 487.
Boerhaav. lugdb. 2. p. 15. *Hall. Jen. Rupp.* 80.

Sisymbria Cardamine. *Fuchs. hist.* 723.

Nasturtium aquaticum supinum. *Baub. pin. 104.*
 Habitat in locis irriguis circa Burckersdorff, & ad pedem alpis
 Wexel. *Alibique.*

2. *SISYMERIVM* filiquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis serratis. *Linn. Sp. pl. 657.*

Sisymbrium palustre repens, Nasturtii folio. *Tournef. inst. 226. Hall. Jen. Rupp. 81. Boerhaav. lugdb. 2. p. 16.*

Eruca palustris Nasturtii folio, filiqua oblonga. *Baub. pin. 98.*

Eruca sylvestris minor, lutea parvoque flore. *Baub. pin. 98.*

Eruca quibusdam sylvestris repens, flosculo luteo. *Baub. hist. 2. p. 866.*

Habitat in Tabor, infra Nusdorff, & in arborum confiniis humidis passim circa Leytæpontum.

3. *SISYMERIVM* petalis calyce minoribus, foliis decomposito - pinnatis. *Fl. Suec. 553.*

Sisymbrium corolla calyce minore foliis multifidis linearibus. *Fl. Lapp. 261.*

Sisymbrium annuum absinthii minoris folio. *Tournef. inst. 226.*

Accipitrina Rivini, & *Loniceri.* *Hall. Jen. Rupp. 81.*

Sophia chirurgorum. *Lob. icon. 738.*

Seriphium absinthium. *Fuchs. hist. 2.*

Seriphium Germanicum, five *Sophia* quibusdam. *Baub. hist. 2. p. 886.*

Nasturtium sylvestre tenuissime divisum. *Baub. pin. 104.*

Habitat in maceris, muris, & ruderatis passim.

4. *SISYMERIVM* foliis pinnato - hastatis dentatis, filiquis erectis. *Linn. Sp. pl. 659.*

Erysimum foliis lyrato - pinnatis extimo hastato. *Fl. Suec. 556.*

Erysimum alterum filiquis erucæ. *Baub. pin. 101. Hall. Jen. Rupp. 83.*

Erysimum latifolium majus glabrum. *Baub. pin. 101.*

Erysimum II. *Tabern. icon. 448.*

Irio lævis apulus *Erucæ* folio. *Col. ecphr. 1. p. 264. t. 265.*

Habitat ad hortum olim S. P. Eugenii Viennæ, inter Dornbach ac Weidling, ac passim in cultis circa Leytæpontum.

5. *SISYMERIVM* foliis lanceolatis dentato - serratis. *Hort. Ups. 192.*

Draba lutea siliquis strictissimis. *Baub. pin. 110. Moris. hist. 2. p. 234. s. 3. t. 7. f. 1.*

Hesperis foliis ellipticis glabris circum ferratis. *Hall. belv. 563.*

Arabis quibusdam dicta planta. *Cam. epit. 342.*

Habitat in valle Döblingensi.

ERYSIMVM.

• *ERYSIMVM* siliquis spicæ adpressis. *Fl. Suec. 554.*

Erysimum vulgare. *Baub. pin. 100.*

Iria sive *Erysimum.* *Dodon. pempt. 714. Lob. icon. 206.*

Verbena mas. *Fuchs. hist. 592.*

Habitat passim in muris, tectis, & ruderatis.

• *ERYSIMVM* foliis lyratis extimo subrotundo. *Fl. Suec. 557.*

Sisymbrium erucæ folio glabro, flore luteo. *Tournef. inst. 226. Hall. Jen. Rupp. 80.*

Eruca lutea latifolia sive *barbarea.* *Baub. pin. 98.*

Barbarea. *Dodon. pempt. 712. Baub. hist. 2. p. 868.*

Barbarea fœmina. *Tabern. hist. 843.*

Habitat in locis ubi per hyemem stagnarunt aquæ, præsertim ad viam Nusdorffensem, in Brader, & ad Scrobes, ac in agris humidioribus circa Leytæpontum.

ERYSIMVM foliis cordatis. *Fl. Suec. 558.*

Hesperis allium redolens. *Tournef. inst. 222.*

Alliaria. *Fuchs. hist. 104. Baub. pin. 110. Cam. epit. 589. Dodon. pempt. 686.*

Habitat passim in sepibus, cultis, pomariis, & nemoribus, præsertim in valle Döblingensi inter Dornbach, & Neustift, ac circa Leytæpontum.

ERYSIMVM foliis integris lanceolatis. *Fl. Lapp. 263. Fl. Suec. 555.*

Turritis leucoji folio. *Tournef. inst. 224.*

Myagrum siliqua longa. *Baub. pin. 109.*

Camelina, Myagrum alterum *Thlaspi* effigie. *Lob. icon. 225.*

Habitat in arvis trans Alsterbach, & Waringergassen Viennæ, ac in monte Leopoldsberg dicto monti Cecio, seu Kalenberg vicino.

CHEIRANTHVS.

CHEIRANTHVS foliis lanceolatis dentatis, caule recto, siliquis tetragonis. *Linn. Sp. pl. 661.*

Erysimum foliis integris lanceolatis margine repando-dentatis. Hort. Ups. 192.

Leucojum luteum sylvestre angustifolium. Bauh. pin. 202.

Leucojum sylvestre. Clus. hist. 1. p. 299. Bauh. hist. 2. p. 873.

Habitat in montibus Badensibus, in Leytaberg, supra vallum Suburbicum Viennensem ad hortum olim S. P. Eugenii, & in horto olim Favoritæ Videntis, alibique.

2. *CHEIRANTHVS foliis lanceolatis acutis glabris. Hort. Ups. 187.*

Leucojum luteum vulgare. Bauh. pin. 202.

Leucojum luteum. Dodon. pempt. 160.

β. Leucojum luteum, magno flore. Bauh. pin. 202.

γ. Leucojum luteum pleno flore majus, & minus. Bauh. pin. 202.

Habitat copiose in mœniis arcis Trautmannsdorffensis, probabiliter ex seminibus a passeribus in his muris copiose nidificantibus ad cibandos pullos hortulano furtim ablati.

Hospitatur β. & γ. ubique in hortorum apricariis æstate, hyeme in cellis, & frigidariis.

3. *CHEIRANTHVS foliis lanceolatis integerrimis obtusis incanis, filiquis apice truncatis compressis, caule suffruticoso. Hort. Ups. 187.*

Leucojum incano folio hortense. Bauh. pin. 200.

Viola alba, & purpurea. Lob. icon. 329.

Hospitatur passim in hortis æstate in apricariis, hyeme in cellis vel frigidariis.

4. *CHEIRANTHVS foliis lanceolatis subdentatis obtusis incanis, filiquis cylindricis apice acutis, caule herbaceo. Linn. Sp. pl. 662.*

Leucojum incanum minus. Bauh. pin. 200.

Hospitatur nunc passim in hortis sub dio, præsertim Leytæponti, apud PP. Capucinos, si per hyemem in cubiculo conservatur, vel frigidario sæpius biennis. Unde merito quærit Linnæus Sp. pl. p. 662. An forte sola varietas antecedentis? caulis suffruticosus subsequente anno evadit.

5. *CHEIRANTHVS filiquarum apicibus tridentatis. Linn. Sp. pl. 663.*

Leucojum marinum. Cam. hort. 87. t. 24. Moris. hist. 2. p. 242. s. 3. t. 8. f. 13.

Hospitatur hinc inde in hortis sub dio, præsertim in hortulo Domini de Spies Viennæ intra Civitatem ad monasterium monialium ad St. Jacobum sito.

HESPERIS.

1. HESPERIS caule hispido ramoso patente. *Hort. Ups.* 187.
 Hesperis caule hispido procumbente. *Hort. Cliff.* 335.
 Hesperis montana pallida. *Baub. pin.* 202.
 Hesperis colore ineleganti. *Baub. hist.* 2. p. 879.
 Hesperis l. *Clus. hist.* 1. p. 296.
 Hesperis pannonica. *Cam. hort. t.* 18.
 Habitat passim inter frutices circa Leytæpontum, Fischamentam, & Hamburgum, sicut etiam in vallo suburbico Viennensi retro hortum olim S. P. Eugenii.
2. HESPERIS caule simplici erecto, foliis ovato-lanceolatis denticulatis, petalis mucrone emarginatis. *Hort. Cliff.* 188.
 Hesperis hortensis. *Baub. pin.* 202.
 Viola matronalis. *Dodon. pempt.* 161.
 Hospitatur passim in hortis sub dio Viennæ, & Leytæponti, hyeme tamen plerumque stramine tecta.

ARABIS.

1. ARABIS foliis amplexicaulibus dentatis. *Hort. Cliff.* 335.
Linn. Sp. pl. 664.
 Arabis caule simplici, foliis ovatis utrinque denticulatis.
Fl. Lapp. 257.
 Draba alba filiquosa repens. *Baub. pin.* 109.
 Draba 3. succulento folio. *Clus. hist.* 2. p. 125.
 Habitat in alpe Breinina, & Schneeberg.
2. ARABIS foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. *Fl. Suec.* 567.
 Turritis foliis lanceolatis integris petiolatis, ad exortum ramorum solitariis. *Hort. Cliff.* 339.
 Turritis vulgaris ramosa. *Tournef. inst.* 224. *Hall. Jen. Rupp.* 78.
 Bursa pastoris sive Pilosella filiquosa. *Baub. hist.* 2. p. 870.
 Bursa pastoris similis filiquosa major, seu majoribus foliis. *Baub. pin.* 108.
 Habitat in valle Döblingensi, copiosius autem in montibus Rodaunensibus, & Latifontanis.

TURRITIS.

1. TURRITIS foliis omnibus hispidis, caulinis amplexicaulibus. *Fl. Suec.* 545.

Turritis hirsuta montana flore albo. Hall. Jen. Rupp. 79.

Turritis vulgaris minor. Raj. Syn. 3. p. 294.

*Erysimo similis hirsuta non laciniata alba. Bauh. pin. 101.
prodr. 42. t. 42.*

Habitat in pascuis sylvaticis circa Dornbach, & Latifontum.

B R A S S I C A.

1. *BRASSICA radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis sessilibus. Fl. Suec. 546.*

*α. Brassica campestris perfoliata flore luteo. Loes. pruss. 29.
Fl. Lapp. 265.*

*β. Brassica campestris, perfoliata, flore albo. Bauh. pin. 112.
Hall. Jen. Rupp. 75.*

Brassica campestris l. Clus. hist. 2. p. 127.

Habitat α. in insula Geimanniana ad fossam oppidum Fischamentense respicientem. β. in fossa valli suburbici Viennensis ad Nosocomium ad St. Marcum, & hinc inde in arvis.

2. *BRASSICA radice caulescente fusiformi. Fl. Suec. 547.*

Napus sylvestris. Bauh. pin. 95.

Napus. Dodon. pempt. 674.

β. Napus sativa. Bauh. pin. 95.

Hospitatur passim sub dio in hortis oleraceis, & agris.

3. *BRASSICA radice caulescente orbiculari depressa carnosa.*

Hort. Ups. 190.

Rapa sativa rotunda. Bauh. pin. 89.

Rapum. Cam. epit. 218.

Hospitatur passim sub dio in arvis.

4. *BRASSICA radice caulescente tereti carnosa. Hort. Ups. 189.*

Brassica maritima arborea s. procerior ramosa. Moris.

hist. 2. p. 208. Raj. hist. 796.

β. Brassica alba, vel viridis. Bauh. pin. 111.

γ. Brassica capitata rubra. Bauh. pin. 111.

δ. Brassica capitata alba. Bauh. pin. 111.

ε. Brassica laciniata rubra. Bauh. hist. 2. p. 832.

ζ. Brassica cauliflora. Bauh. pin. 111. Dodon. pempt. 624.

Brassica florida botrytis. Lob. hist. 123.

η. Brassica radice napiformi. Tournef. inst. 219.

Napo-Brassica. Bauh. pin. 111. prodr. 54.

θ. Brassica gongylodes. Bauh. pin. 111,

Brassica Caulorapa. Bauh. hist. 2. p. 829.

Caulorapum. Cam. epit. 251.

*Hospitatur passim in hortis oleraceis sub dio præsertim in Erdbeeren-
sensibus, & Simmeringensibus.*

5. BRASSICA foliis dentato - pinnatifidis, caule hispido siliquis lævibus. *Linn. Sp. pl. 667.*

Sisymbrium foliis pinnato - dentatis. *Hort. Cliff. 337.*

Eruca sylvestris major lutea, caule aspero. *Bauh. pin. 98.*

Eruca sylvestris. *Dodon. pempt. 708.*

Eruca sativa. *Fuchs. hist. 262.*

Habitat in prato murobacensi ad fossam transversam.

S I N A P I S.

1. SINAPIS siliquis multangulis toroso - turgidis rostro longioribus. *Fl. Suec. 548.*

Sinapi arvense præcox semine nigro. *Moris. hist. 2. p. 216.*

Eruca arvensis vulgaris. *Hall. Jen. Rupp. 82.*

Rapistrum flore luteo, foliis incis, vel sinuatis, *Bauh. pin. 95. hist. 2. p. 844.*

Rapistrum. *Dodon. pempt. 675.*

Rapistrum arvorum. *Lob. icon. 198.*

Habitat in arvis transdanubianis Hollebrunnensibus, & circa Leytæpontum in agris passim inter bordeum.

2. SINAPIS siliquis hispidis : rostro obliquo longissimo. *Linn. Sp. pl. 668.*

Sinapi siliqua hirsuta, semine albo, & rufo. *Bauh. hist. 2. p. 859. Hall. Jen. Rupp. 82.*

Sinapi apii folio. *Bauh. pin. 99.*

Sinapi sativum alterum. *Dodon. pempt. 707.*

Hospitatur circa Civitatem Cremsensem in agris, hortisque oleraceis sub dio.

R A P H A N V S.

1. RAPHANVS siliquis teretibus torosis bilocularibus. *Hort. Ups. 188.*

Raphanus minor oblongus. *Bauh. pin. 96.*

Raphanus major orbicularis s. rotundus. *Bauh. pin. 96.*

β. *Raphanus niger.* *Bauh. pin. 96.*

Hospitatur ubique in hortis oleraceis.

2. RAPHANVS siliquis teretibus articulatis lævibus unilocularibus. *Fl. Suec. 568.*

Raphanistrum siliqua articulata glabra majore, & minore. *Moris. hist. 2. p. 265. s. 3. t. 13. f. 12. Tournef. inst. 230. Hall. Jen. Rupp. 72.*

Rapistrum flore albo, siliqua articulata. *Bauh. pin. 95.*

Rapistrum flore albo striato, sinapi agreste album.
Baub. hist. 2. p. 851.

β. Raphanistrum segetum flore luteo vel pallido Tournefortii. *Hall. Jen. Rupp. 72.*

Rapistrum flore luteo, siliqua glabra articulata. *Raj. hist. 808.*

Habitat in arvis extra vallum suburbicum Viennensem, & hortum olim S. P. Eugenii. β. passim in arvis & mœniis Viennensibus supra portam Stubensem.

ISATIS.

I. ISATIS foliis radicalibus crenatis; caulinis sagittatis, siliculis oblongis. *Fl. Suec. 543.*

Isatis. *Hort. Cliff. 241.*

Isatis sylvestris f. angustifolia. *Baub. pin. 113. Hall. Jen. Rupp. 63.*

Isatis sylvestris. *Fuchs. hist. 330. Dodon. pempt. 79.*

Isatis, sive Glastrum spontaneum. *Baub. hist. 2. p. 909.*

Habitat in agris inter segetes, præsertim in Fischamentensibus, & in monte Leopoldsberg dicto monti Cecio, seu Kalenberg vicino.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA

DECANDRIA.

GERANIVM.

I. GERANIVM calycibus monophyllis: tubis longissimis subsefilibus, radice subrotunda. *Linn. Sp. pl. 676.*

Geranium calycibus monophyllis: tubis longissimis sefilibus, radice subrotunda, foliis pinnatifidis. *Roy. lugdb. 352.*

Geranium triste Rivini. sive indicum noctu olens. *Parkinson Theatr. 709. Hall. Jen. Rupp. 288. Cornut. Canad. 109. t. 110.*

Hospitatur cum sequentibus passim in hortis magnatum, & curio-

rosorum æstate in apricariis, hyeme in frigidariis, præsertim in horto S. P. de Schwarzenberg, Excellentissimi Comitum Ferdinandi ab Harrach, Excellentissimi Comitum ab Althan, nec non in horto Domini Maximiliani celeberrimi Mercatoris in platea Alstergassen Viennæ.

2. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis orbiculato reniformibus tomentosis crenatis integriusculis. *Hort. Ups. 195.*

Geranium africanum arborescens, malvæ folio pingui, flore coccineo. *Dill. elth. 151. t. 125. f. 151. 152.*

Geranium africanum arborescens, malvæ folio plano lucido, flore elegantissimo Kermesino. *Mart. Cent. 3. f. 3.*

Hospitatur cum antecedente.

3. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis lobatis undatis villosis. *Hort. Ups. 196.*

Geranium calycibus monophyllis, floribus capitatis, foliis cordatis lobatis crenatis pilosis. *Hort. Cliff. 345. Roy. lugdb. 353.*

Geranium africanum frutescens, malvæ folio laciniato, o orato. *Herm. lugdb. 277. t. 278.*

Geranium americanum arborescens, vitis folio, odore melissæ. *Dill. elth. 152. t. 126. f. 153.*

Hospitatur cum antecedentibus.

4. GERANIUM calycibus monophyllis, corollis papilionaceis, vexillo dipetalo, foliis bipinnatis. *Linn. Sp. pl. 677.*

Geranium africanum coriandri folio, floribus incarnatis majus. *Herm. lugdb. 279. t. 178.*

Hospitatur cum antecedentibus.

5. GERANIUM calycibus monophyllis, foliis orbiculatis, palmatis incisus pilosis, caule herbaceo. *Hort. Ups. 197.*

Geranium calycibus monophyllis longissimis sessilibus, fructu assurgente, foliis palmatis crenatis. *Hort. Cliff. 345.*

Geranium africanum alchimillæ hirsuto folio, floribus albidis. *Herm. lugdb. 282. t. 283.*

Hospitatur cum antecedentibus.

6. GERANIUM calycibus monophyllis, pedunculis multifloris, foliis cordatis subrotundis lobatis crenatis. *Linn. Sp. pl. 679.*

Geranium pedunculis bifloris, foliis cordatis incis glabris, caulibus filiformibus procumbentibus. Roy. lugdb. 351.

Geranium africanum uvæ crispæ folio, calycibus procumbentibus, floribus exiguis rubellis. Herm. lugdb. 287. t. 289.

Hospitatur cum antecedentibus, & præsertim olim in horto Favoritæ Videntis.

7. *GERANIUM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis incis obtusis. Fl. Suec. 579.*

α. Geranium cicutæ folio inodorum. Boerhaav. lugdb. 1. p. 266.

Geranium moschatum inodorum Hort. Eyst. Vern. Ord. 1. p. 8. f. 1.

Geranium supinum. Dodon. pempt. 63.

β. Geranium cicutæ folio minus & supinum. Baub. pin. 319.

Geranium septimum sive Geranium gruinum. Dodon. pempt. 64.

Geranium folio ad Myrrhidem accedente minus. Baub. hist. 3. p. 479.

Geranium arvense. Tabern. icon. 57.

γ. Geranium cicutæ folio moschatum. Baub. pin. 319.

Habitat α in agrorum marginibus, & maceriis præsertim circa Leytæpontum; ad portam valli suburbici Viennensis Hernalsensem; & in valle Döblingensi. β. ubique in arvis & agrorum marginibus.

Hospitatur γ. in hortis curiosorum hinc inde.

8. *GERANIUM pedunculis bifloris folisque alternis, calycibus subaristatis, caule erecto. Linn. sp. pl. 681.*

Geranium pedunculis bifloris alternatim cauli integro superne nudiusculo insidentibus. Hort. Ups. 198.

Geranium montanum fuscum. Baub. pin. 318.

Geranium montanum. Dodon. pempt. 64.

Geranium phœum flore reflexo. Baub. hist. 3. p. 477.

Gruinalis petalis fuscis reflexis. Hall. Jen. Rupp. 130.

β. Geranium batrachoides hirsutum, flore atrorubente. Baub. pin. 318.

Geranium I. pullo flore. Clus. hist. 2. p. 99.

Geranium phœum sive fuscum petalis rectis, seu planis. Moris. hist. 2. p. 515.

Gru-

Gruinalis montana petalis nigrofuscis & obscuris planioribus. *Hall. Jen. Rupp. 130.*

Habitat in sylva inter Novem Ecclesias, & Durrenstein. *β. cum priore & passim in alpibus ubi sylvæ desunt.*

GERANIVM pedunculis bifloris foliis peltatis inciso-feratis, caule erecto. *Fl. Lapp. 266. Fl. Suec. 572.*

Geranium batrachoides, folio aconiti. *Bauh. pin. 317.*

Geranium 2. batrachoides minus. *Clus. hist. 2. p. 99.*

Gruinalis pratensis foliis Ranunculi, Aconitive. *Hall. Jen. Rupp. 129.*

Habitat in Schneeberg, valleque ante Buchbergam.

GERANIVM pedunculis bifloris, foliis peltatis multipartitis rugosis pinnato-laciniatis acutis. *Linn. Sp. pl. 681. Fl. Suec. 573.*

Geranium batrachoides, gratia Dei germanorum. *Bauh. pin. 318.*

Geranium 3. batrachoides majus. *Clus. hist. 2. p. 100.*

Habitat in pratis Corneuburgensibus, Ladendorffensibus, & vallis Breininæ.

GERANIVM pedunculis bifloris, calycibus pilosis decem angulatis. *Linn. Sp. pl. 681.*

Geranium pedunculis bifloris, foliis quinque trive partitis, lobis pinnatifidis. *Hort. Cliff. 244. Fl. Suec. 578.*

Geranium robertianum primum. *Bauh. pin. 319.*

Geranium robertianum. *Dodon. pempt. 62. Lob. icon. 657.*

Geranium robertianum murale. *Bauh. hist. 3. p. 480.*

Geranium III. *Fuchs. hist. 206.*

Geranium V. *Cam. epit. 603.*

Habitat inter saxa in valle Döblingensi, ad rivum in fine pagi Dornbacensis, circa Murobadium, & Salmersdorffalibique passim in opacis & ad muros.

GERANIVM pedunculis bifloris, calycibus pyramidatis angulatis rugosis, foliis quinquelobis rotundatis. *Fl. Suec. 574.*

Geranium lucidum saxatile. *Bauh. pin. 318.*

Geranium lucidum. *Bauh. hist. 3. p. 481.*

Geranium saxatile. *Raj. hist. 1060.*

Geranium rotundifolium saxatile montanum. *Col. ecphr. 1. p. 138. t. 137.*

Habitat in fine vallis Breininæ in rupibus umbrosis.

GERANIVM pedunculis bifloris foliisque rameis alternis, caule ramoso diffuso, calycibus muticis. *Linn. Sp. pl. 682.*

Ge-

Geranium pedunculis bifloris, foliis sparsis reniformibus semiquinquefidis mollibus & latissimis. Hall. belv. 366.

Geranium columbinum villosum petalis bifidis purpureis. Vaill. paris. t. 15. f. 3. p. 79.

Gruinalis folio malvæ rotundo, flore majore. Hall. Jen. Rupp. 131.

Habitat ad domos in pagis, & in plateis, præsertim ad domum Burckersdorffii ubi exitur ad torrentem Viennensem.

14. *GERANIUM pedunculis bifloris, foliis quinquepartitis multifidis angulatis: laciniis acutis, capsulis glabris, calycibus aristatis. Fl. Suec. 576.*

Geranium columbinum foliis dissectis, pediculis florum longissimis. Raj. hist. 1059. Vaill. paris. 79. t. 15. f. 4.

Geranium foliis ad nervum quinquefidis, pediculo longissimo, caule prostrato. Hall. belv. 367.

Gruinalis arvensis foliis malvæ profunde sectis, floribus longis pediculis insidentibus. Hall. Jen. Rupp. 131.

Habitat Burckersdorffii trans rivum ad pedem primi montis e quo primus rivulus effluit cum Hormino luteo glutinoso Bauhini.

15. *GERANIUM pedunculis bifloris, petalis integris longitudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus incis. Linn. Sp. pl. 683.*

Geranium pedunculis bifloris, foliis subrotundis multifidis, caule procumbente. Fl. Suec. 575.

Geranium folio malvæ rotundo. Bauh. pin. 318.

Geranium alterum. Fuchs. hist. 205.

Geranium columbinum majus, flore minore cæruleo. Vaill. Paris. 79. t. 15. f. 1.

Gruinalis folio malvæ rotundo. Hall. Jen. Rupp. 131.

Pes columbinus. Dodon. pempt. 61.

Habitat passim in cultis.

16. *GERANIUM pedunculis unifloris, foliis quinque partitis trifidis orbiculatis. Linn. Sp. pl. 683.*

Geranium pedunculis simplicibus unifloris. Fl. Suec. 571.

Geranium sanguineum, maximo flore. Bauh. pin. 318.

Geranium VII. hæmatodes. Clus. hist. 2. p. 102.

Habitat supra Lapidicinam Dornbacensem alibique in pratis siccis umbrosis.

POLYANDRIA.

SIDA.

SIDA foliis subrotundo-cordatis-acuminatis crenatis. Hort.

Ups. 198.

Althæa Theophrasti, flore luteo. Baub. pin. 316.

Althæa altera f. Abutilon. Cam. epit. 668.

Abutilon. Dodon. pempt. 656. Dalech. hist. 592.

Hospitatur hinc inde in hortis sub dio præsertim Leytæponti,
in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

ALTHÆA.

ALTHÆA foliis simplicibus tomentosis. Hort. Ups. 204.

Althæa dioscoridis, & plinii. Baub. pin. 315.

Althæa. Fuchs. hist. 15. Cam. epit. 667.

Althæa ibiscus. Dodon. pempt. 655.

Malva palustris mollis & incana. P. Herman. Hall. Jen.

Rupp. 15.

Habitat ad viam regiam Draskirchensem, Wolkersdorffensem
& Pösoniensem, in pratorum, agrorumque & vinearum
marginibus, inter fruticesque circa Leytæpontum, & Prell-
kirchen passim.

ALTHÆA foliis inferioribus palmatis, superioribus digni-
tatis, caule fruticoso. Hort. Ups. 205.

Althæa foliis compositis scabris. Hort. Cliff. 349.

Alcea cannabina. Baub. pin. 316.

Alcea fruticosa, cannabino folio. Clus. hist. 2. p. 25.

Habitat hinc inde ad sæpes, præsertim in marginibus vinearum
Adelsbergensium, Leytæponti subinde, minus tamen frequens.

ALCEA.

ALCEA foliis sinuato angulosis. Hort. Cliff. 348. Hort.

Ups. 204.

Malva rosea folio subrotundo. Baub. pin. 315. Boerhaav.

lugdb. 1. p. 269.

Malva hortensis. Dodon. pempt. 652.

Hospitatur passim in hortis sub dio flore diversi coloris.

MALVA.

MALVA caule repente, foliis cordato - orbiculatis obso-
lete quinquelobis. Fl. Suec. 58.

Mal-

Malva sylvestris folio subrotundo. Baub. pin. 314.

Malva sylvestris pumila. Fuchs. hist. 508. Dodon. pempt. 653.

Habitat ubique in ruderatis, plateis, & juxta vias, præsertim Leytæponti.

2. *MALVA* caule erecto herbaceo, foliis lobatis obtusis pedunculis petiolisque pilosis. *Linn. Sp. pl. 689.*

Malva caule erecto foliis multipartitis. Fl. Suec. 581.

Malva sylvestris folio sinuato. Baub. pin. 314.

Malva sylvestris procerior. Dodon. pempt. 653.

Malva sylvestris recta. Cord. hist. 114.

Habitat ad sepes & ad vias in campestribus passim, præsertim autem in sylva horti Leytæpontani Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

3. *MALVA* caule erecto, foliis angulatis crispis, floribus axillaribus glomeratis. *Hort. Ups. 200.*

Malva foliis crispis. Baub. pin. 315.

Malva crispa. Dodon. pempt. 653.

Habitat quandoque inter hortorum rejectamenta, præsertim inter hortos Erdbeerenses, & proxime ad ultimam domum dextram ad portam valli suburbici Viennensis ad St. Marcum sitam.

4. *MALVA* caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis. *Fl. Suec. 582.*

Alcea vulgaris major. Baub. pin. 316.

Alcea vulgaris. Clus. hist. 2. p. 25. Dodon. pempt. 656.

Habitat in agrorum vinearumque marginibus, ad viam regiam Draskirgensem, & in prato Murobacensi minus frequens.

G O S S Y P I V M.

1. *Gossypium* foliis quinquelobis, caule herbaceo. *Hort. Ups. 203.*

Gossypium caule decumbente. Hort. Cliff. 350.

Gossypium frutescens, semine albo. Baub. pin. 430.

Gossypium. Cam. epit. 203.

Xylon s. Gossypium herbaceum. Baub. hist. 1. p. 343. Tournef. inst. 101.

Hospitatur in caldario horti Leytæpontani Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

H I B I S C V S.

1. *Hibiscus* foliis ovato-lanceolatis: superne inciso serratis, caule arboreo. *Hort. Ups. 205.*

Alcea arborescens syriaca. Baub. pin. 316.

Alcea arborescens. Cam. hort. t. 3. 4.

Hospitatur Viennæ in horto S. P. de Schwarzenberg, æstate in apricario, hyeme in frigidario, alibique in hortis.

HIBISCUS foliis tripartitis incis, calycibus inflatis. Hort. Ups. 206.

Trionum. Hort. Cliff. 349.

Alcea vesicaria. Baub. pin. 317.

Alcea peregrina folisequa. Lob. icon. 656.

Hospitatur in horto Domini Maximiliani celebris Mercatoris in platea Alstergassen Viennæ.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA

HEXANDRIA.

FVMARIA.

F*VMARIA caule simplici, bracteis longitudine florum. Linn. Sp. pl. 690.*

Fumaria caule simplicissimo diphylo, floribus calyce destitutis. Fl. Suec. 585.

Fumaria bulbosa radice cava major. Baub. pin. 142.

Fumaria bulbosa radice cava, flore purpurascente, & albo. Baub. hist. 3. p. 204.

Radix cava major. Clus. hist. 1. p. 271.

Radix cava. Dodon. pempt. 327. Lob. hist. 439.

Split sylvaticum præcox radice rotunda Pseudofumaria Rivini. Hall. Jen. Rupp. 268.

Habitat in sylvis circa Hiedldorff & Burckersdorff, in Leytaberg, & Latifonti, copiose autem in saltibus Leytæpontanis, nec non in ipsa sylvula horti Leytæpontani ad Excellentissimum Comitem Ernestum ab Harrach spectante.

F*VMARIA pericarpis monospermis racemosis, caule difuso. Linn. Sp. pl. 700.*

Fumaria pericarpis monospermis. Fl. Suec. 584.

Fumaria officinarum, & Dioscoridis. Baub. pin. 143.

Fu-

Fumaria. Fuchs. hist. 338. Cam. epit. 890. Dodon. pempt. 59.
Capnos. Lob. hist. 437.

Habitat ubique in vineis, & hortis oleraceis, sicut etiam copiose in vallo suburbico Viennensi inter hortum olim S. P. Eugenii & Viden, ac inter Hernals & Lichtenthal.

OCTANDRIA.

POLYGALLA.

1. *POLYGALLA* floribus cristatis racemosis, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. *Linn. Sp. pl. 702.*

Polygala foliis lineari-lanceolatis, caulibus diffusis herbaceis. Fl. Suec. 586.

Polygala major. Baub. pin. 215.

Polygala vulgaris major. Clus. hist. 1. p. 324. Vaill. paris. 161. t. 32. f. 1.

- β. *Polygala vulgaris. Baub. pin. 215.*

Polygala foliis imis subrotundis, superioribus angustis acutis. Hall. belv. 606.

Habitat passim in pratis & pascuis circa Dornbach, Kaysersteinbruch seu Lapidicinam Cæsaream, Weidling, Döbling, Heiligenstadt, & Murobacium.

2. *POLYGALLA* floribus imberbibus sparsis: carina apice subrotundo, caule fruticoso, foliis lanceolatis. *Linn. Sp. pl. 704.*

Polygaloides. Dill. nov. gen. p. 152. t. 9.

Astragalus humilis buxifolius. Herm. lugdb. 74.

Anonymos flore coluteæ. Clus. hist. 1. p. 105.

Chamæbuxus flore coluteæ. Baub. pin. 471.

Habitat in alpe Breinina, & in Schneeberg.

DECANDRIA.

SPARTIVM.

1. *SPARTIVM* ramis oppositis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis. *Hort. Ups. 28.*

Spartium arboreescens, seminibus lenti similibus. Baub. pin. 396.

Genista hispanica. Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 266.

Genista juncea. *Baub. hist.* 1. p. 395.

Hospitatur passim in hortis tam sub dio, quam hyeme in frigidariis.

GENISTA.

GENISTA foliis lanceolatis, ramis striatis teretibus erectis. *Fl. Suec.* 587.

Genista tinctoria Germanica. *Baub. pin.* 395. *Tournef. inst.* 643.

Genista tinctoria vulgaris. *Clus. hist.* 1. p. 101.

Genista tinctoria. *Dodon. pempt.* 763.

Genistella Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 266.

Tinctorius flos. *Baub. hist.* 1. p. 390.

Habitat passim in sylvis, & ad pratorum montanorum margines, præsertim circa Leytæpontum, & Dornbach.

GENISTA foliis lanceolatis obtusis, caule tuberculato decumbente. *Fl. Suec.* 588.

Genista ramosa, foliis hyperici. *Baub. pin.* 395. *Tournef. inst.* 643.

Chamægenista prima. *Clus. hist.* 1. p. 103.

Habitat passim in pascuis montanis, præsertim inter Salmersdorff, & Weidling, ac in sylvarum agrorumque marginibus; & in collibus circa Leytæpontum ubique.

GENISTA spinis compositis ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. *Linn. Sp. pl.* 710.

Genista spinosa minor germanica. *Baub. pin.* 395.

Genistella spinosa Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 266.

Habitat in sylvis illarumque marginibus circa Salmersdorff, & Weidling.

GENISTA spinis decompositis, ramis floriferis inermibus foliis linearibus pilosis. *Linn. Sp. pl.* 711.

Genista spinosa minor hispanica villosissima. *Baub. pin.* 395.

Genistella monspeliaca spinosa. *Baub. prodr.* 157.

Genistella montis ventosi, spinosa. *Baub. hist.* 1. p. 400.

Genista - Spartium; Montis Ventosi. *Tournef. inst.* 645.

Boerhaav. Lugdb. 2. p. 24.

Habitat cum præcedente, ast longe varius.

GALEGA.

GALEGA. *Hort. Ups.* 208.

Galega vulgaris. *Bauh. pin.* 352. *Moris. hist.* 2. p. 91. s. 2.
t. 7. f. 9. *Clus. hist.* 2. p. 233.

Habitat circa Burckersdorff & Murobacium, nec non in
agrorum marginibus inter frutices ad pratum Döblingense in-
ter paludem & agros sitis.

O N O N I S.

1. *ONONIS* floribus geminatis, foliis ternatis, ramis spinosis. *Linn. Sp. pl.* 716.

Ononis floribus subsessilibus solitariis lateralibus, caule spinoso. *Fl. Suec.* 623.

Anonis spinosa flore purpureo. *Bauh. pin.* 389.

Anonis. *Fuchs. hist.* 60. *Riv. irr. tetr.* *Hall. Jen. Rupp.* 265.

Anonis s. *Resta bovis vulgaris*, purpurea. *Bauh. hist.* 2.
p. 395.

Anonis, *Ononis*, *Resta bovis.* *Tabern. icon.* 528.

Habitat in pascuis, pratis, & juxta vias passim præsertim ubique
circa Leytæpontum.

A N T H Y L L I S.

1. *ANTHYLLIS* herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. *Linn. Sp. pl.* 719.

Anthyllis foliis pinnatis, foliolis pluribus: terminali
majore. *Fl. Suec.* 594.

Anthyllis Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 257.

Anthyllis lenti similis. *Dodon. pempt.* 552.

Anthyllis leguminosa loto affinis, vulneraria pratensis
Moris. hist. 2. p. 182.

Vulneraria rustica. *Bauh. hist.* 2. p. 362. *Boerhaav. Lugdb.*
2. p. 48.

Loto affinis *vulneraria pratensis.* *Bauh. pin.* 332.

Lagopodium flore luteo. *Tabern. icon.* 925.

Habitat passim in pratis, & locis gramineis, præsertim circa
Leytæpontum, ad viam regiam Minckendorffensem, in
valle Brühl retro Mödling, in valle Döblingensi, in monte
Schneeberg, & in pomariis Viennæ.

2. *ANTHYLLIS* fruticosa, foliis pinnatis æqualibus, floribus
capitis. *Linn. Sp. pl.* 720.

Anthyllis fruticosa, foliis pinnatis: foliolis æqualibus
Hort. Ups. 221.

Barba Jovis. *Baub. pin. 391.*

Barba Jovis pulchre lucens. *Baub. hist. 1. p. 385.*

Hospitatur in hortis Viennæ, præsertim in horto S. P. de Lichtenstein, in suburbio Viennensi Lichtenthal dicto sito, æstate in apricario, hyeme in frigidario.

ANTHYLLIS fruticosa, foliis ternatis inæqualibus, calycibus lanatis lateralibus, *Linn. Sp. pl. 720.*

Anthyllis fruticosa, foliis ternatis: intermedio productiore. *Hort. Ups. 221.*

Cytisus foliis ovatis acutis nitidis, floribus lateralibus. *Roy. Lugdb. 370.*

Cytisus incanus, folio medio longiore. *Baub. pin. 390.*

Cytisus VI. *Clus. hist. 1. p. 96.*

Barba Jovis hispanica incana flore luteo. *Tournef. inst. 651.*

Hospitatur cum antecedente.

L V P I N V S.

LVPINVS calycibus alternis inappendiculatis: labio superiore integro, inferiore tridentato. *Linn. Sp. pl. 721.*

Lupinus calycibus alternis absque appendiculis. *Hort. Ups. 209.*

Lupinus caule composito. *Hort. Cliff. 359.*

Lupinus sativus, flore albo. *Clus. hist. 2. p. 228. Baub. pin. 347.*

Lupinus flore albo Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 263.*

Lupinus vulgaris semine, & flore albo sativus. *Baub. hist. 2. p. 288.*

Hospitatur passim in hortis sub dio.

LVPINVS calycibus semiverticillatis appendiculatis: labio superiore bifido, inferiore subtridentato. *Hort. Ups. 209.*

Lupinus sylvestris flore cæruleo. *Baub. pin. 348.*

Lupinus sylvestris, flore purpureo, semine rotundo vario. *Baub. hist. 2. p. 291.*

Lupinus flore cæruleo Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 263.*

Hospitatur cum præcedente.

R O B I N I A.

ROBINIA pedunculis racemosis, foliis impari-pinnatis. *Linn. Sp. pl. 722.*

Robinia pedunculis racemosis, foliis pinnatis. Hort. Ups. 212.

Robinia aculeis geminatis. Gron. Virg. 82.

Acacia americana filiquis glabris. Raj. hist. 1719.

Acaciæ affinis Virginiana spinosa, filiqua membranacea plana, floribus albis papilionaceis anagryridis modo in uvam propendentibus. Pluck. alm. 6. t. 73. f. 4.

Pseudo-Acacia filiquis glabris. Boerhaav. Lugdb. 2. p. 39.

Pseudo-Acacia vulgaris Rivini, & Tournefort. inst. 649. Hall. Jen. Rupp. 257.

Hospitatur seu Habitat ubique in hortis & areis.

COLUTEA.

1. *COLUTEA arborea, foliolis obcordatis. Linn. Sp. pl. 723.*

Colutea Rivini. Hall. Jen. Rupp. 265.

Colutea vesicaria. Baub. pin. 396. Baub. hist. 1. p. 380.

Tournef. inst. 418. Boerhaav. lugdb. 2. p. 39.

Colutea. Dodon. pempt. 784.

Habitat in monte Cecio seu Kalenberg, & in monticulo horti Comitis de Kueffstein Viennæ.

2. *COLUTEA fruticosa, foliolis ovato-oblongis. Linn. Sp. pl. 723.*

Colutea foliolis ovato-lanceolatis, caule fruticoso. Hort. Ups. 228.

Colutea æthiopica phœniceo flore, Barbæ Jovis folio.

Breyn. cent. 70. Prodr. 30. Boerhaav. lugdb. 2. p. 39.

Colutea Æthiopica Rivini. Hall. Jen. Rupp. 265.

Hospitatur hinc inde in hortis, præsertim Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach, æstate in apricario, hyeme in frigidario.

PHASEOLUS.

1. *PHASEOLUS caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce majoribus, leguminibus pendulis. Linn. Sp. pl. 723.*

Phaseolus radice annua, caule volubili, leguminibus pendulis compressis torosis. Hort. Ups. 213.

Phaseolus vulgaris. Lob. icon. 59.

Phaseolus Rivini. Hall. Jen. Rupp. 263.

Smilax hortensis s. Phaseolus major. Baub. pin. 339.

Hospitatur passim in hortis oleracæis sub dio.

2. PHA-

2. PHASEOLVS caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce brevioribus, leguminibus pendulis.
Linn. Sp. pl. 724.

Phaseolus puniceo flore. *Cornut. Canad. 184. Hall. Jen. Rupp. 263.*

Phaseolus indicus flore coccineo s. puniceo. *Moris. hist. 2. p. 69.*

Hospitatur passim sub dio in hortis, & ante fenestras.

P I S V M.

1. PISVM stipulis inferne rotundatis crenatis, petiolis teretibus, pedunculis multifloris. *Linn. Sp. pl. 727.*

Pisum stipulis deorsum gibbis crenatis, petiolis teretibus, caule tereti, pedunculis multifloris. *Hort. Ups. 215.*

Pisum Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 259.*

Pisum arvense. *Baub. pin. 342.*

β. Pisum majus quadratum. *Baub. pin. 344.*

Hospitatur passim in agris β. ubique in hortis oleraceis.

O R O B V S.

1. OROBVS foliis conjugatis subsessilibus lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis, radice fasciculata.

Orobus Pannonicus 3. *Clus. hist. 2. p. 231.*

Orobus sylvaticus angustifolius Parckinson. *Volckam. Fl. Norimb. 315.*

Habitat in pratis circa Waltersdorff, Mödling, Minckendorff, Salmersdorff, Baden, & Murobacium.

2. OROBVS foliis pinnatis ovatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici. *Linn. Sp. pl. 728.*

Orobus caule simplicissimo, foliolis pluribus ovatis acutis. *Fl. Suec. 595.*

Orobus sylvaticus purpureus vernus. *Baub. pin. 351. Thal. berc. 8. t. 6.*

Orobus Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 285.*

Habitat passim in sylvis, praesertim circa Dornbach.

OROBVS foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici. *Linn. Sp. pl. 729*

Orobus caule simplicissimo, foliolis pluribus lanceolatis integris. *Fl. Suec. 596.*

Orobus sylvaticus, foliis oblongis glabris. *Tournef. inst.*
393. *Hall. Jen. Rupp.* 258.

Orobus radice tuberosa. *Rivini irr. tetr.*

Astragalus sylvaticus foliis oblongis glabris. *Bauh. pin.*
351.

Astragalus sylvaticus. *Thal. herc.* 7. t. 1.

Lathyrus angustifolius radice tuberosa. *Loes. pruss.* 138.

Habitat supra Corneoburgum in sylva ad viam quæ Nider-
Hollebrunn ducit sita.

4. *OROBUS* caule ramoso, foliis sexjugis ovato-oblongis.
Linn. Sp. pl. 729.

Orobus caule ramoso. *Fl. Suec.* 597.

Orobus sylvaticus viciæ foliis. *Bauh. pin.* 352.

Orobus foliis viciæ. *Riv. tetrapet. irr.*

Orobus pannonicus 2. *Clus. hist.* 2. p. 230.

Habitat in monticulo regio Fischamentam inter & Enzers-
dorff sito, & in sylvis cæduis circa Latifontum.

LATHYRVS.

1. *LATHYRVS* pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliis
ovato-oblongis, leguminibus hirsutis. *Hort. Ups.*
216.

Lathyrus ficulus. *Hall. Jen. Rupp.* 260.

Lathyrus distoplatyphyllos hirsutus mollis, magno, &
peramceno flore odorato. *Comm. hort.* 2. p. 219. t. 80.

Hospitatur passim in hortis sub dio.

2. *LATHYRVS* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: fo-
liolis ovalibus, internodiis nudis. *Linn. Sp. pl.* 732.

Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, fo-
liolis ovalibus, radice tuberosa. *Hort. Ups.* 216.

Lathyrus arvensis *Rivini*. *Hall. Jen. Rupp.* 260.

Lathyrus arvensis repens tuberosus. *Bauh. pin.* 344.

Apios. *Fuchs. hist.* 131.

Chamæbalanus leguminosa. *Bauh. hist.* 2. p. 514.

Terræ glandes *Dodon. pempt.* 550.

Habitat passim in agris circa Viennam, & Leytæpontum.

3. *LATHYRVS* pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, fo-
liis lanceolatis; cirrhis simplicissimis. *Linn. Sp. pl.*
733.

Lathyrus pratensis *Rivini*. *Hall. Jen. Rupp.* 260.

Lathyrus foliis binatis acutis, capreolo non ramoso. *Hall.*
helv. 597.

Lathyrus sylvestris luteus foliis viciæ. Bauh. pin. 344.

Lathyrus luteus sylvestris dumetorum. Bauh. hist. 2. p. 304. t. 304.

Habitat in prato Murobacensi, inter Salmersdorff & Weidling, in Tabor alibique.

LATHYRVS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis ensiformibus. Fl. Suec. 598.

Lathyrus sylvestris major. Bauh. pin. 344. Hall. Jen. Rupp. 259.

Lathyrus sylvestris. Clus. hist. 2. p. 229. Dodon. pempt. 523.

Lathyrus majoris species, flore rubente, & albido minori, dumetorum sive germanica. Bauh. hist. 2. p. 302.

Habitat in dumetis, & pratis montosis, præsertim in dumetis Dornbacensibus.

LATHYRVS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis: internodiis membranaceis. Linn. Sp. pl. 733.

Lathyrus sylvaticus Rivini. Hall. Jen. Rupp. 259.

Lathyrus latifolius. Bauh. pin. 344.

Lathyrus major latifolius, flore purpureo, speciosior. Bauh. hist. 2. p. 303.

Lathyrus latiori folio. Lob. icon. 68.

Habitat supra Grinzing in montis hujus parte quæ montem Cesium seu Kalenberg respicit, alibique ad sylvarum margines, & sepes.

V I C I A.

VICIA pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis: foliolis ovatis. Linn. Sp. pl. 734.

Pisum sylvestre perenne. Bauh. pin. 343.

Pisum sylvestre. Clus. hist. 2. p. 229.

Cracca flore ochroleuco Rivini. Hall. Jen. Rupp. 262.

Habitat in nemoribus Danubialibus Posonium inter & Hamburgum, in monte Leytaberg dicto: supra Grinzing, alibique in sylvis.

VICIA pedunculis multifloris, foliolis reflexis ovatis mucronatis, stipulis subdentatis. Linn. Sp. pl. 734.

Vicia pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis cirrhosis: foliolis alternis ovatis, stipulatis dentatis. Fl. Suec. 604.

Vicia maxima dumetorum. Baub. pin. 345.

Vicia sylvatica maxima piso similis. Baub. hist. 2. p. 315.
Raj. hist. 900.

Cracca sylvatica Rivini. Hall. Jen. Rupp. 262. Volckam.
Fl. Norimb. 126.

Habitat in dumetis præsertim in sylva Dornbacensi, Grinzingensique, & ad vineas Softenses, Badenses, ac in montibus Medlingensibus.

3. *Vicia pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris. Linn. Sp. pl. 735.*

Vicia pedunculis multifloris, stipulis utrinque acutis integris. Fl. Suec. 605.

Vicia multiflora, Baub. pin. 342.

Cracca Rivini. Hall. Jen. Rupp. 262.

Habitat ubique in pratis circa Leytæpontum, Latifontum, Murobacium, Döblingam, & Dornbacium.

4. *Vicia leguminibus sessilibus subbinatis erectis, foliis retusis, stipulis notatis. Linn. Sp. pl. 736.*

Vicia leguminibus erectis, petiolis polyphyllis: foliolis acumine emarginatis, stipulis denticulatis. Hort. Ups. 218. Fl. Suec. 601.

Vicia vulgaris sativa semine nigro. Baub. pin. 344.

Vicia vulgaris sativa. Baub. hist. 2. p. 310.

Vicia Rivini. Hall. Jen. Rupp. 261.

Habitat passim in agris.

5. *Vicia leguminibus reflexis pilosis solitariis pentaspermis, corollæ vexillis glabris. Linn. Sp. pl. 736.*

Vicia sylvestris lutea, siliqua hirsuta. Baub. pin. 345.
Dill. Giff. 107.

Vicia luteo flore sylvestris. Baub. hist. 2. p. 313.

Habitat ad Sylvulam Simmeringensem, varius.

6. *Vicia leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decrescen-
 tibus. Linn. Sp. pl. 737.*

Vicia leguminibus adscendentibus, petiolis polyphyllis, foliolis ovatis acutis integerrimis. Fl. Suec. 602.

Vicia sepium, folio rotundiore acuto. Baub. pin. 345.

Vicia sepium perennis. Baub. hist. 2. p. 313.

Vicia sepium Rivini. Hall. Jen. Rupp. 261.

Habitat in sylvis inter frutices, in dumetis, & pomariis passim præsertim circa Grinzing, Nussdorff, & Leytæpontum.

- . VICIA caule erecto, petiolis absque cirrhis. *Linn. Sp. pl.*
 737. *Hort. Ups.* 218.
 Faba. *Baub. pin.* 338.
 Bona s. Phaseolus. *Dodon. pempt.* 513.
 β. Faba minor s. equina. *Baub. pin.* 338.
 Hospitatur hinc inde sub dio in agris.

C I C E R.

- . CICER. foliis ferratis. *Hort. Ups.* 224.
 Cicer sativum. *Baub. pin.* 347.
 Cicer arietinum. *Dodon. pempt.* 525.
 Hospitatur in hortis oleraceis sub dio.

E R V V M.

- . ERVVM feminibus compressis convexis. *Linn. Sp. pl.* 738.
 Cicer pedunculis bifloris, foliolis integerrimis, stipu-
 lis indivisis. *Mat. med.* 360.
 Lens vulgaris. *Baub. pin.* 346.
 Lens. *Dodon. pempt.* 526.
 Hospitatur in agris sub dio.
 . ERVVM pedunculis subbifloris, feminibus globosis quater-
 ternis. *Fl. Suec.* 606.
 Vicia segetum, singularibus filiquis glabris. *Baub. pin.*
 345.
 Vicia minor segetum, cum filiquis paucis glabris. *Mo-*
ris. bist. 2. p. 64. s. 2. t. 4. f. 16.
 Viciæ s. Craccæ minimæ species, cum filiquis glabris.
Baub. bist. 2. p. 315.
 Cracca minor filiquis gemellis. *Rivini. Hall. Jen. Rupp.*
 262.
 Habitat hinc inde in arvis, & agris.
 . ERVVM pedunculis multifloris, feminibus globosis binis.
Linn. Sp. pl. 783.
 Cicer pedunculis multifloris, feminibus globosis. *Fl.*
Suec. 607.
 Vicia segetum cum filiquis plurimis hirsutis. *Baub. pin.*
 345.
 Vicia parva sive Cracca minor cum multis filiquis hir-
 sutis. *Baub. bist.* 2. p. 315.
 Cracca minor *Rivini. Hall. Jen. Rupp.* 262.

Cracca minor. *Tabern. icon.* 507.

Craccæ alterum genus. *Dodon. pempt.* 542.

Habitat passim in agris circa Viennam, & Fischamentam.

CYTISVS.

1. **CYTISVS** racemis simplicibus pendulis, foliolis ovato-oblongis. *Hort. Ups.* 210.

Anagryis non fœtida major alpina. *Baub. pin.* 391.

Anagryis non fœtens minor. *Baub. pin.* 391.

Laburnum Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 257.

Laburnum arbor trifolia anagryidi similis. *Baub. hist.* 2. p. 361.

Habitat copiose frutex & arbor ad vineas, & in montibus sylvosis circa Latifontum, & Mannersdorff.

Hospitatur vero sub dio in horto olim Favoritæ Videntis Viennæ, & in hortulo botanico apud FF. Misericordiæ in suburbio Viennensi Leopoldino per Fratrem Honorium culto.

2. **CYTISVS** racemis simplicibus erectis, foliolis ovato-oblongis. *Linn. Sp. pl.* 739.

Cytisus glaber nigricans. *Baub. pin.* 390.

Cytisus IV. *Clus. hist.* 1. p. 95.

Habitat ubique fere in sylvis, illarumque marginibus.

3. **CYTISVS** pedunculis simplicibus lateralibus, calycibus hirsutis trifidis obtusis ventricoso-oblongis. *Hort. Ups.* 211.

Cytisus incanus siliqua longiore. *Baub. pin.* 390.

Cytisus 3. *Clus. hist.* 1. p. 94.

Habitat inter Döbling, & Heiligenstadt, ac circa Dornbach varius.

4. **CYTISVS** floribus capitatis, ramis decumbentibus. *Linn. Sp. pl.* 740.

Cytisus supinus foliis infra, & siliquis molli lanugine pubescentibus. *Baub. pin.* 390.

Cytisus VII. species altera. *Clus. hist.* 1. p. 96.

β. Cytisus incanus, folio oblongo, austriacus. *Baub. pin.* 390.

Cytisus V. *Clus. hist.* 1. p. 95.

Habitat α. in sylvis & dumetis, præsertim inter frutices ad viam Dornbacensem, β. ibidem & secus vias, præsertim in monte Leopoldsberg, dicto monti Cecio, seu Kalenberg vicino, nec non in Schneeberg, & alibi.

GLYCYRRHIZA.

- GLYCYRRHIZA leguminibus glabris. *Linn. Mat. med.* 362.
 Glycyrrhiza filiquosa, & germanica. *Baub. pin.* 352.
 Glycyrrhiza vulgaris. *Dodon. pempt.* 341.
 Hospitatur sub dio in horto FF. Misericordiæ in suburbio Leopoldino Viennæ.

CORONILLA.

- CORONILLA fruticosa, corollarum unguibus calyce duplo longioribus. *Fl. Suec.* 590.
 Coronilla major Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 268.
 Emerus. *Cesalp. Syst.* 117. *Tournef. inst.* 650.
 Colutea filiquosa f. Scorpioides major. *Baub. pin.* 397.
 Colutea Scorpioides. *Cam. epit.* 541.
 Colutea Scorpioides l. elatior. *Clus. hist.* 1. p. 97.
 β. Coronilla montana Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 267.
 Colutea filiquosa minor. *Baub. pin.* 397.
 Colutea Scorpioides l. humilior. *Clus. hist.* 1. p. 97.
 Emerus minor. *Tournef. inst.* 650.
 Habitat α. in monte supra Nussdorf, in monte Schneeberg, & in monte Leopoldsberg dicto monti Cecio seu Kalenberg vicino. β. in valle Döblingensi, circa Grinzing, in monte Cecio, alibique passim in montanis præsertim circa Leytæpontum.
 Observ. Foliola β. ovato-lanceolata sunt, α. antice emarginata, quod optime Figuris expresserunt Clusius, & Rivinus, an ergo β. varietas prioris, an distincta species?
 • CORONILLA herbacea, leguminibus erectis teretibus torosis numerosis, foliis glabris. *Linn. Sp. pl.* 743.
 Coronilla leguminibus teretibus torosis, foliis glabris, caule herbaceo. *Hort. Ups.* 235.
 Coronilla herbacea flore vario. *Tournef. inst.* 650.
 Coronilla flore vario Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 267.
 Securidaca dumetorum major, flore vario, filiquis articulatis. *Baub. pin.* 342.
 Securidaca 2. prior species. *Clus. hist.* 2. p. 237.
 Melilotus quinta tragi. *Baub. hist.* 2. p. 342.
 Habitat ubique fere in pratis, agris, pomariis, & dumetis, ac prope vias, imo passim in vallo suburbico, mœniisque Viennæ.

O R N I T H O P V S.

1. ORNITHOPVS foliis pinnatis, leguminibus subarcuatis.
Linn. Sp. pl. 743.

Ornithopodium radice tuberculis nodosa. *Baub. pin. 250.*

Habitat supra Nusdorff in arenosis varius.

H E D Y S A R V M.

1. HEDYSARVM foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis nudis rectis, caule diffuso. *Hort. Ups. 231.*

Hedysarum clypeatum, flore suaviter rubente. *Tournef. inst. 401.*

Hedysarum Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 266.*

Onobrychis altera. *Dodon. pempt. 549.*

Astragalus romanus, sive Hedysarum clypeatum, filiqua aspera. *Baub. hist. 2. p. 333.*

Hospitatur passim in hortis sub dio.

A S T R A G A L V S.

1. ASTRAGALVS caulescens prostratus, leguminibus subglobosis inflatis mucronatis pilosis. *Linn. Sp. pl. 757.*

Astragalus caulescens procumbens, leguminibus scrotiformibus inflatis mucronatis pilosis. *Hort. Ups. 226.*

Astragalus luteus perennis, filiqua gemella rotunda vesicam referente. *Moris. hist. 2. p. 108. s. 2. t. 9. f. 2.*

Glaux Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 270.*

Cicer sylvestre, foliis oblongis hispidis, majus. *Baub. pin. 347.*

Cicer sylvestre. *Cam. epit. 205.*

Habitat passim circa Viennam in agrorum marginibus, & locis gramineis, in vallo suburbico Viennensi inter hortum olim S. P. Eugenii, & Nosocomium & St. Marcum sito, in Tabor, & in prato supra suburbium Viennense Leopoldinum ad Danubium sito.

2. ASTRAGALVS caulescens prostratus, leguminibus subtriquetris arcuatis, foliis ovalibus pedunculo longioribus. *Linn. Sp. pl. 758.*

Astragalus leguminibus lunatis biventricosis, caulibus procumbentibus. *Fl. Suec. 591.*

Astragalus caule ex alis spicato ramoso procumbente, foliis ovalibus. *Hall. helv. 564.*

Astra-

Astragalus luteus, perennis, procumbens vulgaris f. sylvestris. *Moris. hist. 2. p. 107. s. 2. t. 9. f. 8. Hall. Jen. Rupp. 269.*

Astragalus. Rivin. irr. tetr.

Glycyrrhiza sylvestris, floribus luteo-pallescentibus. *Bauh. pin. 352.*

Glaux vulgaris, *Glycyrrhiza sylvestris* Gesneri. *Clus. hist. 2. p. 233.*

Habitat in sylvis circa Murobacium, Dornbach, Grinzing, Burckersdorff, & Latifontum.

ASTRAGALVS caulescens diffusus, pedunculis spicatis, vexillis flore duplo longioribus. *Linn. Sp. pl. 760.*

Onobrychis spicata flore purpureo. *Bauh. pin. 350.*

Onobrychis I. Clus. hist. 2. p. 238.

Astragalus purpureus, perennis, spicatus, Pannonicus. *Moris. hist. 2. p. 106. Tournef. inst. 415.*

Habitat passim in agrorum marginibus, locisque gramineis juxta vias circa Leytæpontum, trans Waringergassen Viennæ, & in vallo illo tempore assedii Viennensis a turcis facto, alibique.

TRIFOLIUM.

TRIFOLIUM spicis oblongis, leguminibus seminudis mucronatis, caule erecto. *Linn. Sp. pl. 764.*

Lotus hortensis odorata. Bauh. pin. 330.

Lotus sylvestris. Cam. epit. 724.

Habitat in horto oleraceo arcis Leytæpontanæ inter Buxum. forsân olim cultum.

Hospitatur vero passim in hortis sub dio.

TRIFOLIUM leguminibus racemosis nudis dispermis, caule erecto. *Linn. Sp. pl. 765.*

Trifolium odoratum f. *Melilorus. Dodon. pempt. 567.*

Melilotus officinarum Germaniæ. Bauh. pin. 331.

Habitat passim ad vias publicas in agrorum marginibus, in cultis, mœniisque & vallo suburbico Viennensi, ubique autem inter hordeum & avenam circa Leytæpontum.

TRIFOLIUM capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule repente. *Linn. Sp. pl. 767.*

Trifolium capitulis subrotundis, flosculis pedunculatis, leguminibus tetraspermis, caule procumbente. Fl. Suec. 612.

Tri-

Trifolium pratense album. *Bauh. pin.* 327.

Trifolium repens Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 255.

Habitat in pratis, & pascuis ubique.

4. *Trifolium spicis villosis longis, corollis monopetalis, caule erecto, foliis ferrulatis.* *Linn. Sp. pl.* 768.

Trifolium montanum, spica longissima rubente. *Bauh. pin.* 328. *Hall. Jen. Rupp.* 255.

Trifolium purpureum majus, folio & spica longiore. *Bauh. hist.* 2. p. 375.

Lagopus major alter. *Dodon. pempt.* 578.

Trifolii majoris III. altera species. *Clus. hist.* 2. p. 246.

Habitat in sylvis inter Salmersdorff & Weidling, in prato Mu-robacensi ad dextram & principium sylvæ, præsertim autem in monticulo regio Fischamentam inter & Enzersdorff sito.

5. *TRIFOLIUM spicis subvillosis cinctis stipulis oppositis membranaceis, corollis monopetalis.* *Linn. Sp. pl.* 768.

Trifolium spicis villosis, caule diffuso, foliolis integerrimis. *Fl. Suec.* 615.

Trifolium pratense, flore monopetalo. *Tournef. inst.* 404.

Trifolium pratense purpureum. *Bauh. pin.* 327.

Trifolium pratense. *Cam. epit.* 582. *Dodon. pempt.* 565.

Trifolium Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 254.

Habitat ubique in pratis, locisque gramineis pomariorum.

6. *TRIFOLIUM spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis setaceis æqualibus.* *Fl. Suec.* 616.

Trifolium arvense humile spicatum, seu lagopus. *Bauh. pin.* 328.

Lagopus. *Fuchs. hist.* 494. *Cam. epit.* 724. *Dodon. pempt.* 577. *Hall. Jen. Rupp.* 255.

Habitat in arvis, & pascuis sterilioribus præsertim in arvis Azkersdorffensibus, & in vallo illo Turcico tempore assediæ Viennensis factæ supra Lapidicinam Weinhausensem.

7. *TRIFOLIUM capitulis terminalibus, corollarum vexillis subulatis, caule erecto, foliolis lanceolatis ferratis.* *Fl. Suec.* 611.

Trifolium montanum album. *Bauh. pin.* 328.

Trifolium pratense album. *Fuchs. hist.* 818. *Bauh. hist.* 2. p. 379.

Trifolium majus I. *Clus. hist.* 2. p. 245.

Trifolium folio longiore, flore albo Rivini. Hall. Jen. Rupp. 254.

Habitat in pratis montanis siccioribus, præsertim circa Grinzing, Dornbach, Petersdorff, & Leytæpontum.

TRIFOLIUM capitulis subrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulibus repentibus. *Linn. Sp. pl. 772.*

Trifolium fragiferum friscum. Baub. pin. 329.

Trifolium fragiferum. Vaill. paris. 195. t. 22. f. 2.

Habitat circa Dornbach & Weidling, circa Leytæpontum præsertim ad pedem montis ad dextram viæ Julaschium (vulgo Jois) inter & pagum Vinden siti, minus frequens.

TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Fl. Suec. 617.*

Trifolium pratense luteum, capitulo lupuli seu agrarium. Baub. pin. 328. Vaill. paris. 196. t. 22. f. 3.

Trifolium pratense luteum fœmina flore puchriore sive Lupulino. Baub. hist. 2. p. 381.

Trifolium agrarium. Dodon. pempt. 576.

Lupulinum Rivini, Hall. Jen. Rupp. 256.

Habitat in pratis siccioribus hinc inde.

TRIFOLIUM spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus pilosis, caule erecto. *Linn. Sp. pl. 772.*

Trifolium montanum lupulinum. Baub. pin. 328. prodr. 140.

Trifolium pratense flore rufescente. Vaill. paris. 196.

Lupulinum montanum capitulis spadiceis. Hall. Jen. Rupp. 256.

Habitat in prato Murobacensi, & supra Salmersdorff, paulo ante Weidling.

LOTUS.

LOTUS leguminibus solitariis membranaceo-quadrangulatis bracteis ovatis. *Hort. Ups. 220.*

Lotus leguminibus subsolitariis: angulis quatuor membranaceis. *Hort. Cliff. 372.*

Lotus ruber filiqua angulosa. Baub. pin. 332.

Lotus pulcherrima tetragonolobus. Cam. hort. 91. t. 26.

Lo-

Lotus tetragonolobus flore rubeo Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 267.

Lotus siliquosus rubello flore. *Clus. hist.* 2. p. 244.

Hospitatur passim sub dio in hortis magnatum Viennæ præsertim in horto S. P. de Schwarzerburg.

2. *Lotus* capitulis depressis, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis. *Linn. Sp. pl.* 775.

Lotus caule herbaceo, florum capitulo depresso, leguminibus decumbentibus teretibus. *Fl. Suec.* 609.

Lotus seu *Melilotus* pentaphyllos minor glabra. *Baub. pin.* 332.

Trifolium corniculatum. *Dodon. pempt.* 573.

β. *Lotus* pentaphyllos flore majore luteo splendente. *Baub. pin.* 222. *Hall. Jen. Rupp.* 267.

Habitat in locis gramineis, Brader, Tabor, montibus Medlingensibus, & in vallo suburbico Viennensi inter hortum olim S. P. Eugenii & Nosocomium ad St. Marcum situm. β. in Tabor, ad viam regiam Minckendorffensem, ultra Hochau, in fruticeto sito inter viam regiam & Petersdorff, inter Heiligenstadt & Döbling, alibique.

3. *Lotus* capitulis aphyllis, foliis sessilibus quinatis. *Linn. Sp. pl.* 776.

Dorycnium foliis digitatis sessilibus. *Hort. Cliff.* 371.

Dorycnium monspeliensium. *Lob. icon.* 51.

Trifolium album angustifolium, floribus in capitulum congestis. *Baub. pin.* 329.

Habitat passim in montanis, circa Dornbach, Burckersdorff, Murobadium, & Schneeberg, alibique.

M E D I C A G O.

I. *MEDICAGO* pedunculis racemosis, leguminibus contortis caule erecto glabro. *Linn. Sp. pl.* 778.

Medica legitima. *Clus. hist.* 2. p. 242.

Medica sativa. *Moris. hist.* 2. p. 150. s. 2. t. 16. f. 2.

Falcata sativa flore cæruleo. *Hall. Jen. Rupp.* 264.

Fœnum burgundicum. *Lob. icon.* 2. p. 36.

Habitat in hortis Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach Leytæponti, & in horto Excellentissimi Comitis de Althan in via regia Viennæ, olim culta nunc sponte sua propagata.

Hospitatur sub dio in horto oleraceo, & in campis Leytæpontanis dicti Excellentissimi Comitis de Harrach.

MEDICAGO pedunculis racemosis, leguminibus lunatis, caule prostrato. *Fl. Suec.* 620.

Medica sylvestris floribus croceis. *Baub. hist.* 2. p. 383. *Tournef. inst.* 410.

Medica flavo flore. *Cord. hist.* 2. p. 243.

Falcata Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 264.

Trifolium sylvestre luteum siliqua cornuta, vel Medica frutescens. *Baub. pin.* 330.

Habitat ubique fere in agrorum marginibus, pratis, & rudertis.

MEDICAGO spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caule procumbente. *Fl. Suec.* 621.

Trifolium leguminibus spicatis reniformibus nudis monospermis, caule procumbente. *Hort. Cliff.* 375.

Trifolium pratense luteum capitulo brevior. *Baub. pin.* 328.

Trifolium pratense luteum. *Fuchs. hist.* 819.

Melilotus capsulis reni similibus in capitulum congestis. *Tournef. inst.* 417.

Melilotus minima Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 256.

Habitat passim in rudertis, pratisque siccioribus arenosis, & in campis, praesertim in Tabor, circa Döbling, & Leytæpontum, ac in vallo suburbico Viennensi.

MEDICAGO leguminibus cochleatis, stipulis dentatis, caule diffuso. *Hort. Ups.* 230.

α. Medica orbiculata. *Baub. hist.* 2. p. 381.

β. Medica leguminibus cochleatis aculeis uncinatis alternis externe donatis, stipulis integris. *Guett. Stamp.* 249.

Medica echinata minima. *Baub. hist.* 2. p. 386.

Trifolium echinatum, fructu minore. *Baub. pin.* 330.

Cochleata echinata minima Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 264.

Habitat β. in asperis tenui gramine vestitis ad viam non procul à pago Grinzing dicto, ac ultra Alsterbach, & Waringergassen Viennæ.

Hospitatur α. sub dio in hortulo botanico Fr. Honorii apud FFr. Misericordiæ Viennæ, & in hortulis PP. Carthusianorum Murobaci, alibi.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA

ICOSANDRIA.

CITRVS.

1. CITRVS petiolis linearibus. *Ups. Hort. 236.*
Malus medica. Baub. pin. 435.

β. Limon vulgaris. Ferr. hesp. 193.

Malus Limonia acida. Baub. pin. 436.

Hospitatur ubique in hortis magnatum, præsertim Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach, æstate in apricariis, hyeme in frigidariis.

2. CITRVS petiolis alatis. *Hort. Ups. 236.*

Malus aurantia major. Baub. pin. 346.

Aurantia mala. Cam. epit. 150.

Hospitatur cum antecedente præsertim Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis de Harrach, ubi ob peculiarem Domini Mohr hortulani scientiam, & diligentiam numerosæ ambarum specierum varietates, & Hybridæ Species occurrunt.

POLYANDRIA.

HYPERICVM.

1. HYPERICVM floribus trigynis caule quadrato herbaceo.
Fl. Suec. 624.

Hypericum Ascyron dictum, caule quadrangulo. Baub. hist. 3. p. 382.

Ascyron. Dodon. pempt. 78.

Habitat circa Grinzing, alibique ad rivulos in sylvis & pratis.

2. HYPERICVM floribus trigynis, caule ancipiti, foliolis obtusis, pellucido-punctatis. *Fl. Suec. 625.*

Hypericum vulgare. Baub. pin. 279.

Hypericon. Dodon. pempt. 76.

Habitat in collibus, sepibus, dumetis, pratis, sylvarumque marginibus passim circa Viennam, Döbling, Grinzing, Nussdorff, Dornbach, Murobacium, & Leytæpontum.

3. Hy.

- HYPERICUM** floribus trigynis: calycibus ferrato-glandulosis, caule erecto, foliis ovatis. *Linn. Sp. pl.* 786.
Hypericum floribus trigynis, calycum ferraturis capitatis caule tereti. *Fl. Suec.* 626. & quidem β .
Hypericum elegantissimum non ramosum, folio lato. *Bauh. hist.* 3. p. 383. *Hall. Jen. Rupp.* 124.
Androsæmum campoclarense. *Col. ecphr.* 1. p. 73. t. 74.
Ascyrum sive **Hypericum** bifolium glabrum non perforatum. *Bauh. pin.* 280.
Ascyrum. *Fuchs. hist.* 74.
Habitat in sylvis cum prioribus præsertim circa Grinzing, & Laetifontum.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA

POLYGAMIA ÆQUALIS.

TRAGOPOGON.

- TRAGOPOGON** calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris strictis. *Linn. Sp. pl.* 789.
Tragopogon calycibus florem superantibus. *Fl. Suec.* 648.
Tragopogon pratense luteum majus. *Bauh. pin.* 274.
Tragopogon. *Fuchs. hist.* 827. *Dodon. pempt.* 256.
Habitat ubique fere in pratis, & juxta vias præsertim circa Leytæpontum, Hernals, Dornbach, & in vallo suburbico Viennensi.

SCORZONERA.

- SCORZONERA** caule subnudo unifloro, foliis nervosis planis. *Fl. Suec.* 647.
Scorzonera humilis latifolia nervosa. *Bauh. pin.* 275.
Scorzonera humilis latifolia pannonica. *Clus. hist.* 2. p. 138.
Habitat in monte thermis Badensibus imminente, in montibus Medlingensibus, & Petersdorffensibus, ac in pratis Leytæpontanis.

2. SCORZONERA foliis lineari - subulatis integris planis, pedunculis cylindricis. *Linn. Sp. pl.* 791.
Scorzonera angustifolia subcærulea. Baub. pin. 275.
Habitat in monte Cecio seu Kalen. aut ut alii volunt Gallenberg.
3. SCORZONERA foliis subulatis integris, pedunculo incrassato, caule basi villoso. *Linn. Sp. pl.* 791.
Scorzonera angustifolia prima. Baub. pin. 275.
Scorzonera humilis angustifolia pannonica III. Clus. hist. 2. p. 137. t. 138.
Habitat in monte Cecio, in monte Hamburgensi, & in Leytaberg, circa Murobadium, Dornbach, Fischamentam, & Leytæpontum.
4. SCORZONERA foliis linearibus dentatis. *Hort. Ups.* 242.
Scorzonera foliis laciniatis. Tournef. inst. 477.
Tragopogon laciniatum luteum. Baub. pin. 264. *Raj. hist.* 251.
Habitat passim in agrorum marginibus, & ad vias publicas circa Leypæpontum, Waring, & Döbling, in vallo suburbico Viennensi pone Nosocomium ad St. Marcum, alibi.

P I C R I S.

1. PICRIS perianthiis imbricatis. *Fl. Suec.* 641.
Hieracium asperum, majori flore, in agrorum limitibus. Baub. hist. 2. p. 1029. *Tournef. inst.* 469. *Boerb. Lugdb.* 1. p. 85.
Cichorium pratense luteum hirsutie asperum. Baub. pin. 126.
Habitat in vallo suburbico Viennensi circa Nosocomium ad St. Marcum, & in agrorum marginibus hinc inde.

S O N C H V S.

1. SONCHUS pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis basi sagittatis. *Linn. Sp. pl.* 793.
Sonchus pedunculis calycibusque hispidis, floribus distanticorymbosis. Hort. Ups. 244.
Sonchus asper arborescens. Baub. pin. 124.
Sonchus lævior austriacus s. altissimus. Clus. hist. 2. p. 137.
Habitat in paludosis salicetis, & in arundinetis supra Baden, & Triebeswinckel.

2. *SONCHUS* pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis, foliis basi cordatis. *Linn. Sp. pl.* 793.

Sonchus pedunculis calycibusque hispidis, floribus congestis. *Fl. Suec.* 642.

Hieracium majus, folio *Sochi*, seu *Hieracium Sonchites*. *Baub. pin.* 126.

Hieracium majus. *Fuchs. hist.* 319.

Habitat inter segetes passim.

3. *SONCHUS* pedunculis tomentosis, calycibus glabris. *Linn. Sp. pl.* 749.

Sonchus annuus ramosus diffusus, foliis laciniatis. *Fl. Lapp.* 289.

Sonchus caule ramosissimo diffuso, foliis summis amplexicaulibus, pedunculis inæqualibus. *Roy. Lugdb.* 129.

- α. *Sonchus lævis laciniatus latifolius*. *Baub. pin.* 124.

Sonchus lævis. *Dodon. pempt.* 643. *Cam. epit.* 279.

- β. *Sonchus lævis minor paucioribus laciniis*. *Baub. pin.* 124.

Sonchus lævis latifolius. *Tabern. icon.* 190.

- γ. *Sonchus asper laciniatus, & non laciniatus*. *Baub. pin.* 124.

Habitat passim in cultis, præsertim in hortis oleraceis.

4. *SONCHUS* pedunculis squamosis, floribus racemosis. *Fl. Suec.* 644.

Sonchus lapponum altissimus, floribus cæruleis. *Fl. lapp.* 296.

Sonchus cæruleus. *Cam. epit.* 281.

Sonchus cæruleus latifolius. *Baub. hist.* 2. p. 1006.

Sonchus lævis laciniatus cæruleus, vel *Sonchus alpinus cæruleus*. *Baub. pin.* 124.

Sonchus lævior Austriacus III. cæruleo flore. *Clus. hist.* 2. p. 147.

Lactuca montana latifolia laciniata flore cæruleo. *Tournef. inst.* 474.

Habitat in alpinis, præsertim in Buchalpen, Etscher, & Schneeberg.

L A C T U C A.

1. *LACTUCA* foliis rotundatis, caule corymboso. *Linn. Sp. pl.* 795.

Lactuca sativa. *Baub. pin.* 122. *Hort. Ups.* 242. *Dodon. pempt.* 644.

β. *Lactuca capitata*. *Bauh. pin.* 123. *Dodon. pempt.* 645. *Moris. hist.* 3. p. 57, s. 7. t. 2. f. 2.

γ. *Lactuca crispa*. *Bauh. pin.* 123. *Dodon. pempt.* 644.

Hospitatur ubique in hortis oleraceis sub dio.

2. *LACTUCA* foliis carina aculeatis dentatis. *Linn. Sp. pl.* 795.

Lactuca caule foliisque aculeatis. *Hort. Cliff.* 384.

α. *Lactuca sylvestris* odore viroso. *Bauh. pin.* 123.

β. *Lactuca sylvestris*, costa spinosa. *Bauh. pin.* 123.

Habitat α. in parte septentrionali extra Nosocomium ad St. Marcum Viennæ, alibique in aggeribus. β. in ripa rivuli vallis Döblingensis, & copiose in hortis oleraceis. Excellentissimi Comitum Ernesti ab Harrach Leytæponti.

CHONDRILLA

1. *CHONDRILLA*. *Linn. Sp. pl.* 796. *Hort. Cliff.* 383. *Roy. lugdb.* 120. *Hall. helv.* 755. *Gmel. sibir.* 2. p. 8.

Chondrilla juncea viscosa arvensis, prima *Dioscoridis*. *Bauh. pin.* 130. *Hall. Jen. Rupp.* 206.

Chondrilla juncea viminea, arvensis. *Tabern. icon.* 173. *hist.* 487.

Chondrilla viminea. *Bauh. hist.* 2. p. 1021. *Chabr.* 317.

Habitat in vallo suburbico Viennensi, & agrorum marginibus inter hortum olim S. P. Eugenii. & Nosocomium ad St. Marcum, sicut etiam in vallo illo à Turcis ad Lapidicinam Weinhausensem tempore assidii Viennensis facti, ac passim in arvis Leytæpontum inter & Lapidicinam Cæsaream sitis.

PRENANTHES

1. *PRENANTHES* flosculis quinis, foliis lanceolatis denticulatis. *Linn. Sp. pl.* 797.

Lactuca montana purpura-cærulea miuor. *Bauh. pin.* 123.

Sonchus lævior pannonicus 4. purpureo flore. *Clus. hist.* 2. p. 147.

Habitat copiose in sylva montana Murobacium inter & Gablizam sita, passim supra thermas Badenses, alibique.

2. *PRENANTHES* flosculis quinis, foliis lyrato-hastatis. *Linn. Sp. pl.* 797.

Prenanthes flosculis quinis, foliis pinnato-hastatis. *Fl. Suec.* 645.

Son-

Sonchus lævis laciniatus muralis, parvis floribus. Baub. pin. 124.

Sonchus lævis vulgaris 2. Clus. hist. 2. p. 146.

Sonchus sylvaticus IV. Tabern. icon. 149.

Chondrilla Sonchifolio, flore luteo pallescente. Tournef. inst. 475. Hall. Jen. Rupp. 206.

Lactuca sylvestris murorum flore luteo. Baub. hist. 2. p. 1004.

Habitat in sylva montana supra Grinzing, circa Murobacium, Burckersdorff, Hiedldorff & Gablitz, alibique in nemoribus umbrosis.

LEONTODON.

LEONTODON calyce inferiore reflexo. Fl. Suec. 627. Fl. Lapp. 280.

Dens leonis latiore folio. Baub. pin. 126.

Hedypnois. Fuchs. hist. 680.

Taraxacon officinarum.

Habitat ubique in pascuis, pratis, pomariis.

LEONTODON calycibus erectis, pedunculis squamosis, foliis glabris dentatis integerrimis. Fl. Suec. 629.

Crepis foliis longis dentatis linearibus, caule declinato nudo. Hort. Cliff. 386.

Hieracium chondrillæ folio glabro, radice succisa majus, & minus. Baub. pin. 127.

Hieracium minus. Fuchs. hist. 320.

Habitat in pratis, pascuis, & hortorum locis gramineis circa Leytæpontum & Viennam.

LEONTODON calyce toto erecto hispido, foliis hispidis dentatis integerrimis. Hort. Cliff. 386. Fl. Suec. 628.

Picris calyce erecto, foliis hispidis dentatis: dentibus integerrimis. Sauv. monsp. 388.

Hieracium asperum, folio magno dentis leonis. Baub. pin. 127.

Hieracium caule aphylo, hirsutum. Baub. hist. 2. p. 1037.

Habitat inter Dornbach, Salmersdorff, & Weidling, alibique in pratis sylvaticis.

HIERACIUM.

HIERACIUM foliis integris subdenticulatis lanceolatis scabris; scapo unifloro. Linn. Sp. pl. 799.

Hieracium montanum angustifolium non nihil incanum.

Baub. pin. 129.

Hieracium VI. montanum. Clus. hist. 2. p. 141. Baub. hist. 3. p. 1038.

Habitat in monte Cecio seu Kalenberg, circa Grinzing, Dornbach, Burckersdorff, & Scoto-Viennam.

2. *Hieracium foliis dentatis viscidis hirsutis subasperis, scapo nudo unifloro, calyce hirto. Sauv. monsp. 298. Linn. Sp. pl. 300.*

Hieracium montanum, dentis leonis folio, s. laciniatum, lanuginoso folio. Baub. pin. 468.

Hieracium folio Hedypnoidis. Clus. hist. 2. p. 142.

Habitat in monte Leytaberg dicto; inter Salmersdorff, & Weidling; ac in montibus ad viam quæ ex pago Merzsteeg ad alpem Buchalpen dictam ducit sitis.

3. *HIERACIUM foliis integerrimis ovatis, caule repente, scapo unifloro. Fl. Suec. 633.*

Pilosella major repens hirsuta. Baub. pin. 262.

Pilosella major. Cam. epit. 709. Fuchs. hist. 605. Dodon. pempt. 67.

Dens leonis, qui Pilosella officinarum. Tournef. inst. 496.

Habitat supra Lapidicinam Dornbacensem, inter Salmersdorff, & Weidling, circa Murobadium, & Leytæpontum, alibique in pascuis aridis passim.

4. *HIERACIUM foliis integerrimis lanceolatis, scapo nudo multifloro. Fl. Suec. 635.*

Hieracium foliis integerrimis, caule repente, scapo nudo multifloro. Hort. Cliff. 338.

Hieracium pilosellæ folio erectum minus. Tournef. inst. 471.

Pilosella major erecta altera. Baub. pin. 262.

Pilosella repens minor, caule pedali, polyanthos, foliis angustis oblongis. Raj. suppl. 147.

Habitat in vallo suburbico Viennensi inter portam Hernalsensem, & Waringensem.

5. *HIERACIUM foliis linearibus subdentatis sparsis, floribus subumbellatis. Fl. Lapp. 287. Fl. Suec. 639.*

Hieracium fruticosum angustifolium majus. Baub. pin. 129.

Hieracium sabaudum. Dalech. hist. 570.

Hieracium I. Dodon. pempt. 638.

Habitat in montibus supra Nusdorff, & alibi in pascuis præsertim circa Dornbach, & Leytæpontum.

C R E P I S.

CREPIS foliis lanceolatis sagittatis sessilibus lævibus: inferioribus dentatis. *Fl. Suec.* 640.

Hieracium foliis radicalibus pinnato - dentatis, caulinis lanceolatis subdenticulatis. *Fl. Lapp.* 286.

Hieracium majus erectum angustifolium, caule lævi. *Bauh. pin.* 127.

Hieracium majus Dioscoridis. *Tabern. icon.* 180.

Habitat in aridis, testis, muris.

CREPIS foliis hastato-lyratis, caule piloso. *Linn. Sp. pl.* 807.

Hieracioides foliis variis asperis, caule altissimo folioso unifloro. *Hall. belv.* 751.

Hieracium erucæ folium hirsutum. *Bauh. hist.* 2. p. 1025. *Moris. hist.* 3. p. 65. s. 7. t. 5. f. 14.

Hieracium chondrillæ folio hirsutum. *Bauh. pin.* 127.

Habitat infra Salmersdorff ad vepres.

H Y O S E R I S.

HYOSERIS scapis simplicissimis unifloris, foliis pinnatifidis, seminibus nudis. *Linn. Sp. pl.* 808.

Taraxaconastrum, dentis leonis folio, radice foetida. *Vaill. aët.* 1721. p. 180.

Leontodontoides alpinus glaber, erysimi folio, radice crassa foetida. *Mich. gen.* 31. t. 28.

Dens leonis tenuissimo folio. *Bauh. pin.* 126. *prodr.* 62.

Hieracium foetidum III. *Col. ecphr.* 2. p. 29. t. 31.

Habitat in montibus Neobergam inter & Merxsteg sitis rarius.

H Y P O C H Æ R I S.

HYPOCHÆRIS caule subnudo: ramo solitario, foliis ovato-oblongis integris dentatis. *Fl. Suec.* 631.

Hypochæris hirsuta, endiviæ folio, magno flore. *Vaill. aët.* 1721. p. 280. *Fl. lapp.* 288.

Hieracium alpinum latifolium hirsutiae incanum flore magno. *Bauh. pin.* 128. *Tournef. inst.* 472.

Hieracium latifolium I. *Clus. hist.* 2. p. 139.

Hieracium alpinum foliis dentatis flore magno. *Bauh. pin.* 128. *prodr.* 65. *Hall. belv.* 760. t. 24.

β. Hieracium alpinum maculatum hirsutie incanum, flore magno. Tournef. inst. 472.

Habitat inter Salmersdorff, & Weidling, alibique passim in apricis & siccioribus. β. præsertim in prato illo ad sinistram via Dornbacensis pagum Hernals inter, & vineas sito, alibique.

L A P S A N A.

1. *LAPSANA calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramosissimis. Fl. Suec. 649.*

Lampfana. Dodon. pempt. 675.

Soncho affinis lapsana domestica. Baub. pin. 124.

Habitat in Brader, circa Murobacium, alibique passim etiam in cultis.

C I C H O R I V M.

1. *CICHORIUM caule simplici, foliis dentato-sinuatis. Fl. Suec. 650.*

Cichorium caule simplici. Hort. Cliff. 389.

Cichorium sylvestre seu officinarum. Baub. pin. 126.

Intubus sylvestris. Cam. epit. Fuchs. hist. 979.

Seres sylvestres, Abubeja. Lob. hist. 114.

Habitat ubique ad vias publicas, & margines agrorum.

2. *CICHORIUM caule simplici, foliis integris crenatis. Hort. Ups. 247.*

Cichorium latifolium s. Endivia vulgaris. Baub. pin. 125.

Intubum sativum. Dodon. pempt. 634.

- β. Cichorium crispum. Tournef. inst. 479.*

Endivia crispa. Baub. pin. 125.

Intubus crispa. Cam. epit. 283.

Hospitatur ubique in hortis oleraceis sub dio.

E C H I N O P S.

1. *ECHINOPS calycibus unifloris, caule multifloro, foliis spinosis supra nudis. Linn. Sp. pl. 814.*

Echinops floribus capitatis, calycibus unifloris. Hort. Ups. 248.

Echinops major. Baub. hist. 3. p. 69. Hall. Jen. Rupp. 196.

Carduus sphærocephalus latifolius vulgaris. Baub. pin.

Carduus sphærocephalus. *Dodon. pempt. 722.*

Chalcejos. *Dalech. hist. 1480.*

Hospitatur sub dio in hortulo botanico fratris Honorii apud FF. Misericordiæ in suburbio Viennensi Leopoldino, alibique in hortis plerumque flore caruleo.

Habitat ubique in sylvis circa Leytæpontum, Julaschium, & Lapidicinam Cæsaream, flore potissimum albo.

A R C T I V M.

ARCTIVM foliis cordatis inermibus petiolatis. *Linn. Sp. pl. 816.*

Arctium. *Fl. Suec. 651.*

Lappa major seu Arctium Dioscoridis. *Bauh. pin. 128. Tournef. inst. 450.*

Bardana sive Lappa major. *Dodon. pempt. 58.*

Personata. *Cam. epit. 887.*

β. Lappa major montana, capitulis tomentosis. *Bauh. pin. 128.*

Habitat ubique ad vias publicas, & in ruderatis. β. in fine pagi Nickelsdorff versus Margarethen, copiose vero in valle Breinina.

S E R R A T V L A.

SERRATVLA foliis pinnatifidis: pinna terminali maxima. *Fl. Suec. 660. Hort. Ups. 249.*

Serratula. *Bauh. pin. 235. Dodon. pempt. 42.*

Serratula Mathioli. *Clus. hist. 2. p. 8.*

Serratula sylvatica. *Hall. Jen. Rupp. 188.*

Habitat in pratis Draskirchensibus, in alnetis insularum danubialium præsertim Fischamentensium, in vepreto inter hortum phasianorum, & hortum oleraceum Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach Leytæponti, alibique passim in pratis humidioribus ad ripas fluminum sitis.

SERRATVLA calycibus subhirsutis ovatis. *Linn. Sp. pl. 816.*

Cirsium foliis triangularibus lunate dentatis. *Hall. belv.*

Carduus mollis lapathi foliis. *Bauh. pin. 377.*

Carduus mollior 2. *Clus. hist. 2. p. 151.*

Habitat in alpibus Schneeberg, & Etscher.

SERRATVLA foliis dentatis spinosis. *Fl. Suec. 662.*

Carduus radice repente, foliis lanceolatis dentatis, margine aculeato. *Fl. lapp. 223.*

Carduus vinearum repens, Sonchi folio. *Baub. pin.* 387
prodr. 156.

Cirsium arvense, Sonchi folio, radice repente, flore
purpurascente. *Tournef. inst.* 448.

Cerastotheca theophrasti. *Colum. ecphr.* 45. t. 45.

Habitat in arborum, & vinearum marginibus, ad viam re-
giam NUSDORFFENSEM; trans ALSTERBACH & plateam Wa-
ringensem ad furnum lateritium Viennæ.

C A R D U S.

1. *CARDUUS* foliis decurrentibus hastato-pinnatis spinosis
laciniis divaricatis, calycibus ovatis spinosis villo-
sis, caule piloso. *Linn. Sp. pl.* 821.

Carduus foliis lanceolatis decurrentibus: denticulis su-
perficieque spinosis. *Fl. Suec.* 654.

Carduus lanceolatus latifolius. *Baub. pin.* 385.

Carduus lanceolatus seu sylvestris DODONÆI. *Baub. hist.*
3. p. 58.

Eriocephalus vulgaris, capite turbinato, flore purpureo.
Vaill. act. 1718. p. 205.

Habitat passim ad vias publicas.

2. *CARDUUS* foliis spinosis semidecurrentibus, floribus cer-
nuis: squamis calycinis superne patentibus. *Linn.*
Sp. pl. 821.

Carduus foliis spinosis semidecurrentibus, floribus nu-
tantibus, squamis calycinis superne patentibus
Fl. Suec. 655.

Carduus foliis sinuatis decurrentibus margine spinosis
floribus solitariis nutantibus. *Hort. Cliff.* 293.

Carduus nutans. *Baub. hist.* 3. p. 56.

Carduus moschatus, flore amplo, capite deflexo. *Vaill.*
act. 1718. p. 195.

Carduus spinosissimus latifolius Sphærocephalus vulga-
ris. *Baub. pin.* 385.

Habitat ubique ad vias, pagos, & in arvis præsertim Leytæponti.

3. *CARDUUS* foliis sinuatis decurrentibus margine spinosis
calycibus pedunculatis solitariis erectis villosis
Linn. Sp. pl. 821.

Carduus foliis laciniatis: subtus tomentosus ex margine
spinosis, capitulis sessilibus congestis aculeatis
Hall. belv. 677.

Carduus acanthoides. *Baub. hist.* 3. p. 59.

Carduus spinosissimus capitulis minoribus. Raj. angl. 3. p. 124.

Carduus polyacanthos, capitulis longioribus & tenuioribus, foliis albicantibus. Moris. hist. 3. p. 153.

Habitat in monte Hamburgensi, & alibi in ruderatis.

CARDUVS foliis sinuatis decurrentibus: margine spinosis, flosculis aggregatis terminalibus nudis. Linn. Sp. pl. 821.

Carduus foliis sinuatis decurrentibus margine spinosis, floribus confertis terminatricibus nutantibus. Fl. Suec. 658.

Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris. Loes. pruss. 43. t. 5.

Carduus caule crispo. Bauh. hist. 3. p. 9.

Habitat passim in agris, cultis, & ad vias.

CARDUVS foliis dentatis decurrentibus: margine spinosis, floribus racemosis erectis, pedunculis inerminibus. Linn. Sp. pl. 822.

Carduus foliis linearibus dentatis spinosissimis, caule crispo spinoso ramoso, floribus erectis. Fl. Suec. 659.

Carduus palustris. Bauh. pin. 377. prodr. 156.

Carduus spinosissimus erectus angustifolius palustris. Moris. hist. 3. p. 153. s. 7. t. 32. f. 13.

Carduus polycephalus angustifolius. Dalech. hist. 1753.

Cirsium pratense polycephalon vulgare. Tournef. inst. 448. Hall. Jen. Rupp. 188.

Cirsium caule pene nudo alis crispis obducto, capitulis mitibus in vertice congestis. Hall. belv. 681.

Habitat passim in pratis paludosis præsertim circa Leytæpontum, & in marginibus pratorum, arborumque Minckendorffensium.

CARDUVS foliis amplexicaulibus hastato-pinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis: spinis canaliculatis duplicato-spinosis. Linn. Sp. pl. 823.

Carduus squamis calycinis margine apiceque spinosis. Hort. Ups. 250.

Carduus albis maculis notatus vulgaris. Bauh. pin. 281.

Carduus Mariæ. Dalech. hist. 1475.

Carduus leucographus. Dodon. pempt. 722.

Habitat in ruderatis, nunc, ecclesiæ Fischamentensis veteris, alibi ad sepēs, agrorumque margines varius.

Hospitatur passim in hortis rhizotomarum sub dio.

7. *CARDUVS* foliis sessilibus bifariam pinnatifidis, laciniis alternis erectis, calycibus globosis villosis. *Linn. Sp. pl.* 823.

Carduus foliis sinuatis decurrentibus: denticulis superficieque spinosis, calycibus lanigeris. *Roy. lugdb.* 133.

Carduus capite rotundo tomentoso. *Baub. pin.* 382.

Carduus tomentosus corona fratrum herbariorum. *Lob. icon.* 2. p. 9.

Carduus eriocephalus. *Dodon. pempt.* 723. *Clus. hist.* 2. p. 154.

Habitat *sparsum* ad vepres circa Leytæpontum, & Lapidicinam Cæsaream, copiosius autem in valle Breinina, & circa Neobergam, alibique in montanis.

8. *CARDUVS* foliis pinnatifidis spinosis sessilibus, caule inermi, capitulis solitariis. *Linn. Sp. pl.* 824.

Carduus foliis semipinnatis: pinnis semibilobis, capitulis inermibus singularibus. *Sauv. monsp.* 292.

Carduus pratensis asphodeli radice latifolius. *Baub. pin.* 377. *Moris. hist.* 3. p. 7. t. 27. f. 27. 28.

Carduus bulbosus monspeliensium. *Lob. icon.* 10.

Carduus bulbosus monspeliensium sive *Acanthus* sylvestris quibusdam foliis laciniatis. *Baub. hist.* 3. p. 43.

Cirsium pratense asphodeli radice latifolium. *Tournef. inst.* 448.

Habitat in pratis Hochaviensibus, aliisque.

9. *CARDUVS* foliis lanceolatis integris subamplexicaulibus: serraturis spinoso-setaceis, pedunculis unifloris. *Linn. Sp. pl.* 825.

Serratula foliis lanceolatis integris amplexicaulibus: serraturis spinoso-setaceis. *Hort. Ups.* 248.

Cirsium singularibus capitulis parvis. *Baub. pin.* 377.

Cirsium 3. Montanum 1. *Clus. hist.* 2. p. 149.

Habitat in montibus Medlingensibus, Badensibus, & Breininis.

C N I C V S.

1. *CNICVS* caule diffuso foliis dentato-sinuatis. *Hort. Ups.* 250.

Carduus sylvestris hirsutus f. *Carduus* benedictus. *Baub. pin.* 378.

Car-

Carduus benedictus. *Cam. epit.* 562. *Baub. hist.* 3. p. 75.
Dodon. pempt. 737.

Hospitatur in hortis rhizotomarum præsertim Hernalsensium
 sub dio.

CNICVS caule erecto, foliis inferioribus laciniatis; superioribus integris concavis. *Fl. Suec.* 711.

Cnicus pratensis, acanthi folio, flore flavescente. *Tournef. inst.* 450.

Cirsium acanthoides pratense, flore ochro-leuco. *Vaill. act.* 1718. p. 208.

Carduus pratensis latifolius. *Baub. pin.* 376.

Carduus pratensis. *Lob. icon.* 2. p. 11. *Baub. hist.* 3. p. 42.

Habitat in pratis subnemosissimis passim, præsertim in horto phasianorum Rohravienſi, & Leytæpontano, in prato Murobacensi, ac in valle Breinina.

CNICVS foliis amplexicaulibus sinuato-pinnatis spinosis, caule simplici, floribus sessilibus. *Linn. Sp. pl.* 826.

Carlina polycephalos alba. *Baub. pin.* 380.

Cirsium alpinum spinosissimum, floribus ochroleucis inter flavescentia folio congestis. *Hall. helv.* 679. t. 20.

Habitat in secundo jugo alpſ Breininae.

O N O P O R D O N.

ONOPORDON calycibus squarrosis, foliis ovato-oblongis sinuatis. *Linn. Sp. pl.* 827.

Onopordon foliis decurrentibus margine spinosis. *Fl. Suec.* 653.

Spina alba tomentosa latifolia sylvestris. *Baub. pin.* 382.
Loes. pruss. 261. t. 82.

Achanthium. *Dodon. pempt.* 721.

Habitat in ruderatis, & cultis, præsertim Fischamentæ, ad vineam ecclesiæ parochialis, & ad Sacellum pestilentielle Horreaque Fischamentensia, ac circa mœnia Leytæpontana.

C Y N A R A.

CYNARA foliis subspinosis pinnatis indivisisque calycinis squamis ovatis. *Linn. Sp. pl.* 827.

Cynara foliis pinnatis: laciniis serratis. *Hort. Ups.* 251.

Cinara sylvestris latifolia. *Baub. pin.* 384.

Cinara hortensis aculeata. *Baub. pin.* 383.

Scolymus Dioscoridis. Clus. hist. 2. p. 152.

Hospitatur passim in hortis oleraceis sub dio, vel in vaporariis.

2. **CYNARA** foliis spinosis: omnibus pinnatifidis, calycinis squamis ovatis. *Linn. Sp. pl. 828.*

Cinara foliis pinnatis: foliolis oblongis indivisis, caule spinoso. Sauv. meth. 239.

Cinara spinosa, cujus pediculi éstantur. Baub. pin. 383.

Scolymus aculeatus. Tabern. hist. 1075.

Hospitatur passim in hortis oleraceis sub dio.

C A R L I N A.

1. **CARLINA** caule unifloro flore brevior. *Hort. Ups. 252.*

Carlina acaulos, magno flore albo. Baub. pin. 380.

Chamæleon albus. Clus. hist. 2. p. 155.

Habitat passim in pascuis montanis circa Gabliz, Murobacium, Petzlstorff, & Burckersdorff, in pratis Himbergenfibus & in valle illâ Neobergam inter & Merzsteeg, alibique.

2. **CARLINA** caule multifloro corymboso, floribus terminalibus. *Linn. Sp. pl. 828.*

Carlina caule multifloro corymboso. Fl. Suec. 652.

Carlina Sylvestris vulgaris. Clus. hist. 2. p. 155. Tournef. inst. 500.

Carlina sylvestris quibusdam, aliis Atractylis. Baub. hist. 3. p. 81.

Heracantha. Tabernæmont. & Rivini. Hall. Jen. Rupp. 212.

Cnicus sylvestris spinosior. Baub. pin. 378.

Atractylis mitior. Fuchs. hist. 121.

Habitat passim in apricis asperis circa Burckersdorff, Hiedldorff, Grinzing, Murobacium, & Rosenaviam, alibique.

C A R T H A M V S.

1. **CARTHAMVS** foliis ovatis integris ferrato-aculeatis. *Hort. Ups. 251.*

Cnicus sativus sive Carthamus officinarum. Baub. pin. 378.

Cnicus vulgaris. Clus. hist. 2. p. 152.

Hospitatur passim in hortis sub dio, præsertim Leytæponti in borto Excellentissimi Comitæ Ernesti ab Harrach.

B I D E N S.

BIDENS corollis flosculosis, calycibus subfoliosis, seminibus erectis, foliis trifidis. *Linn. Sp. pl.* 831.

Bidens corona seminum retrorsum aculeata, foliis trifidis. *Fl. Suec.* 663.

Bidens foliis tripartito-divisis. *Cæsalp.* 488. *Tournef. inst.* 462. *Fl. Lapp.* 294.

Ceratocephalus vulgaris tripteris, & pentapteris foliis, caule rubente. *Vaill. act.* 1720. p. 423.

Verbesina foliis tripartito-divisis. *Hall. Jen. Rupp.* 168.

Cannabina aquatica folio tripartitim diviso. *Bauh. pin.* 321.

Hepatorium aquatile. *Dodon. pempt.* 595.

Habitat in fossis præsertim inter Waring, & Weinhaus, alibique.

BIDENS feminibus erectis: foliis lanceolatis amplexicaulibus floribus cernuis. *Linn. Sp. pl.* 832.

Bidens corona seminum retrorsum aculeata, foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus nutantibus. *Fl. Suec.* 664.

Bidens folio non dissecto. *Tournef. inst.* 462. *Cæsalp.* 488.

Ceratocephalus persicæ folio, flore luteo discoide. *Vaill. act.* 1720. p. 422.

Verbesina semine bi-vel tridentato, folio integro. *Hall. Jen. Rupp.* 168.

Cannabina aquatica folio non diviso. *Bauh. pin.* 321.

Eupatorium cannabinum chrysanthemum. *Tabern. icon.* 117.

Habitat flore radiato in fossa ad domum vestigaliarii Taborensis in suburbio Leopoldino Viennæ. An forte *Coreopsis*?

C A C A L I A.

CACALIA foliis reniformibus acutis denticulatis. *Linn. Sp. pl.* 836.

Cacalia. *Hall. belv.* 705.

α. *Cacalia* foliis crassis hirsutis. *Bauh. pin.* 197. *Moris. hist.* 3. p. 94. s. 7. t. 12. f. 1.

Cacalia incano folio. *Clus. hist.* 2. p. 115.

β. *Cacalia* foliis cutaneis acutioribus, & glabris. *Bauh. pin.* 198. *Moris. hist.* 3. p. 94. s. 7. t. 12. f. 6.

Cacalia glabro folio. Clus. hist. 2. p. 115.

Cacalia. Lobel. icon. 592.

Habitat α. in primo & secundo jugo montis Schneeberg, β. ibidem, & in alpe Breinina,

EUPATORIUM.

I. *EUPATORIUM foliis digitatis. Fl. Suec. 665.*

Eupatorium cannabinum. Baub. pin. 320. Tournef. inst. 455.

Eupatorium adulterinum. Fuchs. hist. 265.

Hepatorium vulgare. Dodon. pempt. 28.

Herba s. Kunigundis. Trag. hist. 491.

Habitat copiose in Tabor, aliisque insulis danubialibus.

CHRYSOCOMA.

I. *CHRYSOCOMA herbacea, foliis linearibus glabris, calycibus laxis. Linn. Sp. pl. 841.*

Chrysocoma calycibus laxis. Hort. Cliff. 396.

Chrysocome. Dill. in Giff. addit. nov. gen. 167. t. 16.

Coma aurea; Germanica. Park. 688. Boerhaav. lugdb. 121.

Osyris austriaca. Clus. hist. 1. p. 325.

Linofyris nuperorum. Lob. icon. 409.

Linaria folioso capitulo luteo major. Baub. pin. 213.

Linaria aurea Tragi, sive linaria tertia. Baub. hist. 3. p. 151.

Conyza, linariæ folio. Tournef. inst. 455.

Virga aurea linariæ foliis. Raj. meth. 189.

Habitat supra Lapidicinam Medlingensem, Weinhausensem, & Leytæpontanam versus vineas Adelsbergenses ad marginem sylvæ, alibique.

SANTOLINA.

I. *SANTOLINA pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. Hort. Ups. 252.*

Abrotanum fœmina foliis teretibus. Baub. pin. 136.

Abrotanum fœmina vulgare. Clus. hist. 1. p. 341.

Hospitatur in hortis hinc inde Viennæ æstate in apricariis hyeme in frigidariis præsertim olim in horto Favoritæ Videntis.

TANACETVM.

TANACETVM foliis bipinnatis incisiss ferratis. *Fl. Suec.*
666.

Tanacetum foliis pinnatis planis; pinnis ferratis. *Fl.*
Lapp. 295.

Tanacetum vulgare luteum. *Baub. pin.* 132. *Tournef. inst.*
461.

Athanasia sive Tanacetum. *Dalech. hist.* 955.

Artemisia monoclonos. *Fuchs. hist.* 46.

β. Tanacetum foliis crispis. *Baub. pin.* 132.

Tanacetum crispum. *Dodon. pempt.* 36.

Habitat copiose in Tabor ad ripam danubii cum Tamarice.

Hospitatur β. passim in hortis sub dio.

TANACETVM foliis ovatis integris ferratis. *Hort. Ups.* 255.

Mentha hortensis corymbifera. *Baub. pin.* 226.

Balsamita major. *Dodon. pempt.* 295.

Costus hortensis. *Dalech. hist.* 678.

Hospitatur passim in hortis sub dio.

POLYGAMIA SUPERFLVA.

ARTEMISIA.

ARTEMISIA foliis ramosissimis setaceis, caule erecto fruticoso. *Hort. Ups.* 257.

Abrotanum mas angustifolium majus. *Baub. pin.* 136.

Abrotanum mas. *Dodon. pempt.* 21.

Hospitatur ubique in hortis sub dio.

ARTEMISIA foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. *Linn. Sp. pl.* 846.

Artemisia foliis multifidis linearibus, caule procumbente. *Fl. Suec.* 668.

Artemisia tenuifolia. *Dodon. pempt.* 33.

Abrotanum campestre. *Baub. pin.* 136.

Ambrosia altera. *Cam. epit.* 597.

Habitat Viennæ ad vallum suburbicum inter portam Waringensem, & Hernalsensem, in antiquo muro Erdbeerensi, in pratisque siccioribus Murobacensibus.

ARTEMISIA foliis multipartitis tomentosis, racemis cernuis, flosculis femineis ternis. *Linn. Sp. pl.* 846.

Absinthium Seriphium germanicum. *Baub. pin.* 139.

Absinthium seriphium. Dodon. pempt. 25.

Absinthium Austriacum tenuifolium. Clus. hist. 1. p. 339.

Habitat ubique in arduis & siccioribus, agrorumque limitibus circa Leytæpontum & Nischiterium, præsertim in monte Nischiteriensi, & ad semitam ad domum venatoris Leytæpontani ducentem copiosè.

4. *ARTEMISIA* foliis multipartitis subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus: receptaculo nudo. *Hort. Ups. 257.*

Absinthium ponticum tenuifolium incanum. Baub. pin. 138.

Absinthium tenuifolium. Dodon. pempt. 24.

Absinthium ponticum vulgare. Clus. hist. 1. p. 339.

Habitat in saxosis, aridis, salebrosis, præsertim in monte Leopoldsberg, monti Cecio vicino, supra Lapidicinam Weinhausensem, & undique circa Lapidicinas Cæsareas ac Königshofen.

5. *ARTEMISIA* foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis: receptaculo villoso. *Fl. Suec. 670.*

Absinthium incanum, foliis compositis latiuscule multifidis, floribus subglobosis pendulis. Gmel. sib. 2. p. 129. t. 63.

Absinthium vulgare majus. Baub. hist. 3. p. 168.

Absinthium ponticum seu romanum officinarum s. Dioscoridis. Baub. pin. 138. Tournef. inst. 457.

Habitat in Tabor, in prato circa sacellum ad St. Brigittam, in fine suburbii Leopoldini sito, circa Ladendorff, copiosè autem circa Lapidicinam Cæsaream, & ad viam eandem inter & Latifontum.

6. *ARTEMISIA* foliis pinnatifidis planis incis: subtus tomentosis, racemis simplicibus, floribus ovatis: radio quinquefloro. *Linn. Sp. pl. 848.*

Artemisia foliis pinnatifidis planis laciniatis floribus erectis. Fl. Suec. 667.

Artemisia vulgaris major. Baub. pin. 137.

Artemisia vulgaris. Baub. hist. 3. p. 184.

Habitat passim in cultis, & ruderalis, præsertim ad arcem Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach Leytæponti, & in insula Fischamentensi Haueriana, olim Geimanniana copiosè.

GNAPHALIVM.

1. GNAPHALIVM caule simplicissimo, corymbo simplici terminali, sarmentis procumbentibus. *Fl. Suec.* 672.
 Gnaphalium caule simplicissimo, floribus coloratis terminato. *Fl. Lapp.* 302.
 Gnaphalium sexubus tota planta distinctis. *Hall. herb.* 698.
 Gnaphalium montanum flore rotundiore. *Bauh. pin.* 263.
 Elichrysum montanum flore rotundiore, candido, subpurpureo, variegato. *Tournef. inst.* 453.
 Pilosella minor. *Dodon. pempt.* 68. *fig. interior.*
 β. Gnaphalium montanum longiore & folio & flore. *Bauh. pin.* 263.
 Elichrysum montanum longiore & folio & flore albo, purpureo, suave rubente. *Tournef. inst.* 453.
 Pilosella minor. *Dodon. pempt.* 68. *fig. exterior.*
 Habitat in apricis & aridis passim, præsertim supra Lapidicinam Dornbacensem.
2. GNAPHALIVM foliis lineari-lanceolatis acuminatis alternis, caule superne ramoso, corymbis fastigiatis. *Hort. Ups.* 255.
 Gnaphalium latifolium americanum. *Bauh. pin.* 263.
 Gnaphalium americanum. *Clus. hist.* 1. p. 327.
 Hospitatur in hortis hinc inde, præsertim Perschlingæ in horto Domini Mays sub dio.
3. GNAPHALIVM foliis linearibus, caule fruticoso ramoso, corymbo composito. *Hort. Ups.* 256.
 Elichrysum orientale. *Bauh. pin.* 264. *prodr.* 123.
 Elichrysum africanum frutescens, angustis & longioribus foliis incanis. *Comm. hort.* 2. p. 109. t. 55.
 Helichrysum frutescens latifolium, flore corymbifero toto aureo. *Moris. hist.* 3. p. 86. s. 7. t. 10. f. ult.
 Hospitatur passim in hortis æstate in apricariis, hyeme in frigidariis, præsertim Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.
4. GNAPHALIVM foliis lanceolatis: inferioribus obtusis, caule herbaceo simplicissimo, corymbo composito. *Fl. Suec.* 674.
 Elichrysum sive Stœchas citrina latifolia. *Bauh. pin.* 264. *Tournef. inst.* 453.

Stoechas citrina germanica, latiore folio. Baub. hist. 3. p. 153. Raj. hist. 281.

Habitat in vallo illo tempore assedii Viennensis a turcis non procul a Lapidicina Weinhausensi facto.

5. **GNAPHALIVM** caule simplicissimo, capitulo terminali, bracteis hirsutissimis radiato. *Linn. Sp. pl. 855.*

Gnaphalium alpinum, magno flore, folio oblongo. Baub. pin. 264.

Gnaphalium alpinum pulchrum. Baub. hist. 3. p. 161.

Gnaphalium alpinum. Clus. hist. 1. p. 328.

Leontopodium. Dodon. pempt. 68.

Habitat in alpe Breinina, Etscher, & Schneeberg.

6. **GNAPHALIVM** caule simplicissimo, floribus sparsis. *Fl. Suec. 675.*

Gnaphalium majus, angusto oblongo folio alterum. Baub. pin. 262.

Gnaphalium rectum. Baub. hist. 3. p. 160.

Filago floribus per caulem sparsis. Dill. Giff. 149.

Elichrysum spicatum. Fournes. inst. 453.

Habitat ad marginem sylvæ Ladendorffensis, & in sylvis Leytæpontanis.

7. **GNAPHALIVM** caule erecto diviso, floribus pyramidalis lateralibus axillaribusque. *Fl. Suec. 678.*

Gnaphalium minus repens. Baub. pin. 262.

Gnaphalium minimum. Lob. icon. 481. Baub. hist. 3. p. 159. Raj. hist. 296.

Habitat in montibus Dornbacensibus.

8. **GNAPHALIVM** caule erecto dichotomo, capitulis globosis axillaribus terminalibusque. *Linn. Sp. pl. 857.*

Gnaphalium caule erecto dichotomo, floribus in alis sessilibus. Fl. Suec. 677.

Gnaphalium vulgare majus. Baub. pin. 262.

Gnaphalium Germanicum. Baub. hist. 3. p. 158.

Gnaphalium. Fuchs. hist. 222.

Filago sive impia. Dodon. pempt. 66.

Habitat in agris, arvisque hinc inde, & in vallo Suburbico Viennensi.

XERANTHEMVM.

1. **XERANTHEMVM** foliis lanceolatis patentibus. *Linn. Sp. pl. 857.*

Xeranthemum receptaculis paleaceis, seminum pappo quinqueseto. Hort. Cliff. 400.

Xc-

Xeranthemum oleæ folio, capitulis simplicibus incanis,
non fœtens, flore majore violaceo. *Moris. hist. 3.*
p. 43. s. 6. t. 2. f. 2.

Xeranthemum aliud five *Ptarmica* quorundam. *Baub.*
hist. 3. p. 25.

Jacea oleæ folio capitulis simplicibus. *Baub. pin. 272.*

Ptarmica Austriaca. *Clus. hist. 2. p. 11. Dodon. pempt. 710.*

Stœbe Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 211.*

Habitat in plaga occidentali Lapidicinæ Weinhausensis, & ad
agrorum margines præsertim inter Simmering, & Schwe-
chat passim, ac copiosè in arvis ad vallum suburbicum Vien-
nensem directè ultra Waringer - Gassen ad dextram versus
Lichtenthal sitis.

C O N Y Z A.

CONYZA foliis lanceolatis acutis, caule annuo corymbo-
so. *Hort. Ups. 257.*

Conyza major vulgaris. *Baub. pin. 265. Boerhaav. lugdb.*
1. p. 116. Hall. Jen. Rupp. 192.

Conyza. *Cam. epit. 612.*

Conyza major altera. *Dodon. pempt. 51.*

Conyza major mathioli Baccharis quibusdam. *Baub. hist.*
2. p. 1051.

Baccharis monspeliensium. *Dalech. hist. 917.*

Eupatorium montanum, verbasci folio, vulgatius *Bac-*
charis dictum. *Moris. hist. 3. p. 99.*

Habitat in locis gramineis horti olim Favoritæ Videntis, nunc
Gymnasii Theresiani, & in siccis circa Girling supra Clau-
stro - Neoburgum, ac in sylva Leytæpontana ad Noso-
comium spectante.

E R I G E R O N.

ERIGERON caule unifloro, calyce piloso. *Fl. Suec. 692.*

Aster caule unifloro, foliis integerrimis, calyce villoso
subrotundo. *Fl. Lapp. 307. t. 9. f. 3.*

Aster caule unifloro, calyce tomentoso. *Hall. helv. 724.*

Aster montanus omnium minimus, foliis oblongis, flo-
ribus albis. *Vaill. act. 1720. p. 400.*

Asteri montano purpureo similis, vel globulariæ. *Baub.*
hist. lib. XXIV. p. 1047. Scheuchz. iter alpinum primum
p. 25. Londin. 1708.

Habitat in alpe Breinina, & Schneeberg.

TVSSILAGO.

1. TVSSILAGO scapo subnudo unifloro, foliis cordato - orbiculatis crenatis. *Linn. Sp. pl.* 865.
 - a.* Tussilago alpina rotundifolia glabra. *Baub. pin.* 197.
Tussilago alpina 2. *Clus. hist.* 2. p. 13.
 - β.* Tussilago alpina rotundifolia canescens. *Baub. pin.* 197.
Tussilago alpina 1. flore evanido. *Clus. hist.* 2. p. 113.
Habitat *a.* & *β.* in alpe Breinina, & Schneeberg.
2. TVSSILAGO scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis angulatis denticulatis. *Fl. Suec.* 680.
Tussilago vulgaris. *Baub. pin.* 197. *Tournef. inst.* 487.
Tussilago. *Cam. epit.* 591.
Tussilago vulgo Farfara, aliis ungula caballina. *Cæsalp. Syst.* 490.
Habitat ubique ad ripas fluminum, & rivulorum.
3. TVSSILAGO thyrsso fastigiato, flosculis femineis nudis paucis. *Fl. Suec.* 681.
Petasites minor. *Baub. pin.* 197. *Tournef. inst.* 451.
Petasites albus, anguloso folio. *Baub. hist.* 3. p. 567.
Petasites flore albo. *Cam. epit.* 593.
Habitat passim in udis præsertim supra Nusdorff, & circa Draskirchen.
4. TVSSILAGO thyrsso ovato, flosculis omnibus hermaphroditis. *Fl. Suec.* 683.
Tussilago major. *Cam. epit.* 592.
Petasites major, & vulgaris. *Baub. pin.* 197.
Petasites Dodon. pempt. 597. florens, & sine flore. *Clus. hist.* 2. p. 116.
Habitat in valle Döblingensi, alibique.

SENECIO.

1. SENECIO corollis nudis, foliis pinnato - sinuatis amplexicaulibus, floribus sparsis. *Fl. Suec.* 690.
Senecio foliis pinnatifidis denticulatis: laciniis æqualibus patentibus: rachi lineari. *Hort. Cliff.* 406.
Senecio minor vulgaris. *Baub. pin.* 131. *Fl. Lapp.* 296.
Erigeron minus. *Dodon. pempt.* 541.
Habitat ubique fere in cultis, & ruderatis.
2. SENECIO corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis, squamis calycinis laxis longitudine perianthii. *Linn. Sp. pl.* 868.

Senecio foliis pinnatifidis sessilibus: laciniis angulosis: superioribus latioribus, florum radiis disco brevioribus. *Roy. lugdb. 142.*

Senecio hirsutus viscidus graveolens. *Dill. elth. 347. t. 258. f. 336.*

Senecio incanus pinguis. *Baub. pin. 131.*

Jacobæa viscosa & hirsuta. *Hall. Jen. Rupp. 177.*

Habitat in muris, tectis, vineis, & pagis hinc inde, inque sylvis cæduis præsertim in Leytaberg, & trans rivum Burckersdorffensem, supra primum rivulum, qui supra molas ex montibus dextris in torrentem Viennensem fluit.

Senecio corollis radiantibus, foliis pinnato-multifidis linearibus. *Linn. Sp. pl. 869.*

Senecio foliis decompositis. *Guett. Stamp. 360.*

Chrysanthemum alpinum, foliis abrotani multifidis. *Baub. pin. 134.*

Chrysanthemum alpinum 2. *Clus. hist. 2. p. 333. t. 334.*

Habitat in alpis Breininæ secundo jugo, ac ad pedem ejusdem.

Senecio corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto. *Linn. Sp. pl. 870.*

Senecio foliis pinnato-lyratis, laciniis lacinulatis, caule erecto. *Fl. Suec. 688.*

Jacobæa vulgaris laciniata. *Baub. pin. 131. Tournef. inst. 485.*

Herba Sti Jacobi. *Fuchs. hist. 742.*

Habitat in pascuis & juxta vias in sylvis passim, præsertim circa Leytæpontum, Murobacium, & Gablizam.

Senecio corollis radiantibus octonis, foliis lanceolatis biferratis subtus villosis, caule ramoso. *Linn. Sp. pl. 870.*

Senecio foliis ovato-lanceolatis subtus hirsutis, floribus umbellatis. *Hall. belv. 734. itin. 23.*

Jacobæa nemorensis latiore rigidiore & hirsuto folio. *Hall. Jen. Rupp. 177.*

Solidago foliis lanceolatis ferratis, floralibus ad pedunculum minimis. *Gmel. sib. 2. p. 165.*

Habitat in sylvis hinc inde, præsertim in cæduis ad pedem alpis Breininæ sitis.

Senecio corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis lanceolatis ferratis glabriusculis. *Linn. Sp. pl. 871. Hort. Ups. 260.*

Senecio foliis lanceolatis ferratis, floralibus pedunculos æquantibus. *Vir. Cliff.* 84. *Roy. lugdb.* 163.

Solidago caule simplici, corymbo terminali: pedunculis partialibus alternis nudis longitudine folii. *Hort. Cliff.* 410.

Solidago Sarracenica. *Fuchs. hist.* 728.

Virga aurea angustifolia ferrata. *Baub. pin.* 268.

Habitat in sylvis montanis passim, præsertim in Breininis.

A S T E R.

1. ASTER foliis lanceolatis hirtis: radicalibus obtusis, caule simplicissimo unifloro. *Linn. Sp. pl.* 872.

Aster montanus cæruleus magno flore, foliis oblongis. *Baub. pin.* 267,

Aster Vii Austriacus V. *Clus. hist.* 2. p. 15.

Habitat ad alpem Breininam, & in monte supra vineas Münichshoofenses versus sylvam Golsensem sito.

2. ASTER foliis lanceolatis obtusis scabris trinervis integris, pedunculis nudiusculis corymbosis, squamis calycinis obtusis. *Linn. Sp. pl.* 873.

Aster foliis lanceolatis scabris semiamplexicaulibus subserratis, calycibus laxis: squamis lanceolatis. *Hort. Cliff.* 407.

Aster atticus cæruleus vulgaris. *Baub. pin.* 267.

Aster atticus. *Dodon. pempt.* 266.

Aster VIII, italorum Fuchsi. *Clus. hist.* 2. p. 15. f. 16.

Habitat in valle Döblingensi, ad viam regiam Nusdorffensem, in monte supra Nusdorff, alibique in pratis.

S O L I D A G O.

1. SOLIDAGA panniculato-corymbosa, racemis recurvatis, floribus adscendentibus, foliis trinerviis subserratis scabris. *Linn. Sp. pl.* 878. *Hort. Ups.* 259.

Virga aurea angustifolia, panicula speciosa canadensis. *Pluk. alm.* 389. t. 236. f. 1. *Moris. hist.* 3. p. 125.

Virga aurea Virginiana annua. *Zanoni* 205. *Hall. Jen. Rupp.* 178. *Tournef. inst.* 484. *Boerhaav. lugdb.* 1. p. 97.

Conyza canadensis annua, acris, alba, folio linariæ. *Boccon. rar. plant.* 86.

Aster

Aster canadensis annuus flore papposo. *Hort. Reg. Paris.*
Boerhaav. & Hall. loco citato.

Habitat nunc ubique fere in pratis, & pomariis, præsertim circa Viennam, Leytæpontum, & Fischamentam, pappo suo mire sese propagans totius fere Austriæ indigena facta.

SOLIDAGO caule subflexuoso angulato, racemis paniculatis erectis confertis. *Linn. Sp. pl. 880.*

Solidago caule erecto, racemis alternis erectis. *Fl. Suec. 685.*

Solidago floribus per caulem simplicem undique sparsis. *Fl. Lapp. 306.*

Virga aurea vulgaris latifolia. *Baub. hist. 2. p. 162.*

Virga aurea latifolia ferrata. *Baub. pin. 268.*

Habitat in montibus circa Dornbach, Grinzing, aliisque.

SOLIDAGO foliis cordatis petiolatis dentatis. *Linn. Sp. pl. 880. Roy. lugdb. 162.*

Jacobæa alpina, foliis subrotundis ferratis. *Baub. pin. 131. prodr. 70. t. 71.*

Jacobæa alpina laciniata, flore buphthalmi. *Baub. pin. 131.*

Jacobæa 3. latifolia 1. *Clus. hist. 2. p. 23.*

Senecio foliis petiolatis cordatis ferratis subtus incanis, floribus luteis ex summo caule racemosis. *Hall. belv. 731.*

Habitat in valle ante Durrenstein, & Buchbergam.

SOLIDAGO foliis lanceolatis subdentatis: caulinis amplexicaulibus, caule subunifloro. *Linn. Sp. pl. 880.*

Doronicum foliis lanceolatis alternis dentatis: caulinis amplexicaulibus, caule ramoso. *Roy. lugdb. 160. Sauv. monsp. 84.*

Doronicum longifolium hirsutie asperum. *Baub. pin. 185.*

Doronicum II. Austriacum 1. *Clus. hist. 2. p. 17.*

Habitat in alpidibus Schneeberg, & Etscher.

IN V L A.

IN V L A foliis ovatis rugosis: subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. *Linn. Sp. pl. 881.*

Aster foliis ovatis rugosis amplexicaulibus: subtus tomentosis, calycum squamis ovatis patulis. *Fl. Suec. 695.*

Aster

Aster omnium maximus Helenium dictus. *Tournef. inst.* 482.

Helenium vulgare. *Bauh. pin.* 276.

Helenium. *Cam. epit.* 35. *Fuchs. hist.* 242.

Helenium s. Enula Campana. *Bauh. hist.* 3. p. 108.

Hospitatur in hortis Erdbeerensibus Viennæ, & Rhizotomiarum Hernalsensium sub dio, alibique.

2. INVLA foliis oblongis integris hirsutis, caule piloso corymbofo, floribus confertis. *Linn. Sp. pl.* 881.

Aster caule superne ramoso ampliato, foliis lanceolatis amplexicaulibus integris, calycibus laxis terminalibus. *Hort. Cliff.* 407.

Conyza pannonica lanuginosa. *Bauh. pin.* 265. *Morif. hist.* 3. p. 113. s. 7. t. 19. f. 1.

Conyza 3. Austriaca. *Clus. hist.* 2. p. 20.

Habitat circa Simmering, Schwechat, Salmersdorff, Baden, Rodaun, Petersdorff, alibique secundum vias.

3. INVLA foliis oblongis, caule hirsuto paniculato, squamis calycinis setaceis. *Linn. Sp. pl.* 882.

Aster foliis semiamplexicaulibus oblongis, caule paniculato hirsuto, floribus latis, squamis calycinis setaceis. *Fl. Suec.* 694.

Aster pratensis autumnalis Conyzæ folio. *Tournef. inst.* 492.

Conyza media, asteris flore luteo, s. tertia Dioscoridis. *Bauh. pin.* 265.

Conyza media mathioli, flore magno luteo humidis locis proveniens. *Bauh. hist.* 2. p. 1050.

Conyza I. *Tabern. hist.* 1243.

Calaminthæ tertium genus. *Fuchs. hist.* 436.

Habitat ad viam regiam Laxenburgensem, in Tabor, in valle Döblingenfi, Breininaque, & alibi in insulis danubialibus, ac ad viarum publicarum Scrobes seu fossas.

4. INVLA foliis undulatis amplexicaulibus, caule prostrato. *Linn. Sp. pl.* 882.

Erigeron foliis undulatis amplexicaulibus. *Fl. Suec.* 693.

Aster palustris parvo flore globoso. *Tournef. inst.* 483.

Conyza ramis secundum flores gradatim enascentibus foliis lanceolatis obtusis. *Hort. Cliff.* 405.

Conyza minor flore globoso, *Bauh. pin.* 266.

Conyza minima. Dodon. pempt. 52.

Habitat ubique fere in pratis, pomariis, hortorumque locis gramineis, cum Solidagine canadensi.

INVLA foliis lanceolatis recurvis ferrato - ciliatis, floribus solitariis, ramis angulatis. *Linn. Sp. pl. 882.*

Aster foliis lanceolatis amplexicaulibus ferrato - ciliatis glabris acuminatis recurvis, floribus solitariis, caule striato. Fl. Suec. 696.

Aster montanus luteus, salicis glabro folio. Baub. pin. 266. Tournef. inst. 483.

Aster pannonicus salignis foliis sive IV. Clus. hist. 2. p. 14.

Conyza media monspeliensis, quibusdam Asteris attici genus, folio glabro rigido. Baub. hist. 2. p. 1049.

Bubonium luteum I. Tabern. hist. 716.

Habitat supra Weidling, alibique in asperis, siccioribus pratis, montibus, & cædis sylvis.

INVLA foliis lanceolatis semiamplexicaulibus hispidis, caulibus subunifloribus teretibus. *Linn. Sp. pl. 883.*

Aster foliis lanceolatis sessilibus integerrimis, caulibus simplicibus unifloris, squamis calycinis subulatis. Dalib. paris. 259.

Aster luteus hirsuto salicis folio. Baub. pin. 266.

Aster pannonicus lanuginoso folio sive V. Clus. hist. 2. p. 14.

Habitat circa Dornbach, Grinzing, Burckersdorff, alibique juxta vias.

INVLA foliis linearibus acuminatis nervosis glabris sparsis, caule subunifloro, *Linn. Sp. pl. 883.*

Aster luteus, linariæ rigido glabro folio. Baub. pin. 267. Volckam. Fl. Norimb. 49.

Aster VI. Austriacus IV. Clus. hist. 2. p. 15.

Habitat in pratis insularum danubialium præsertim Ebersdorffensium, Mannswertensium, & Fischamentensium.

ARNICA

ARNICA foliis ovatis integris, caulinis geminis oppositis. *Linn. sp. pl. 884.*

Arnica foliis ovatis integris conjugatis. Hall. helv. 737.

Doronicum foliis caulinis oppositis. Fl. Suec. 684.

Do-

Doronicum plantaginis folio alterum. *Tournef. inst.* 480.
Alisma. *Matthiol. Diosc.* 934.
Habitat ad alpem Wexel.

D O R O N I C U M.

1. *DORONICUM* foliis cordatis obtusis: radicalibus petiolatis; caulinis amplexicaulibus. *Linn. Sp. pl.* 885.
Doronicum foliis cordatis denticulatis, caule ramoso.
Hort. Cliff. 411.
Doronicum maximum foliis caulem amplexantibus.
Bauh. pin. 184.
Doronicum VI. Austriacum III. *Clus. hist.* 2. p. 19.
Habitat copiose in alpe Buchalpen dicta, aliisque fere omnibus.

B E L L I S.

1. *BELLIS* scapo nudo. *Linn. Sp. pl.* 886.
Bellis scapo nudo uniflora. *Fl. Suec.* 707.
Bellis sylvestris minor. *Bauh. pin.* 267.
Bellis sylvestris. *Dodon. pempt.* 265.
 β . *Bellis hortensis, flore pleno.* *Bauh. pin.* 261.
Habitat ubique in pascuis.
Hospitatur β . passim in hortis sub dio areolas cingens.

T A G E T E S.

1. *TAGETES* caule subdiviso diffuso. *Hort. Ups.* 267.
Tanacetum africanum f. Flos africanus minor. *Bauh. pin.* 132.
Flos africanus. *Dodon. pempt.* 255.
 β . *Tagetes indicus minor multiplicato flore.* *Tournef. inst.* 488.
Hospitatur ubique in hortis sub dio.
2. *TAGETES* caule simplici erecto, pedunculis nudis unifloris. *Hort. Ups.* 267.
Tanacetum africanum majus, simplici flore. *Bauh. pin.* 133.
Cariophyllus indicus. *Cam. epit.* 406.
 β . *Tagetes maximus rectus, flore maximo multiplicato.*
Bauh. hist. 3. p. 100.
 γ . *Tagetes mexicanus, flore fistuloso, simplex.* *Col. ecphr.* 2. p. 47. t. 46. f. 1.
Hospitatur ubique in hortis sub dio.

CHRYSANTHEMUM.

CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus oblongis : superne ferratis, inferne dentatis. *Fl. Suec.* 700.

Chrysanthemum foliis oblongis ferratis. *Fl. Lapp.* 310.

Leucanthemum vulgare. *Tournef. inst.* 402.

Bellis sylvestris: caule folioso, major. *Bauh. pin.* 261.

Bellis major. *Fuchs. hist.* 148. *Cam. epit.* 635.

Habitat circa Dornbach, Grinzing, Murobacium, alibique passim in pratis.

CHRYSANTHEMUM foliis amplexicaulibus: superne lacinatis; inferne dentato-ferratis. *Fl. Suec.* 699.

Chrysanthemum folio minus secto glauco. *Tournef. inst.* 492. *Bauh. hist.* 3. p. 105.

Chrysanthemum arvense, folio glauco, dentato. *Hall. Jen. Rupp.* 169.

Chrysanthemum segetum. *Lob. icon.* 552. *Clus. hist.* 1. p. 334.

Chrysanthemum segetum vulgare glaucum. *Moris. hist.* 3. p. 15. s. 6. t. 4. f. 1.

Bellis lutea, foliis profunde incisfis, major. *Bauh. pin.* 262.

Habitat in valle Döblingensi, supra Grinzing parvumque Nussdorff, & alibi inter segetes & in agrorum limitibus.

CHRYSANTHEMUM foliis pinnatifidis incisfis extrorsum latioribus, *Hort. Ups.* 263.

Chrysanthemum foliis matricariæ. *Bauh. pin.* 134.

Chrysanthemum creticum. *Clus. hist.* 1. p. 334. *Moris. hist.* 3. p. 16. s. 6. t. 4. f. 2. 3.

Chrysanthemum flore partim candido, partim luteo, *Bauh. pin.* 134.

ospitatur ubique in hortis sub dio.

CHRYSANTHEMUM foliis pinnatis inciso ferratis, caule multifloro. *Linn, Sp. pl.* 890.

Leucanthemum sylvaticum Tanacetifolio, semine umbilicato, flore minore. *Hall. Jen. Rupp.* 170.

Tanacetum inodorum. *Dodon. pempt.* 37.

Tanacetum inodorum II. *Clus. hist.* 1. p. 338.

Tanacetum montanum inodorum minore flore. *Bauh. pin.* 132.

Tanacetum Leucanthemum. *Tabern. hist.* 379.

Matricaria Tanacetii folio flore minore, semine umbilicato. *Tournef. inst.* 493.

β. *Leucanthemum sylvaticum Tanacetii* folio, semine umbilicato, flore majore. *Hall. Jen. Rupp.* 170.

Matricaria Tanacetii folio, flore majore, semine umbilicato. *Tournef. inst.* 493.

Tanacetum montanum inodorum flore majore. *Baub. pin.* 132.

Tanacetum inodorum I. *Clus. hist. r.* p. 338.

Habitat in sylvis, & montibus passim præsertim in valle Döblingensi, circa Dornbach, & Grinzing, ubi α. & β. promiscue occurrunt.

M A T R I C A R I A.

1. *MATRICARIA* foliis compositis planis: foliolis ovatis incis, pedunculis ramosis. *Linn. Sp. pl.* 890.

Matricaria vulgaris sive sativa. *Baub. pin.* 133.

Matricaria. *Dodon. pempt.* 35.

β. *Parthenium pleno* flore. *Clus. hist. r.* p. 337.

Habitat nunc hinc inde in ruderalis, & ad sepes, præsertim ad ultimas domos Dornbacenses.

Hospitatur β ubique in hortis sub dio.

2. *MATRICARIA* receptaculis hemisphæricis, radiis patentibus, seminibus coronato-marginatis, squamis calycinis margine obsoletis. *Fl. Suec.* 702.

Matricaria foliis supra decompositis setaceis, pedunculis solitariis. *Hort. Cliff.* 415.

Chamæmelum vulgare, leucanthemum dioscoridis. *Baub. pin.* 135. *Tournef. inst.* 494.

Chamæmelum vulgare. *Dodon. pempt.* 257.

Anthemis vulgaris. *Lob. icon.* 770.

Habitat ubique in agris, præsertim circa Leytæpontum.

A N T H E M I S.

1. *ANTHEMIS* foliis pinnato-compositis linearibus acutis subvillosis. *Linn. Sp. pl.* 894.

Anthemis foliis pinnato-decompositis: laciniis setaceis. *Hort. Cliff.* 415.

Matricaria receptaculis conicis, radiis deflexis, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus. *Fl. Suec.* 701.

Chamæmelum nobile f. *Leucanthemum odoratus*.

Baub. pin. 135.

Chamæmelum odoratum. Dodon. pempt. 270.

3. *Chamæmelum nobile*, flore multiplici. *Baub. pin. 135.*

Chamæmelum Romanum, flore multiplici. *Cam. epit. 646.*

Chamæmelum chium vernum, folio crassiore, flore magno. *Tournef. cor. 37. Roy. Lugdb. 172.*

Habitat ubique inter segetes, & in agrorum marginibus.

Hospitatur β. passim in hortis præsertim rhizotomarum Hernalsen sium sub dio.

A C H I L L E A.

ACHILLEA foliis pinnatifidis planis obtusis tomentosis.

Linn. Sp. pl. 898.

Achillea, foliis sinuato-laciniatis planis villosis micidibus obtusis. *Hort. Cliff. 412. Roy. lugdb. 176.*

Absointhium alpinum umbelliferum. Clus. hist. 1. p. 340.

Dracunculus argenteus. Moris. hist. 3. p. 40. s. 6. t. 10. f. 5.

Habitat in Schneeberg, copiosius autem in alpe Breinina.

ACHILLEA foliis lanceolatis acuminatis argute ferratis.

Linn. Sp. pl. 898.

Achillea foliis acutis integris minutissime ferratis. *Hort.*

Ups. 265. Fl. Suec. 706.

Ptarmica vulgaris. Clus. hist. 2. p. 12.

Dracunculus pratensis, ferrato folio. *Baub. pin. 98.*

Draco sylvestris sive Ptarmica. Dodon. pempt. 710.

Hospitatur in hortis oleraceis sub dio.

Achillea foliis pinnulis pectinatis integriusculis, pedunculis villosis. *Linn. Sp. pl. 899.*

Achillea foliis pinnatis, pinnis longis acutis subhirsutis raro dentatis. *Hall. belv. 714.*

Matricaria alpina, chamæmeli foliis. *Baub. pin. 134.*

Parthenium alpinum. Clus. hist. 1. p. 330.

Habitat in Schneeberg.

ACHILLEA foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus dentatis. *Fl. Suec. 705.*

Achillea foliis pinnato-pinnatis. *Fl. Lapp. 311.*

Millefolium vulgare album. Baub. pin. 140.

3. *Millefolium purpureum. Tabern. hist. 130.*

Habitat ubique secundum vias, in pascuis, agrorum marginibus,

pomariis, sylvis, & pratis. β. passim in aridis, & editioribus præsertim circa Petersdorff, & in vallo suburbico Viennensi.

B V P H T H A L M V M.

1. *BVPHTHALMUM* foliis lanceolatis subserratis villosis, calycibus nudis. *Linn. Sp. pl. 904. Roy. lugdb. 170. Hall. helv. 711. Sauv. monsp. 87.*

Aster luteus major foliis succisæ. Baub. pin. 266.

Aster 3. Austriacus I. Clus. hist. 2.p. 13.

Habitat in monte Hamburgensi, Leytaberg, circa Petersdorff, Medling, & Leytæpontum, alibique in collibus, & ad alpium radices.

POLYGAMIA FRVSTRANEA.

H E L I A N T H V S.

1. *HELIANTHVS* foliis omnibus cordatis: nervis pone basin unitis: extrorsum denudatis. *Linn. Sp. pl. 904. Helianthus radice annua. Hort. Ups. 268.*

Helenium indicum maximum. Baub. pin. 276.

Chrysanthemum Peruvianum. Dodon. pempt. 264.

Sol annuus amplissimo nutante flore. Hall. Jen. Rupp. 167.

Corona Solis. Tabern. icon. 763. Tournef. inst. 489. Boerhaav. lugdb. 1. p. 102.

Herba maxima. Baub. hist. 3.p. 107.

Hospitatur ubique fere in hortis rusticorum sub dio.

2. *HELIANTHVS* foliis inferioribus cordatis: nervis pone basin unitis denudatis: superioribus ovatis. *Linn. Sp. pl. 905.*

Helianthus radice tereti inflexa perenni. Hort. Ups. 268.

Helenium indicum ramosum. Baub. pin. 277.

Corona folis minor fæmina. Tabern. icon. 764.

Hospitatur in hortis Viennæ sub dio.

3. *HELIANTHVS* foliis, ovato cordatis: nervis intra folium unitis. *Linn. Sp. pl. 905.*

Helianthus radice tuberosa. Hort. Cliff. 419. Ups. 268.

Helenium indicum tuberosum. Baub. pin. 277.

Chry-

Chrysanthemum latifolium brasilianum. *Baub. prodr.* 70.
Sol altissimus, radice tuberosa, esculenta. *Hall. Jen.*
Rupp. 168.

Corona solis parvo flore, tuberosa radice. *Tournef. inst.*
 489.

Flos solis Farnesianus, *Aster peruanus*, tuberosus. *Col.*
ecphr. 2. p. 11. t. 13.

Hospitatur sub dio in fossis Civitatis Hamburgensis alibique
in hortis oleraceis.

CENTAVREA.

CENTAVREA calycibus inermibus subrotundis glabris:
 squamis ovatis, foliis sinuatis. *Hort. Ups.* 271.

Cyanus orientalis major moschatus flore purpureo, &
 albo. *Moris. hist.* 3. p. 135. s. 7. t. 25. f. 5.

β. *Cyanus orientalis major*, foliis magis dissectis, flore
 luteo. *Moris. hist.* 3. p. 135. s. 7. t. 25. f. 9.

Hospitatur ubique fere in hortis sub dio β. *tamen varius.*

CENTAVREA calycibus recurvato-plumosis, foliis indivi-
 sis. *Linn. Sp. pl.* 910.

Centaurea calycibus ciliatis: ciliis setaceis recurvis.
Hort. Ups. 270.

Jacea latifolia, & *angustifolia* capite hirsuto. *Baub. pin.*
 271.

Jacea IV. *Austriaca*, capite villoso. *Clus. hist.* 2. p. 7.

Habitat in montanis præsertim circa Dornbach & Leytæ-
pontum.

CENTAVREA calycibus pinnatis: squamula ovata: ciliis ca-
 pillaribus erectis. *Linn. Sp. pl.* 911.

Cyanus foliis imis ad basin pinnatis: superioribus inte-
 gris ovato-lanceolatis. *Hall. belv.* 691. t. 23. f. 1.

Jacea nigra laciniata. *Baub. pin.* 271.

Jacea *Austriaca* VI. *Clus. hist.* 2. p. 7.

Habitat passim circa Döbling, Grinzing, Draskirchen, Mu-
robacium, & Leytæpontum.

CENTAVREA calycibus ferratis: foliis linearibus integer-
 rimis: infimis dentatis. *Linn. Sp. pl.* 911. *Fl. Suec.*
 710.

Cyanus segetum. *Baub. pin.* 273.

Cyanus vulgaris. *Lob. icon.* 546.

Habitat ubique inter segetes.

5. *CENTAVREA* calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis linearibus, caule paniculato. *Linn. Sp. pl.* 912.

Centaurea calycibus ciliatis, foliis filiformibus bipinnatis, caule folioso ramoso. *Sauv. monsp.* 264.

Jacea non spinosa, foliis magis divisis, elatior, capitulis minoribus non splendentibus. *Moris. hist.* 3. p. 140. s. 7. t. 28. f. 15.

Stœbe major, cauliculis non splendentibus. *Baub. pin.* 273.

Centaurii majoris species tenuifolia. *Baub. hist.* 3. p. 31.

Habitat juxta vias, & in montanis passim, præsertim circa Leytæpontum.

6. *CENTAVREA* calycibus ciliatis oblongis, foliis pinnatifidis linearibus integerrimis. *Roy. lugdb.* 140. *Linn. Sp. pl.* 914.

Stœbe incana, cyano similis, tenuifolia. *Baub. pin.* 273.

Stœbe Austriaca humilis. *Clus. hist.* 2. p. 10.

Habitat in vallo suburbico Viennensi, & ad vias publicas præsertim Fischamentam inter, & Elend.

7. *CENTAVREA* calycibus squamosis obtusis, foliis radicalibus bipinnatifidis; caulinis pinnatis dentibus lanceolatis. *Linn. Sp. pl.* 914. *Roy. Lugdb.* 142. *Sauv. meth.* 289.

Jacea calyculis argenteis major. *Tournef. inst.* 444.

Stœbe calyculis argenteis. *Baub. pin.* 273.

Stœbe Salmantica 3. *Clus. hist.* 2. p. 10.

Habitat circa Murobadium, alibique cum antecedentibus.

8. *CENTAVREA* calycibus subduplicato-spinosis, foliis sessilibus lateralibus pinnatifidis linearibus dentatis. *Linn. Sp. pl.* 917.

Centaurea calycibus duplicato-spinosis, foliis lanceolatis subdentatis, capitulis subsessilibus lateralibus. *Hort. Ups.* 273.

Centaurea calycibus subulato-spinosis sessilibus, foliis linearibus pinnatifidis. *Hort. Cliff.* 423. *Roy. lugdb.* 140.

Carduus stellatus, f. *Calcitrapa*. *Baub. hist.* 3. p. 89.

Carduus stellatus foliis papaveris erratici, *Baub. pin.* 387. *Raj. hist.* 317.

Carduus muricatus vulgo *Calcitrapa* dictus. *Clus. hist.* 2. p. 7.

Habitat ad montium radices, & secundum vias circa Scotto-Vienam, & in vallo Breinina subinde.

POLYGAMIA NECESSARIA.

CALENDULA.

1. **CALENDULA** feminibus radii cymbiformibus echinatis:
disci bicornibus. *Hort. Ups.* 274. *Fl. Suec.* 712.
Calendula arvensis. *Tabern. icon.* 335.
Caltha arvensis. *Bauh. pin.* 275. *Tournef. inst.* 498.
Caltha vulgaris. *Bauh. pin.* 275.
Hospitatur ubique in hortis sub dio.

OTHONNA.

1. **OTHONNA** foliis pinnatifidis tomentosis, laciniis sinuatis,
caule fruticoso. *Hort. Ups.* 273.
Solidago foliis pinnatifidis: laciniis sinuatis, corymbis
racemosis. *Hort. Cliff.* 410.
Jacobæa maritima. *Bauh. pin.* 131.
Cineraria. *Dodon. pempt.* 642.
Hospitatur in hortis nobilium Viennæ, præsertim in horto S.
P. de Schwarzenburg, æstate in apricario hyeme in frigidario.

FILAGO.

1. **FILAGO** floribus sessilibus terminalibus, foliis floralibus
majoribus. *Linn. Sp. pl.* 927.
Gnaphalium caule simplicissimo, foliis superioribus ma-
ioribus. *Roy. lugdb.* 147.
Gnaphalium roseum hortense. *Bauh. pin.* 263. *prodr.* 122.
Barr. icon. 127.
Hospitatur passim in hortis magnatum Viennæ, præsertim in
horto Excellentissimi Comitis Ferdinandi ab Harrach.

MONOGAMIA.

VIOLA.

1. **VIOLA** acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus.
Linn. Sp. pl. 934.
Viola acaulis, stolonibus teretibus reptantibus, pedun-
culis radicalibus. *Hort. Cliff.* 427. *Fl. Suec.* 715.
Viola martia purpurea, flore simplici odore. *Bauh. pin.*
199.

Viola nigra, f. *purpurea*. *Dodon. pempt. 156. t. 1. 2.*

β. *Viola martia alba*. *Baub. pin. 199.*

γ. *Viola martia*, *multiplici flore*. *Baub. pin. 199.*

Habitat ubique in nemoribus, sylvis, & dumetis, pomariis, ac hortis, præsertim in saltibus Leytæpontanis, & Nischteriensibus. β. hinc inde cum priore præsertim inter Gersthoof, & Pezelsdorff in dumeto ad sinistram viæ sito.

Hospitatur γ passim in hortis sub dio.

2. *VIOLA* caule demum adscendente; foliis oblongo-cordatis. *Linn. Sp. pl. 935.*

Viola caulibus adscendentibus floriferis, foliis cordatis. *Fl. Suec. 716.*

Viola foliis cordatis oblongis, pedunculis subradicatis. *Fl. Lapp. 277.*

Viola martia inodora sylvestris. *Baub. pin. 199.*

Viola cærulea martia inodora sylvatica, in cacumine semen ferens. *Baub. hist. 3. p. 543.*

Habitat passim post antecedentem florens in sylvis, pratis, & pascuis, præsertim in pratis apricis insularum seu nemorum danubialium.

3. *VIOLA* caule triquetro diffuso, foliis oblongis incisissimis stipulis dentatis. *Linn. Sp. pl. 935. Fl. Suec. 721.*

Viola pedunculis caulinis angulatis, stipulis oblongis pinnato-dentatis, foliis ovato-oblongis crenatis. *Hort. Cliff. 527.*

Viola bicolor arvensis. *Baub. pin. 200.*

Trinitatis herba. *Fuchs. hist. 803.*

Jacea altera. *Cam. epit. 913.*

β. *Viola tricolor hortensis repens*. *Baub. pin. 199.*

Jacea seu Flos Trinitatis. *Cam. epit. 912.*

Habitat passim in arvis, & agris, β. circa Waring, & Döbling minus tamen frequens.

Hospitatur vero β. ubique fere in hortis sub dio.

4. *VIOLA* caule bifloro, foliis reniformibus ferratis. *Linn. Sp. pl. 936.*

Viola foliis reniformibus, pedunculis caulinis. *Fl. Suec. 720. Hort. Cliff. 427. Roy. lugdb. 431.*

Viola foliis cordato-obtusis, pedunculis caulinis. *Fl. Lapp. 276.*

Viola alpina rotundifolia lutea. *Baub. pin. 199.*

Viola montana I. *Clus. hist. 1. p. 309.*

Habitat in alpe Breinina, & Schneeberg.

I M P A T I E N S.

1. IMPATIENS pedunculis unifloris aggregatis, foliis lanceolatis, nectariis flore brevioribus. *Linn. Sp. pl. 938. Hort. Ups. 276.*

Impatiens pedunculis confertis unifloris. *Hort. Cliff. 428, Balsamina fœmina. Baub. pin. 306.*

Balsamina. *Dodon. pempt. 671.*

Hospitatur ubique in hortis sub dio.

2. IMPATIENS pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *Linn. Sp. pl. 938. Fl. Suec. 722.*

Impatiens Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 269.*

Impatiens herba. *Dodon. pempt. 659.*

Balsamina lutea sive Noli me tangere. *Baub. pin. 306. Tournef. inst. 419.*

Noli me tangere. *Baub. hist. 2. p. 908. Col. ecphr. 1. p. 149. t. 150.*

Habitat in insularum danubialium nemoribus, præsertim in Tabor ad dextram, alibique ad rivulos.

C L A S S I S XX.

G Y N A N D R I A

D I A N D R I A.

O R C H I S.

1. Orchis bulbis indivisis, nectarii labio lanceolato integerrimo: Cornu longissimo petalis patentibus. *Linn. Sp. pl. 939.*

α. Orchis alba bifolia minor, calcari oblongo. *Baub. pin. 83. Vaill. paris. t. 30. f. 7.*

Orchis serapias primus. *Dodon. pempt. 237.*

β. Orchis bifolia altera. *Baub. pin. 82. Clus. hist. 1. p. 267.*

Orchis bifolia latissima. *Baub. pin. 82.*

Orchis amplissima foliis binis splendentibus. *Baub. hist. 2. p. 771.*

Habitat α. in Schneeberg, alibique in pascuis montanis. β. in pratis, & saltibus circa Mannersdorff, & Leytaberg alibique.

2. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido antice bidentato: cornu longo, petalis acuminatis. *Linn. Sp. pl. 940.*
 Orchis radicibus subrotundis, bracteis flore brevioribus, nectarii labio trifido, seta longissima. *Hort. Cliff. 429.*
a. Orchis purpurea, spica congesta pyramidalis. *Raj. angl. 3. p. 377. t. 48.*
 Cynosorchis militaris montana, spica rubente conglomerata. *Bauh. pin. 81. prodr. 28.*
β. Orchis latifolia hiantē cucullo altera. *Bauh. pin. 81.*
γ. Cynosorchis latifolia spica compacta. *Bauh. pin. 81.*
 Cynosorchis tertius. *Dodon. pempt. 235.*
 Habitat *a.* in montanis cretaceis circa Latifontum *ast* varius, *β.* in pratis Mannersdorffensibus, & Sumerainensibus. *γ.* passim in pratis Leytæpontanis.
3. ORCHIS bulbis indivisis nectarii labio quadrifido crenulato: cornu obtuso. *Linn. Sp. pl. 94. Fl. Suec. 724.*
 Orchis radicibus subrotundis nectarii labio quadrifido, æquali crenulato: cornu obtuso. *Roy. lugdb. 15.*
 Orchis morio fœmina. *Bauh. pin. 82. Vaill. paris. t. 31. f. 13. 14.*
 Triorchis serapias mas. *Fuchs. hist. 559.*
β. Orchis angustifolia. *Bauh. pin. 83. Vaill. paris. t. 31. f. 33. 34.*
 Habitat circa Dornbach, Murobacium, alibique.
4. ORCHIS bulbis indivisis nectarii labio quadrifido punctis scabro: cornu obtuso, petalis distinctis. *Linn. Sp. pl. 941.*
 Orchis militaris pratensis humilior. *Tournefort. Vaill. paris. 149. t. 31. f. 35. 36.*
 Orchis pannonica IV. *Clus. hist. 1. p. 268.*
 Gynosorchis militaris pratensis humilior. *Bauh. pin. 81.*
 Habitat inter montes Rodaunenses, Medlingenses, & Badenses.
5. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quinquesido punctis scabro: cornu obtuso, petalis confluentibus. *Linn. Sp. pl. 94. Conniventibus. Fl. Suec. 725.*
 Orchis galea, & alis cinereis. *Bauh. hist. 2. p. 755.*
 Orchis mas latifolia. *Fuchs. hist. 554.*
 Cynosorchis latifolia, hiantē cucullo major. *Bauh. pin. 80.*

β. Orchis militaris major. Tournef. inst. 438. t. 247. Vaill. paris. 148. t. 31. f. 21. 27. 28.

Cynosorchis militaris major. Baub. pin. 81.

Habitat in pratis circa Dornbach, Murobadium, & Leytæpontum.

ORCHIS bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus. *Linn. Sp. pl. 941.*

Orchis radicibus palmatis bracteis flore longioribus, nectarii labio trifido, cornu germinibus brevioribus.

Hort. Cliff. 429.

Orchis palmata pratensis latifolia. Baub. pin. 86.

β. Orchis palmata palustris latifolia. Baub. pin. 86.

Habitat passim in pratis præsertim circa Dornbach, β. in prato Fischamentensi.

SATYRIUM.

SATYRIUM bulbis palmatis, foliis linearibus, nectarii labio resupinato trilobo: intermedia majore. *Linn. Sp. pl. 944. Fl. Suec. 731.*

Satyrium foliis linearibus. Roy. prodr. 14.

Orchis palmata angustifolia alpina, nigro flore. Baub. pin. 86.

Palma Christi minor. Cam. epit. 627.

Palmata angustifolia, flore supinato, calcare brevissimo. Hall. helv. 47.

Habitat in Schneeberg.

OPHRIS.

OPHRIS bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido. *Linn. Sp. pl. 946.*

Ophris foliis ovatis. Fl. Suec. 738.

Ophris bifolia. Baub. pin. 87.

Ophris. Fuchs. hist. 565.

Habitat in vallis Breininæ pratis subhumidis.

OPHRIS bulbis subrotundis, caule folioso, nectarii labio subquinelobo. *Linn. Sp. pl. 948.*

Cypripedium bulbis subrotundis, foliis oblongis caulinis. Fl. Suec. 737.

α. Orchis araneam referens. Baub. pin. 92. Tournef. inst. 434. t. 247. f. c. Vaill. paris. t. 30. f. 10. 11. 12. 13.

- Orchis adrachnitis. *Lob. icon.* 135.
 β. Orchis fucum referens colore rubiginoso. *Baub. pin.* 83.
Vaill. paris. 146. t. 31. f. 15. 16.
 Orchis fucum referens flore subvirente. *Baub. pin.* 83.
 Orchis serapias secundus minor. *Dodon. pempt.* 238.
 Habitat α. circa Baden, & Burckersdorff, β. sat copiose in
 monte supra Lapidicinam Dornbacensem.

S E R A P I A S.

- I. SERAPIAS bulbis fibrosis, nectarii labio obtuso crenato
 petalis brevior. *Linn. Sp. pl.* 949.
 α. Serapias caule multifolio multifloro. *Hort. Cliff.* 422.
 Helleborine latifolia montana. *Baub. pin.* 186.
 Helleborine. *Dodon. pempt.* 384.
 Elleborine recentiorum 2. *Clus. hist.* 1. p. 272.
 Epipactis seu Helleborine. *Cam. epit.* 889.
 β. Helleborine montana angustifolia purpurascens. *Baub.*
pin. 187.
 Elleborine recentiorum 6. *Clus. hist.* 1. p. 273.
 Habitat α. inter Salmersdorff & Weidling, β. circa Grin-
 zing, & Medling, alibique.

C Y P R I P E D I V M.

- I. CYPRIPEDIVM radicibus fibrosis, foliis ovato-lanceo-
 latis caulinis. *Linn. Sp. pl.* 951.
 Cypripedium foliis ovato lanceolatis. *Fl. Lapp.* 318.
 Calceolus Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 293.
 Calceolus marianus. *Dodon. pempt.* 180. f. 1. 2.
 Helleborine flore rotundo s. Calceolus. *Baub. pin.* 187.
 Elleborine recentiorum 1. *Clus. hist.* 1. p. 272.
 Habitat in Leytaberg, & ad Claustro-Neoburgum.

P E N T A N D R I A.

P A S S I F L O R A.

- I. PASSIFLORA foliis trilobis cordatis æqualibus obtusis gla-
 bris integerrimis. *Linn. Sp. pl.* 958.
 Passiflora foliis cordatis trilobis integerrimis glabris:
 lateribus angulatis. *Hort. Cliff.* 431.
 Passiflora foliis trilobis integerrimis: laciniis semiova-
 tis acutis integerrimis glabris. *Gron. Virg.* 112.

Clematis passionis triphyllus, flore luteo. *Moris. hist.*
1. p. 7. s. 1. t. 2.

Flos passionis minor, folio in tres lacinias non serratas
minus profundas diviso. *Sloan. jam. 104. hist. 1.*
p. 231.

Hospitatur hinc inde in hortis Viennæ æstate in apricariis,
hyeme in frigidariis.

PASSIFLORA foliis trilobis ferratis. *Linn. Sp. pl. 959.*

Passiflora foliis semitrifidis ferratis: basi duabus glan-
dulis convexis: lobis ovatis. *Hort. Cliff. 432. Roy.*
lugdb. 260. Gron. Virg. 112.

Granadilla hispanis, *Flos passionis italıs*. *Herm. met. 888.*
t. 888. *Raj. hist. 649.*

Clematis trifolia, flore roseo clavato. *Bauh. pin. 301.*

Clematis trifolia, f. *Flos passionis flore viridi*. *Moris.*
hist. 2. p. 6. s. 1. t. 1. f. 9.

Hospitatur hinc inde cum præcedente.

PASSIFLORA foliis palmatis integerrimis. *Linn. Sp. pl. 959.*

Granadilla pentaphyllos flore cæruleo magno. *Boerhaav.*
lugdb. 2. p. 81.

Clematis quinquefolia americana, seu *Flos passionis*.
Rob. ic.

Flos passionis major pentaphyllus. *Sloan. jam. 104. hist.*
1. p. 229. *Raj. supp. 339.*

Hospitatur cum præcedentibus, frequentius.

HEXANDRIA.

ARISTOLOGIA.

ARISTOLOGIA foliis cordatis, caule erecto, floribus axil-
laribus confertis. *Linn. Sp. pl. 962. Hort. Ups. 279.*

Aristolochia caule erecto simplicissimo, foliis cordatis
petiolatis, floribus lateralibus confertis. *Hort. Cliff.*
432. *Sauv. monsp. 111.*

Aristolochia multiflora Rivini. *Hall. Jen. Rupp. 249.*

Aristolochia Clematis recta. *Bauh. pin. 307.*

Aristolochia Clematis vulgaris. *Clus. hist. 2. p. 71.*

Aristolochia Saracenica. *Dodon. pempt. 326.*

Habitat in nemoribus insularum Danubialium passim, præser-
tim in Fischamentensibus.

POLYANDRIA.

ARVM.

1. ARVM foliis pedatis, foliolis lanceolatis integerrimis æquantibus spatham spadice longiorem. *Roy. lugdb.* 7
Linn. Sp. pl. 964.

Arum foliis palmatis: foliolis undecim lanceolatis integerrimis: intermediis majoribus, spadice clavato. *Hort. Cliff.* 344.

Dracunculus polyphyllus. *Baub. pin.* 195. *Moris. hist.* 3
p. 548. s. 13. t. 5. f. 46.

Dracontium. *Dodon. pempt.* 329.

Hospitatur in hortis Viennæ, præsertim in horto Ser. P. de Schwarzenburg æstate in apricario, hyeme in frigidario, vel caldario.

2. ARVM acaule, foliis peltatis ovatis repandis: basi semibifidis. *Linn. Sp. pl.* 965.

Arum maximum ægyptium quod vulgo Colocasiam
Baub. pin. 195.

Arum ægyptiacum. *Col. ecphr.* 2. p. 1. t. 1.

Colocasia. *Clus. hist.* 2. p. 75.

Hospitatur in plerisque hortis nobilium, præsertim Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach æstate in apricario, hyeme in frigidario, vel Caldario.

3. ARVM acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clavato. *Linn. Sp. pl.* 966.

Arum vulgare, non maculatum. *Baub. pin.* 195.

Arum. *Fuchs. hist.* 69. *Lobel. icon.* 597.

Habitat in sylvis circa Dornbach, Leytæpontum passim, copiose vero in illis montanis Baden inter & vetus Lembach in valle vulgo Clam dicta sitis.

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

DIANDRIA.

LEMNA.

1. LEMNA foliis petiolatis lanceolatis. *Linn. Sp. pl.* 970
Fl. Suec. 1000.

Lenticularia ramosa monorhiza, foliis oblongis pediculis longioribus donatis. *Mich. gen. 16. t. 11. f. 5.*

Lenticula aquatica trifulca. *Bauh. pin. 362.*

Hederula aquatica. *Lob. icon. 2. p. 36.*

Habitat in stagno danubiali ad viam regiam Nusdorffensem, in fossa mœnia Viennensia circumdante, ac circa Draskirchen.

2. *LEMNA* foliis sessilibus subtus utrinque planiusculis, radicibus solitariis. *Linn. Sp. pl. 970. Fl. Suec. 999.*

Lentibularia major monorhiza, foliis subrotundis utrinque viridibus. *Mich. gen. 16. t. 11. f. 3.*

Lens palustris. *Cam. epit. 852. Raj. ang. 3. p. 129. t. 4. f. 1.*

Lens palustris vulgaris. *Bauh. pin. 362.*

Habitat in fossis vallum Leytæpontanum cingentibus.

TRIANDRIA.

TYPHA.

1. *TYPHA* foliis subensiformibus, spica mascula femineaque approximatis. *Linn. Sp. pl. 971.*

Typha palustris major. *Bauh. pin. 20. Moris. hist. 3. p. 246. s. 8. t. 13. f. 1.*

Habitat in paludibus circa Leytæpontum, & in fossa civitatis Thulnensis extra monasterium monialium.

2. *TYPHA* foliis semicylindricis, spica mascula femineaque remotis. *Linn. Sp. pl. 971.*

Typha palustris media. *Moris. hist. 3. p. 246. s. 8. t. 13. f. 2.*

Habitat in paludibus circa Leytæpontum, & in piscinis inter Ladendorff, & Rusbach.

SPARGANIVM.

1. *SPARGANIVM* foliis erectis triquetris. *Linn. Sp. pl. 971.*

Sparganium foliis adsurgentibus triquetris. *Fl. Suec. 770.*

Sparganium ramosum. *Bauh. pin. 15. Theatr. 228.*

Platanaria seu Butomon. *Dodon. pempt. 601.*

Habitat in fossa Civitatis Thulnensis extra monasterium monialium.

ZE A.

1. *ZE A.* *Hort. Ups. 281.*

Fru-

Frumentum indicum Mays dictum. *Baub. pin. 5. Theatr.*
490.

Frumentum indicum. *Dodon. pempt. 509. Cam. epit. 186.*
Hospitatur ubique in hortis oleraceis, & fossis mœnia cingenti-
bus Leytæponti alibique.

C O I X.

1. *COIX* seminibus ovatis. *Linn. Sp. pl. 972.*

Lithospermum arundinaceum. Baub. pin. 258.

Lachryma Jobi. Clus. hist. 2. p. 216.

Hospitatur hinc inde, sub dio, in hortis curiosorum, præsertim
Fischamentæ in orto Dni. Vicarii, & Azkersdorffii in
orto Dni. Parochi.

C A R E X.

1. *CAREX* spica simplici dioica. *Linn. Sp. pl. 972. Fl. Suec.*
746.

Cyperoides parvum, caulibus & foliis tenuissimis, trian-
gularibus, spica longiore (& subrotunda) capsu-
lis oblongis. Mich. gen. 56. t. 32. f. 1. 2.

Gramen cyperoides minimum, spica simplici casta. Mo-
ris. hist. 3. p. 244. s. 8. f. ult. (mas) Scheuchz. gram.
497. t. 11.

Gramen cyperoides minimum, ranunculi capitulo sim-
plici asperiore rotundo. Moris. hist. 3. p. 245. s. 8.
t. 12. f. 36.

Habitat in pratis Leytæpontanis, præsertim in illo statim ex-
tra portam, quod canales aquam ad fontem in foro exstructum
ducentes transcurrunt.

2. *CAREX* spica composita, spiculis androgynis: inferiori-
bus remotioribus, foliolo longiori instructis, cul-
mo triquetro. *Linn. Sp. pl. 972.*

Carex maritima humilis, radice repente, caule trique-
tro, spica spadicea. Mich. gen. 67. t. 33. f. 4.

Gramen cyperoides spica simplici compressa disticha.
Scheuchz. gram. 498.

Gramen cyprioides minus repens, spica divisa. Loes.
pruss. 116. t. 31.

Habitat in arenosis pratis Latifontanis ad lacum Nischiterien-
sem sitis, multo sale ab incolis Ziek dicto scatentibus.

3. *CA-*

CAREX spica supradecomposita inferne laxiore: spiculis androgynis ovatis sessilibus glomeratis: superne masculis. *Linn. Sp. pl.* 973.

Carex palustris major, radice fibrosa, caule exquisite triangulari, spica brevi habitiore compacta. *Mich. gen.* 69. t. 33. f. 13. 14.

Gramen cyperoides palustre majus, spica compacta. *Baub. pin.* 6. *Moris. hist.* 3. p. 244. s. 8. t. 12. f. 14.

Habitat circa Latifontum in nemoribus paludosis.

CAREX spicis masculis pluribus, femineis subsessilibus, capsulis obtusiusculis. *Linn. Sp. pl.* 978.

Carex spicis erectis oblongis sessilibus alternis foliolo florali brevioribus: superioribus masculis. *Hort. Cliff.* 439. *Raj. lugdb.* 74.

α. Carex nigra verna vulgaris. *Fl. Lapp.* 330.

Gramen cyperoides, foliis caryophyllæis vulgatissimum. *Raj. hist.* 1292.

β. Carex spicis masculis superioribus numerosis femineis inferioribus: intermedia unica androgyna. *Roy. lugd.*

Carex maxima spicis plurimis remotis longis. *Fl. Lapp.* 329.

Cyperoides foliis caryophyllæis, spicis habitioribus: squamis cūrtis. *Mich. gen.* 62. t. 32. f. 12.

Cyperoides latifolium spica ruffa s. caule triangulo. *Scheuchz. gram.* 458.

Gramen cyperoides spica ruffa, seu caule triangulo. *Baub. pin.* 6.

Habitat *α. circa Dornbach, ad viam regiam Nusdorffensem, & præsertim circa Sacellum S. Brigittæ in Tabor. β. copiose ad viam regiam Minckendorffensem, in fossa, alibi- que in aquosis.*

TETRANDRIA.

BETULA.

BETULA foliis ovatis acuminatis serratis. *Linn. Sp. pl.* 932.

Betula foliis cordatis serratis. *Fl. Lapp.* 341.

Betula. *Baub. pin.* 427. *Cam. epit.* 69.

Habitat in nemoribus insularum danubialium, & in sylvis inter Dornbach & Weidling sitis, alibi- que passim.

2. BETULA pedunculis ramosis. Linn. Sp. pl. 983.

Alnus. Fl. Lapp. 340. Fl. Suec. 775.

α. Alnus rotundifolia glutinosa viridis. Baub. pin. 428.

Alnus. Cam. epit. 68. Læsel. pruss. 10. t. 1.

β. Alnus folio incano. Baub. pin. 428.

Alnus incana, & hirsuta. Baub. hist. 1. p. 154.

Habitat α. & β. promiscue in nemoribus danubialibus, præsertim Fischamentæ.

B V X V S.

1. BUXUS. Hort. Ups. 283.

α. Buxus arborescens. Baub. pin. 471.

Buxus. Dodon. pempt. 782.

β. Buxus humilis. Dodon. pempt. 782.

Buxus foliis rotundioribus. Baub. pin. 471.

Hospitatur α. sub dio in hortis Viennensibus præsertim in hortu Dni. Gansl ad ecclesiam Sti. Caroli sito. β. passim in hortis, sub dio, areolas cingens præsertim Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

V R T I C A.

1. VERTICA foliis oppositis, amentis fructiferis globosis. Linn. Sp. pl. 983.

Urtica urens pilulas ferens. Baub. pin. 232.

Urtica I. Dioscoridis semine lini. Dodon. mem. 4. p. 323.

Urtica romana. Lob. icon. 522.

Hospitatur in hortis curiosorum sub dio.

2. VERTICA foliis oppositis ovalibus. Linn. Sp. pl. 984.

Urtica androgyna foliis ovalibus. Fl. Suec. 773.

Urtica foliis ovatis, amentis cylindraceis androgynis. Fl. Lapp. 375. Hall. helv. 178.

Urtica urens minor. Baub. pin. 232.

Urtica urens minima. Dodon. pempt. 152.

Habitat ubique fere in cultis.

3. VERTICA foliis oppositis cordatis, racemis geminis. Linn. Sp. pl. 984.

Urtica dioica, foliis oblongo cordatis. Fl. Suec. 774. Hall. helv. 177.

Urtica foliis cordatis, amentis cylindraceis, sexu distincta. Fl. Lapp. 374.

Urtica urens maxima. Baub. pin. 232.

Urtica urens altera. Dodon. pempt. 151.

Habitat ubique in ruderatis.

M O R V S.

1. *MORVUS* foliis oblique cordatis lævibus. *Hort. Ups. 283.*

Morus fructu albo. Baub. pin. 459.

Morus candida. Dodon. pempt. 810.

Hospitatur, sub dio, in hortis plerisque, & nunc etiam in campis.

2. *Morus* foliis cordatis scabris. *Linn. Sp. pl. 986.*

Morus foliis cordatis hispidis. Hort. Ups. 283.

Morus fructu nigro. Baub. pin. 459.

Morus. Dodon. pempt. 810.

Hospitatur passim in hortis, sub dio.

P E N T A N D R I A.

X A N T H I V M.

1. *XANTHIUM* caule inermi. *Linn. Sp. pl. 987. Fl. Suec. 778.*

Xanthium. Fuchs. hist. 579. Dodon. pempt. 39.

Lappa minor f. Xanthium dioscoridis. Baub. pin. 198.

Habitat ad danubium in suburbio Viennensi Leopoldino, in Tabor parte orientali, & Leytæponti in Scrobibus, ubi exaruerunt, statim trans pontem lapideum secundum.

A M A R A N T H V S.

1. *AMARANTHUS* capitellis triandris subrotundis amplexicaulibus, foliis lanceolatis acuminatis. *Linn. Sp. pl. 989.*

Amaranthus capitulis subrotundis lateralibus, foliis lanceolatis acuminatis. Hort. Ups. 286. Roy. lugdb. 419.

Amaranthus folio variegato. Baub. pin. 121.

Amaranthus tricolor. Lob. icon. 252.

Hospitatur in hortis sub dio præsertim Leytæponti in horto Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach.

2. *AMARANTHUS* capitellis triandris subrotundis sessilibus, foliis lanceolatis sparsis. *Linn. Sp. pl. 989.*

AMARANTHUS folio variegato C. B. colore obscuriori, f. mas. *Tournef. inst. 236.*

*Amaranthus verticillatus melancholicus, macula nigra
in medio foliorum infectus. Pluk alm. 27.*

Hospitatur in hortis sub dio cum priore.

3. *AMARANTHVS* floribus glomeratis lateralibus, foliis ovatis retusis, caule diffuso. *Linn. Sp. pl. 990.*

Amaranthus foliis ovatis emarginatis. Fl. Suec. 779.

Blitum album minus. Baub. pin. 118. Cam. epit. 236.

Habitat hinc inde inter olera, & in hortorum areolis præsertim Leytæponti.

4. *AMARANTHVS* racemis pentandris cylindricis longissimis. *Linn. Sp. pl. 990. Hort. Ups. 285.*

Amaranthus maximus. Baub. pin. 120.

Blitum majus peruvianum. Clus. hist. 2. p. 81.

Hospitatur hinc inde in hortis sub dio.

P O L Y A N D R I A.

CERATOPHYLLVM.

1. *CERATOPHYLLVM. Linn. Sp. pl. 992. Fl. Suec. 783.*

Hydroceratophyllum folio aspero quatuor cornibus armato. Vaill. aët. 1719. p. 21. t. 2. f. 2.

Equisetum sub aqua repens, foliis bifurcis. Læfcl. pruss. 67. t. 12.

Habitat in fossis Neapolis Austriae, Civitatis Thulnensis & Viennæ ad portam novam.

M Y R I O P H Y L L V M.

1. *MYRIOPHYLLVM* floribus omnibus verticillatis. *Linn. Sp. pl. 992. Fl. Suec. 782.*

Myriophyllum aquaticum minus. Clus. hist. 2. p. 252.

Millefolium aquaticum foliis ad foliorum nodos. Baub. pin. 141.

Habitat Leytæponti ad rivulum Steinbachl in inundatis alibi que circa molas.

S A G I T T A R I A.

1. *SAGITTARIA* foliis sagittatis acutis. *Linn. Sp. pl. 344. Fl. Suec. 780.*

Sagitta minor. Dodon. pempt. 588.

Sagitta aquatica minor latifolia. *Bauh. pin. 194.*
 Habitat in stagno danubiali ad viam regiam Nusdorffensem
 sito, & circa Ebersdorff.

P O T E R I V M.

POTERIVM inerme, caulibus subangulosis. *Linn. Sp. pl.*
 994.

Poterium inerme filamentis longissimis. *Roy. lugdb. 129.*

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta. *Bauh. pin. 160.*

Pimpinella sanguisorba. *Cam. epit. 777.*

Habitat copiose in vallo suburbico Viennensi inter portam
 Hernalsensem, & Waringensem, alibique in asperis passim.

Q V E R C V S.

QVERCVS foliis deciduis oblongis superne latioribus: si-
 nubus acutioribus; angulis obtusis. *Linn. Sp. pl.*
 996.

Quercus cum longo pediculo. *Bauh. pin. 420.*

Quercus. *Fuchs. hist. 229. Læfcl. pruss. 211. t. 69.*

Habitat passim in omnibus fere sylvis, præsertim in Dornba-
 censibus, Burckersdorffensibus, Petersdorffensibus, &
 Leytæpontanis.

QVERCVS foliis ovato oblongis glabris serrato repandis.
Linn. Sp. pl. 996.

Quercus calyce echinato, glande majore. *Bauh. pin. 420.*

Ægilops sive cercis majore glande. *Dodon. pempt. 831.*

Habitat in sylvula dicta Gatterhölzl.

J V G L A N S.

JUGLANS foliolis ovalibus glabris subserratis subæquali-
 bus. *Linn. Sp. pl. 997.*

Nux juglans s. regia vulgaris. *Bauh. pin. 417.*

Nux juglans. *Dodon. pempt. 816.*

β. Nux juglans fructu maximo. *Bauh. pin. 417.*

Hospitatur sub dio ubique in hortis, vineis, & ad pagos. β.
 præsertim in horto Rohravienfi Excellentissimi Comitis
 Caroli ab Harrach.

F A G V S.

FAGVS foliis lanceolatis acuminato - serratis subtus nudis,
Linn. Sp. pl. 997.

Castanea sylvestris. Baub. pin. 419.

Castanea. Cam. epit. 118.

β. *Castanea sativa.* Baub. pin. 418.

Habitat in montibus circa Latifontum. β. in hortis & vineis ibidem.

2. *FAGUS* foliis ovatis obsolete ferratis. Linn. Sp. pl. 998.
Fl. Suec. 785.

Fagus. Baub. pin. 419. Cam. epit. 112.

Habitat ubique fere in sylvis circa Viennam, & Leytæpontum.

CARPINVS.

1. *CARPINVS* squamis strobulorum planis. Linn. Sp. pl. 998.

Carpinus. Dodon. pempt. 841. Cam. epit. 71.

Ostrya ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis.
Baub. pin. 427.

Habitat passim in sylvis & nemoribus, hortorumque ambulacris, præsertim circa Leytæpontum.

CORYLV S.

1. *CORYLV S* stipulis ovatis obtusis. Linn. Sp. pl. 998.

Corylus sylvestris. Baub. pin. 418.

Avellana nux sylvestris. Fuchs. hist. 398.

β. *Corylus sativa* fructu oblongo rubente. Baub. pin. 418.

Habitat ubique fere in sylvis & nemoribus præsertim in saltibus Leytæpontanis. β. passim in hortis.

MONADELPHIA.

PINVS.

1. *PINVS* foliis geminis: primordialibus solitariis glabris.
Linn. Sp. pl. 1000.

Pinus sylvestris. Baub. pin. 491.

Habitat ubique in sylvis glareosis, retro Neapolim Austriæ, & Scotto - Viennam præsertim.

2. *PINVS* foliis fasciculatis obtusis. Linn. Sp. pl. 1001.

Abies foliis fasciculatis obtusis. Hort. Cliff. 450.

Larix folio deciduo, conifera. Baub. hist. r. p. 265.

Larix. Baub. pin. 493. Dodon. pempt. 668. Cam. epit. 45. 46.

Habitat ubique in sylvis montanis Stirix vicinis, præsertim Breininis.

3. *PI-*

3. *PINVS* foliis solitariis emarginatis. *Linn. Sp. pl.* 1001.
Abies foliis solitariis apice emarginatis. *Hort. Cliff.* 449.
Abies Taxi folio, fructu sursum spectante. *Tournef.* 585.
Abies conis sursum spectantibus s. mas. *Baub. pin.* 595.
Abies fœmina s. *Elate teleja*. *Baub. hist.* 1. p. 231.
 Habitat cum præcedentibus in dictis sylvis, & retro Baden, ac
 Scotto - Viennam.
4. *PINVS* foliis subulatis mucronatis lævibus bifariam ver-
 sis. *Linn. Sp. pl.* 1002.
Abies foliis solitariis apice acuminatis. *El. Suec.* 789.
Picea. *Cam. epit.* 47.
 Habitat ubique cum præcedentibus.

T H V J A.

1. *THVJA* strobulis lævibus: squamis obtusis. *Linn. Sp. pl.*
 1002. *Hort. Ups.* 289.
Thuja *Theophrasti*. *Baub. pin.* 488.
Arbor vitæ. *Clus. hist.* 1. p. 36. *Dodon. pempt.* 858.
 Hospitatur sub dio in horto olim *Favoritæ Videntis*, nunc
Gymnasii Theresiani.

C V P R E S S V S.

1. *Cupressus* foliis imbricatis, frondibus quadrangulis. *Linn.*
Sp. pl. 1002.
Cupressus foliis imbricatis erectis. *Hort. Ups.* 288.
Cupressus. *Baub. pin.* 488. *Cam. epit.* 52.
 Hospitatur passim in hortis nobilium æstate in apricariis, hye-
 me in frigidariis, præsertim *Rohraviæ* in horto *Excellen-*
tissimi Comitis Caroli ab Harrach.

R I C I N V S.

1. *RICINVS*. *Linn. Sp. pl.* 1007.
Ricinus foliis peltatis ferratis: petiolatis glanduliferis.
Hort. Ups. 289.
Ricinus vulgaris. *Baub. pin.* 439.
Ricinus gallis *Palma Christi*. *Lob. hist.* 392.
 Hospitatur passim in hortis sub dio.

SYNGENESIA.

MOMORDICA.

1. MOMORDICA pomis angulatis tuberculatis, foliis glabris
 patenti palmatis. *Linn. Sp. pl. 1009. Hort. Ups. 293.*
Balsamina rotundifolia repens f. mas. Bauh. pin. 306.
Charantia. Dodon. pempt. 670.

Hospitatur passim ante fenestras, & in hortis sub dio.

2. MOMORDICA pomis angulatis tuberculatis, foliis villosis
 longitudinaliter palmatis. *Hort. Cliff. 457 Fl. Zeyl.*
351. Roy. Lugdb. 262. Sp. pl. 1009.

Balsamina cucumerina indica, fructu majore flavescen-
te. Comm. hort. 1. p. 103. t. 54.

Pandipavel. Rheed. mal. 8. p. 17. t. 9.

Hospitatur sub dio in horto Leytæpontano Excellentissimi
Comitis Ernesti ab Harrach.

3. MOMORDICA pomis hispidis, cirrhis nullis. *Linn. Sp. pl.*
1010.

Momordica absque cirrhis. Hort. Ups. 294.

Momordica pomis ovalibus hispidis, foliis cordatis in-
tegris plicato-dentatis. Hort. Cliff. 451. Roy. lugdb.
262.

Cucumis sylvestris asininus dictus. Bauh. pin. 314.

Cucumis sylvestris. Cam. epit. 946.

Elaterium Rivini, & officinarum. Hall. Jen. Rupp. 46.

Habitat in area horti Leytæpontani Excellentissimi Comi-
tis Ernesti ab Harrach, in qua citri majores æstivo tempo-
re apriantur, sicut etiam in horto Domini Gansl Viennæ
in platea ad ecclesiam Sti. Caroli Borromæi sito, alibique in
ruderatis, & inter hortorum quisquilias.

CUCURBITA.

1. CUCURBITA foliis subangulatis tomentosis basi subtus
 biglandulosis, pomis lignosis. *Linn. Sp. pl. 1010.*

Cucurbita seminibus obsolete bicornibus. Hort. Ups. 291.

Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. Bauh. pin.
313.

Cucurbita lagenaria, flore albo. Moris. hist. 2. p. 23. s. 1.
t. 5. f. 3.

Hospitatur ubique fere in hortis oleraceis, præsertim Viennæ,
& in horto Rohravienfi Excellentissimi Comitis Caroli
ab Harrach.

2. Cv.

2. *CUCURBITA* foliis lobatis, pomis lævibus. *Linn. Sp. pl.*
1010.

Cucurbita seminum margine tumido. *Hort. Ups.* 291.

Cucurbita major rotunda, flore luteo, folio aspero.

Bauh. pin. 213.

Cucurbita indica rotunda. *Dalech. hist.* 616.

Hospitatur sub dio ubique in hortis, vineis, & pomariis rusticorum.

3. *CUCURBITA* foliis lobatis, pomis nodoso verrucosis.
Linn. Sp. pl. 1010.

Cucurbita verrucosa. *Bauh. hist.* 2. p. 222.

Melopepo verrucosus. *Tournef. inst.* 106.

Hospitatur sub dio in horto Leytæpontano Excellentissimi Comitum Ernesti ab Harrach, alibique.

4. *CUCURBITA* foliis multipartitis. *Linn. Sp. pl.* 1010. *Hort.*
Ups. 292.

Cucurbita seminum margine basi dilatato. *Hort. Cliff.*
452. *Roy. lugdb.* 264.

Anguria *Citrullus* dicta, *Bauh. pin.* 312.

Citrullus folio colocynthis secto, semine nigro. *Bauh.*
hist. 2. p. 235.

Hospitatur hinc inde in hortis, præsertim Leytæponti in horto Excellentissimi Comitum Ernesti ab Harrach, sub dio quidem sed vel substrato fimo, vel in vaporario.

CUCUMIS.

1. *CUCUMIS* foliis multifidis, pomis globosis glabris. *Linn.*
Sp. pl. 1011. *Hort. Ups.* 293.

Cucumis foliis multifidis. *Roy. lugdb.* 263.

Colocynthis, fructu rotundo, major. *Bauh. pin.* 313.

Colocynthis. *Cam. epit.* 982.

Hospitatur in horto Leytæpontano Excellentissimi Comitum Ernesti ab Harrach; sata quidem in vaporario, sed transplantata sub dio.

2. *CUCUMIS* foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis.
Linn. Sp. pl. 1011. *Hort. Ups.* 292.

Melo vulgaris. *Bauh. pin.* 310.

Melo. *Bauh. hist.* 2. p. 242.

Hospitatur ubique in hortis vel sub dio, vel in vaporariis.

3. *CUCUMIS* foliorum angulis rectis, pomis oblongis scabris. *Linn. Sp. pl.* 1012. *Hort. Ups.* 292.

Cucumis sativus vulgaris. *Baub. pin.* 310.
 Cucumis vulgaris. *Dodon. pempt.* 662.
 Hospitatur ubique in hortis oleraceis sub dio.

B R Y O N I A.

1. BRYONIA foliis palmatis utrinque calloso scabris. *Linn. Sp. pl.* 1012. *Fl. Suec.* 790.
 Bryonia alba, baccis nigris. *Baub. pin.* 297.
 Vitis alba, baccis nigris. *Fuchs. hist.* 94. *Cam. epit.* 987.
 Habitat passim ad pagos, & sèpes.

CLASSIS XXII.

D I O E C I A
 DIANDRIA.

S A L I X.

1. SALIX foliis ferratis ovatis acutis glabris: ferrati-
 tilagineis, petiolis calloso-punctatis. *Linn. Sp. p.*
 Salix sativa lutea, folio crenato. *Baub. pin.* 473.
 Habitat Leytæponti in fruticeto, inter hortum oleraceum, &
 hortum phasianorum Excellentissimi Comitis Ernesti ab
 Harrach ad ripam Leytæ, alibique ad pagos, & in hortis
 rusticorum ad aquas sitis.
2. Salix foliis ferratis glabris lanceolatis petiolatis, stipulis
 trapeziformibus. *Linn. Sp. pl.* 1016.
 Salix foliis ferratis glabris acuminatis appendiculatis.
Fl. Lapp. 349.
 Salix folio amygdalino utrinque virente aurito. *Baub.*
pin. 43.
 Salix folio auriculato splendente flexilis. *Raj. Syn.* 3.p. 448.
 Salix persicæ folio auriculato. *Hall. helv.* 151. n. 2.
 Salix purpurea nigra viminalis. *Dalech. hist.* 276.
 Habitat ad pagos, rivulorum ripas, & in nemoribus insularum
 Danubialium passim.
3. SALIX foliis integerrimis lanceolato-linearibus stric-
 tessilibus subtus tomentosis. *Linn. Sp. pl.* 1020.
 Salix humilis angustifolia. *Baub. pin.* 474.

*Salix humilis repens angustifolia. Lob. icon. 2. p. 137.
Baub. hist. 1. p. 214.*

Habitat ad pedem montis supra Burckersdorff ex quo primus rivulus in torrentem Viennensem fluit, alibique.

4. *SALIX* foliis subintegerrimis lanceolato-linearibus longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis. *Linn. Sp. pl. 1021.*

Salix foliis undulatis lineari-lanceolatis subtus tomentosis. Roy. lugdb. 84.

Salix folio longissimo angustissimo utrinque albido. Baub. pin. 474.

Salix folio longissimo. Raf. angl. 3. p. 450.

Salix angustis & longissimis foliis crispis: subtus albicantibus. Baub. hist. 1. p. 212.

Habitat in nemoribus insularum danubialium passim.

5. *SALIX* foliis lanceolatis acuminatis ferratis utrinque pubescentibus: ferraturis infimis glandulosis. *Linn. Sp. pl. 1021.*

Salix foliis elliptico-lanceolatis ferratis subtus sericeis vimine fragili. Hall. helv. 152.

Salix vulgatis alba arborescens. Baub. pin. 473.

Habitat passim ad pagos; in saliceto supra suburbium Viennense Rossau dicto; & in nemoribus insularum danubialium, alibique.

TRIANDRIA.

EMPETRUM.

1. *EMPETRUM* procumbens. *Linn. Sp. pl. 1022.*

Empetrum. Fl. lapp. 379.

*Empetrum montanum, fructu nigro. Tournef. inst. 579.
Boerhaav. lugdb. 2. p. 173.*

Empetrum montanum procumbens. I. R. H. Hall, Jen. Rupp. 337.

Erica baccifera procumbens nigra. Baub. pin. 486.

Erica baccifera Mathioli. (154.) Baub. hist. 1. p. 526.

Erica baccifera. Clus. pan. 29.

Erica coris folio XI. Clus. hist. 1. p. 45.

Habitat in Schneeberg ad præcipitium septentrionem respiciens, & proxime ad principium pineti; sed minus frequens, sæpius in alpe Wexel.

TETRANDRIA.

VISCVM.

- I. VISCVM foliis lanceolatis, caule dichotomo, spicis axillaribus. *Linn. Sp. pl.* 1023.
 Viscum. *Fl. Suec.* 816.
 Viscum baccis albis. *Baub. pin.* 423.
 Viscum. *Cam. epit.* 555.
 Habitat ubique in sylvis in variis arboribus.

SPINACIA.

- I. SPINACIA. *Linn. Sp. pl.* 1027. *Hort. Ups.* 296.
 Spinacia mas. *Dalech. hist.* 543.
 Spinacia femine spinoso. *Moris. hist.* 2. p. 598.
 Lapathum hortense f. spinacia femine spinoso. *Baub. pin.* 114.
 Spinacia fœmina. *Dalech. hist.* 543.
 β. Lapathum hortense f. spinacia femine non spinoso. *Baub. pin.* 115.
 Hospitatur ubique in hortis oleraceis sub dio.

CANNABIS.

- I. CANNABIS. *Linn. Sp. pl.* 1027.
 Cannabis sativa. *Baub. pin.* 320.
 Cannabis mas. *Dalech. hist.* 497.
 Cannabis erratica. *Baub. pin.* 320.
 Cannabis fœmina. *Dalech. hist.* 497.
 Habitat ubique in arvis circa Leytæpontum.

HVMVLVS.

- I. HVMVLVS. *Linn. Sp. pl.* 1228.
 Lupulus mas. *Baub. pin.* 298.
 Lupulus salictarius. *Fuchs. hist.* 124.
 Lupulus fœmina. *Baub. pin.* 298. *Cam. epit.* 254.
 Habitat passim in nemoribus insularum danubialium, & in sepibus.

OCTANDRIA.

POPVLVS.

- I. POPVLVS foliis subrotundis dentato - angulatis subtus tomentosis. *Linn. Sp. pl.* 1034. *Fl. Suec.* 820.

Populus alba majoribus foliis. *Bauh. pin.* 429.

Populus alba. *Dodon. pempt.* 835.

Habitat ubique in nemoribus insularum danubialium.

2. *POPVLVS* foliis subrotundis dentato - angulatis utrinque glabris. *Linn. Sp. pl.* 1034. *Fl. Suec.* 819.

Populus tremula. *Bauh. pin.* 429.

Populus lybica. *Dodon. pempt.* 836.

Habitat in nemoribus insularum danubialium cum præcedente.

3. *POPVLVS* foliis deltoidibus acuminatis ferratis. *Linn. Sp. pl.* 1034. *Fl. Suec.* 821.

Populus nigra. *Bauh. pin.* 429. *Dodon. pempt.* 836.

Habitat in omnibus insularum danubialium nemoribus cum præcedentibus, alibique juxta aquas passim.

R H O D I O L A.

1. *RHODIOLA.* *Linn. Sp. pl.* 1035. *Fl. Suec.* 831. *Fl. Lapp.* 379.

Rhodia radix. *Bauh. pin.* 286. *Clus. hist.* 2. p. 65. *Raj. hist.* 690. *Bauh. hist.* 3. p. 683.

Rosea Rivini. *Hall. Jen. Rupp.* 91.

Telephium luteum minus, radice rosam redolente. *Morris. hist.* 3. p. 468. s. 12. t. 10. f. 8.

Anacampteros radice rosam spirante major. *Tournef. inst.* 264. *Boerhaav. lugdb.* 1. p. 289.

Habitat copiose in scopulis jugi Durrenstein, in alpe Breinina, aliisque minus frequens.

Hospitatur inde eruta in hortulo meo sub dio.

ENNEANDRIA.

M E R C V R I A L I S.

1. *MERCVRIALIS* caule simplicissimo, foliis scabris. *Linn. Sp. pl.* 1035. *Fl. Suec.* 823.

Mercurialis montana testiculata. *Bauh. pin.* 122.

Cynocrambe mas. *Cam. epit.* 999.

Mercurialis montana spicata. *Bauh. pin.* 122.

Cynocrambe fœmina. *Cam. epit.* 999.

Habitat in monte Cecio seu Kalenberg ad fossam, circa Dornbach, alibique in nemorosis montanis.

MERCVRIALIS caule brachiato, foliis glabris. *Linn. Sp. pl.* 1035. *Hort. Ups.* 298.

Mercurialis testiculata mas. *Baub. pin.* 121.

Mercurialis mas. *Dodon. pempt.* 658.

Mercurialis spicata, f. *fœmina*. *Dodon. pempt.* 658.

Habitat ubique in cultis, vineis, arvis, & hortis oleraceis.

MONADELPHIA.

JVNIPERVS.

1. *JVNIPERVS* foliis oppositis erectis decurrentibus: oppositionibus pyxidatis. *Linn. Sp. pl.* 1039.

Juniperus foliis inferne adnatis: oppositionibus concatenatis. *Hort. Ups.* 299.

Sabina folio cupressi. *Baub. pin.* 487.

Sabina. *Dodon. pempt.* 854.

Hospitatur in hortis sub dio.

2. *JVNIPERVS* foliis ternis patentibus mucronatis. *Linn. Sp. pl.* 1040. *Fl. Suec.* 824.

Juniperus vulgaris fruticosa. *Baub. pin.* 488.

Habitat ubique in pascuis siccis, sylvis, & ad illarum principia.

TAXVS.

1. *TAXVS* foliis approximatis. *Linn. Sp. pl.* 1040.

Taxus. *Fl. Suec.* 825.

Taxus. *Baub. pin.* 505. *Cam. epit.* 840. *Dodon. pempt.* 859.

Hospitatur passim in hortis ad topiaria inseruiens sub dio.

SYNGENESIA.

RVSCVS.

1. *RVSCVS* foliis supra floriferis nudis. *Linn. Sp. pl.* 1041. *Hort. Ups.* 300.

Ruscus myrtifolius aculeatus. *Tournef. inst.* 79.

Ruscus. *Baub. pin.* 470.

Ruscum. *Dodon. pempt.* 744.

Hospitatur æstate sub dio in hortulo botanico fratris Honorii apud FFr. Misericordiæ in suburbio Viennensi Leopoldino, hyeme in cubiculo frigidarii loco.

2. *RVSCVS* foliis subtus floriferis sub foliolo. *Linn. Sp. pl.* 1041. *Hort. Ups.* 300.

Laurus alexandrina, fructu pediculo insidente. *Bauh.*
pin. 304.

Hypoglossum Dioscoridis, laurotaxa Plinii. *Col. ecpbr.*
i. p. 166. *t.* 165. *f.* 2.

Uvularia officinarum.

Habitat copiose in monte imminente oppido vulgo *St. Jürgen*,
 dicto tribus a *Posoniensi* urbe milliaribus, & in montibus um-
 brosis *Latifonti*, sed rarissime.

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA

MONOECIA.

MUSA.

MUSA spadice nutante. *Linn. Sp. pl.* 1043.
 Musa racemo simplicissimo. *Hort. Ups.* 301.

Musa Cliffortiana. *Linn. mus. i. t.* 1.

Musa. Clus. exot. 229.

Ficus indica, fructu racemoso, folio oblongo. *Bauh.*
pin. 508.

Palma humilis, longis latisque foliis. *Bauh. pin.* 107.

Hospitatur in caldario horti *Viennensis* *S. P. de Schwarzenberg*.

VERATRUM.

VERATRUM racemo supradecomposito, corollis erectis.
Linn. Sp. pl. 1045.

Veratrum caule ramoso. *Mat. med.* 471.

Veratrum pedunculis corolla erecta patente brevioribus.
Gmel. sib. i. p. 75.

Helleborus albus, flore subviridi. *Bauh. pin.* 186.

Elleborus albus, exalbido flore. *Clus. hist. i. p.* 274.

Habitat in prato antequam *Buchbergam* perveniatur, in *Schneeberg*, & *Wexel* passim, copiose autem in alpe *Breinina*.

VERATRUM racemo composito, corollis patentissimis.
Linn. Sp. pl. 1045.

Veratrum pedunculis corolla patentissima longioribus.
Gmel. fib. 1. p. 76.

Helleborus albus flore atro rubente. *Baub. pin. 186. Morris. hist. 3. p. 485. s. 12. t. 4. f. 1.*

Habitat hinc inde in sylvis cædis, copiose autem in montibus Medlingensibus.

H O L C V S.

1. *HOLCVS* glumis villosis, seminibus aristatis. *Linn. Sp. pl. 1047. Hort. Ups. 301.*

Holcus glumis glabris. *Hort. Cliff. 468.*

Milium arundinaceum, subrotundo semine, sorgho nominatum. *Baub. pin. 26.*

Melica f. *Sorghum*. *Dodon. pempt. 508.*

Hospitatur sub dio in horto Rohravienſi Excellentissimi Comitſ Caroli ab Harrach.

2. *HOLCVS* glumis bifloris villosis: hermaphrodito - muticis, masculo arista recurva. *Linn. Sp. pl. 1048.*

Aira foliis pubescentibus, panicula contracta: flosculo hermaphrodito mutico, masculo arista uncinata, calyce brevior. *Fl. Suec. 67.*

Gramen pratense paniculatum molle. *Baub. pin. 2. prodr. 3. Theatr. 21. Scheuchz. gram. 234.*

Gramen lanatum. *Dalech. hist. 425.*

Habitat passim in pascuis, & pratis ad fluvium Leytam sitis.

V A L A N T I A.

1. *VALANTIA* floribus masculis quadrifidis, pedunculis di-
 phyllis. *Linn. Sp. pl. 1052. Hort. Ups. 303.*

Galium foliis quaternis, flosculis in alis confertis.
Hort. Cliff. 34. Hall. helv. 462.

Cruciata hirsuta. *Baub. pin. 335.*

Cruciata. *Dodon. pempt. 357.*

Habitat in valle Döblingensi, & Breinina, circa Nusdorff, Dornbach, & Leytæpontum, alibique in dumetis pomariis, & ad sepes passim.

P A R I E T A R I A.

1. *PARIETARIA* foliis lanceolato - ovatis alternis. *Linn. Sp. pl. 1052. Hort. Ups. 302.*

Parie-

Parietaria officinarum, & Dioscoridis. *Baub. pin.* 121.

Parietaria. *Dodon. pempt.* 102.

Helxine. *Cam. epit.* 849.

Habitat in Brader, Tabor, aliisque insularum danubialium nemoribus, ad mœnia Civitatis Thulnensis danubium respicientia, alibique in ruderatis.

A T R I P L E X.

. ATRIPLEX caule erecto herbaceo, foliis triangularibus. *Linn. Sp. pl.* 1053. *Hort. Ups.* 303.

Atriplex hortensis alba s. pallide virens. *Baub. pin.* 119.

Atriplex hortensis. *Dodon. pempt.* 615.

Habitat inter olera passim.

. ATRIPLEX caule herbaceo: valvulis femineis magnis deltoideis sinuatis. *Linn. Sp. pl.* 1053. *Fl. Suec.* 827.

Atriplex sylvestris folio hastato s. deltoide. *Raj hist.* 192.

Atriplex sylvestris annua, folio deltoide triangulari sinuato, & mucronato hastæ cuspidis simili. *Moris. hist.* 2. p. 607. s. 5. t. 32. f. 14.

Habitat in cœmeterio ecclesiæ metropolitanæ Viennensis, alibique in fossis.

. ATRIPLEX caule herbaceo patulo, foliis subdeltoideo-lanceolatis, calycibus seminum disco dentatis. *Linn. Sp. pl.* 1053.

Atriplex caule herbaceo foliis superioribus lanceolatis integerrimis. *Hort. Cliff.* 469. *Roy. lugdb.* 218.

Atriplex caule herbaceo, valvulis femineis seminum disco dentatis. *Fl. Suec.* 828.

Atriplex angusto oblongo folio. *Baub. pin.* 219.

Atriplex sylvestris, polygoni s. helxines foliis. *Lob. icon.* 257.

Habitat in vallo suburbico Viennensi ad Nosocomium ad St. Marcum, alibique passim in cultis, & ruderatis.

A C E R.

ACER foliis quinquelobis inæqualiter serratis, floribus racemosis. *Linn. Sp. pl.* 1054.

Acer foliis quinquelobis acutis obtuse serratis, petiolis canaliculatis. *Hort. Ups.* 93.

Acer foliis palmatis obtuse serratis, floribus subapetalis racemosis. *Hort. Cliff.* 143.

Acer

Acer montanum candidum. *Baub. pin. 430.*

Acer major. *Dodon. pempt. 840.*

Habitat in sylvis montanis circa Dornbach, Latifontum, Petersdorff, Burckersdorff, Murobadium, alibique.

2. *ACER* foliis quinquelobis acuminatis acute dentatis glabris, floribus corymbosis. *Linn. Sp. pl. 1055. Fl. Suec. 303.*

Acer foliis palmatis acute dentatis, floribus corollatis dichotomo-corymbosis. *Hort. Cliff. 143.*

Acer montanum tenuissimis, & acutissimis foliis. *Baub. pin. 431.*

Acer major. *Cam. epit. 63.*

Acer montanum, Orientalis platani foliis atrovirentibus. *Pluk. alm. 7. t. 252. f. 1.*

Habitat in montibus supra Petersdorff, & Medling, valisque Breininæ, & alibi.

3. *ACER* foliis lobatis obtusis emarginatis. *Linn. Sp. pl. 1055.*

Acer foliis tripartito-palmatis: laciniis utrinque emarginatis obtusis, cortice sulcato. *Hort. Cliff. 147.*

Acer foliis semitrilobis, lobis obtuse incisis. *Hall. helv. 212.*

Acer campestre & minus. *Baub. pin. 431.*

Acer minor. *Dodon. pempt. 840.*

Habitat circa Dornbach, Burckersdorff, in monticulo regio Fischamentam inter & Enzersdorff sito, alibique passim in sylvis, & ad sepes.

D I O E C I A.

F R A X I N V S.

1. *FRAXINUS* foliolis ferratis, floribus apetalis. *Linn. Sp. pl. 1057.*

Fraxinus floribus nudis. *Fl. Suec. 830.*

Fraxinus excelsior. *Baub. pin. 416.*

Fraxinus. *Dodon. pempt. 833.*

Habitat in valle Döblingensi, in monticulo regio Enzersdorffensi, circa Neapolim Austriæ, Novemque ecclesias in borto phasianorum Leytæpontano, & Rohravienfi alibique.

POLYOECIA.

FICVS.

FICVS foliis palmatis. *Linn. Sp. pl. 1059. Hort. Ups. 305.*

Ficus communis. *Baub. pin. 457.*

Ficus. *Dodon. pempt. 412.*

Hospitatur passim in hortis æstate sub dio: hyeme asseribus, & fimo tecta, rarius hyberno tempore in frigidariis.

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA

FILICES.

EQVISETVM.

EQVISETVM caule spicato, frondibus compositis. *Linn. Sp. pl. 1061. Fl. Suec. 834.*

Equisetum fetis ramosis intermedio multoties longioribus. *Roy. lugdb. 496.*

Equisetum sylvaticum. *Fl. Lapp. 391. Tabern. hist. 562.*

Equisetum sylvaticum tenuissimis fetis. *Baub. pin. 16. Theatr. 145.*

Habitat circa Latifontum, alibique in pratis sylvaticis.

EQVISETVM scapo fructificante nudo, sterili frondoso. *Linn. Sp. pl. 1061.*

Equisetum scapo fructificante nudo, caule sterili ramis compositis. *Fl. Suec. 833.*

Equisetum fetis simplicibus intermedio multoties longioribus. *Roy. lugdb. 496.*

Equisetum arvense. *Fl. Lapp. 390.*

Equisetum arvense longioribus fetis. *Baub. pin. 16.*

Equisetum minus. *Fuchs. hist. 323.*

Habitat in arvis, pratisque circa Leytæpontum præsertim.

EQVISETVM caule angulato, frondibus simplicibus. *Linn. Sp. pl. 1061.*

Equisetum fetis simplicibus internodia vix superantibus. *Roy. lugdb. 496. Fl. Suec. 835.*

Equisetum palustre. Fl. Lapp. 392.

Equisetum palustre, brevioribus setis. Baub. pin. 16. theatr. 242.

Habitat passim in aquosis locis, præsertim insularum danubialium, & Leytæponti.

4. *EQVISETVM* caule striato, frondibus subsimplicibus: *Linn. Sp. pl. 1062.*

Equisetum caule non fulcato latissimo, verticillis densissimis. Hall. helv. 144. Fl. Suec. 836.

Equisetum fluviatile. Fl. Lapp. 393.

Equisetum palustre longioribus setis. Baub. pin. 15. Theatr. 242.

Habitat ad ripas Danubii, Leytæ, Fischæ, aliorumque fluminum & rivulorum.

OPHIOGLOSSVM.

- I. *OPHIOGLOSSVM* fronde ovata. *Linn. Sp. pl. 1062. Fl. Suec. 839.*

Ophioglossum folio ovato, spica disticha. Hort. Cliff. 472.

Ophioglossum. Baub. pin. 364.

Ophioglossum vulgatum. 345. ibidem.

Habitat circa Dornbach & Grinzing passim, copiose autem in insula Fischamentensi Geimanniana olim, nunc Hauseriana.

OSMVNDA.

- I. *OSMVNDA* scapo caulino solitario, fronde pinnata solitaria. *Linn. Sp. pl. 1064.*

Osmunda fronde pinnata caulina: pinnis lunulatis. Hort. Cliff. 472.

Osmunda folio pinnatifido: pinnis lunulatis. Fl. Lapp. 389.

Lunaria racemosa minor, & vulgaris. Baub. pin. 354.

Lunaria minor. Cam. epit. 643.

Habitat in sylvis Latifontanis, & in monte Cecio vulgo Kalenberg.

PTERIS.

- I. *PTERIS* fronde supradecomposita: foliolis pinnatis: pinnis lanceolatis: infimis pinnatifidis: superioribus minoribus. *Linn. Sp. pl. 1075. Fl. Suec. 843.*

Filix ramosa major, pinnulis non dentatis. *Baub. pin.* 357.

Filix fœmina. *Fuchs. hist.* 596. *Cam. epit.* 992. *Dodon. pempt.* 342.

Thelyopteris Dioscoridis. *Hall. Jen. Rupp.* 342.

Habitat passim in sylvis cœdis, præsertim circa Murobadium, Gablizam, & Latifontum.

ASPLENIVM.

1. *ASPLENIVM* frondibus simplicibus cordato-lingulatis integerrimis, stipitibus hirsutis. *Linn. Sp. pl.* 1079.

Asplenium frondibus ensiformibus integris, basi cordatis inflexis, petiolis hirsutis. *Fl. Suec.* 853.

Lingua cervina officinarum. *Baub. pin.* 353.

Phyllitis. *Cam. epit.* 579.

Phyllitis vulgaris. *Clus. hist.* 2. p. 213.

Habitat in puteo antiquæ arcis Hamburgensis, in vallibus umbrosis montis Schneeberg, & in alpe Etscher alibique.

2. *ASPLENIVM* frondibus pinnatifidis; lobis alternis confluentibus. *Linn. Sp. pl.* 1080.

Asplenium f. *Ceterach.* *Baub. hist.* 3. p. 749.

Ceterach officinarum. *Baub. pin.* 354.

Habitat ad pedem ultimi montis vallis Breininæ Austriam inferiorem à Styria terminantis.

3. *ASPLENIVM* frondibus pinnatis: pinnis subrotundis crenatis. *Linn. Sp. pl.* 1080. *Fl. Suec.* 854.

Trichomanes f. *Polytrichum officinarum.* *Baub. pin.* 356.

Trichomanes. *Fuchs. hist.* 796. *Cam. epit.* 925.

Habitat retro arcem collapsam Ravenstein ultra Civitatem Badensem, inter commissuras lapidum antiqui muri arcis Trautmannsdorffensis, alibique passim in rimis petrarum.

4. *ASPLENIVM* frondibus alternatim decompositis: foliolis cuneiformibus crenulatis. *Linn. Sp. pl.* 1081. *Fl. Suec.* 855.

Ruta muraria. *Baub. pin.* 356.

Paronychia. *Cam. epit.* 785.

Habitat in rimis petrarum, murisque antiquis Leytæponti, sparsim, præsertim in domo Domini Platzer mercatoris, copiosè autem in arce Trautmannsdorffensi cum *Asplenio trichomane.*

POLYPODIUM.

1. *POLYPODIUM* frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis subferratis obtusis, radice squamata. *Linn. Sp. pl.* 1085.

Polypodium fronde pinnata: pinnis lanceolatis indivisis ferrulatis alternis connato-fessilibus. *Fl. Suec.* 845.

Polypodium pinnatum pinnis lanceolatis integris. *Fl. Lapp.* 380.

Polypodium vulgare. *Baub. pin.* 359.

Polypodium majus. *Dodon. pempt.* 464.

Habitat in rimis petrarum vallis Breininæ, in opacis & udis vallibus montis Schneeberg, alibique.

2. *POLYPODIUM* fronde bipinnata: pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. *Linn. Sp. pl.* 1090. *Fl. Suec.* 846.

Filix mas non ramosa dentata. *Baub. pin.* 358.

Filix mas. *Fuchs. hist.* 594.

Habitat in sylvis circa Burckersdorff, Murobadium, & Gablizam, alibique.

MUSCI.

LYCOPODIUM.

1. *LYCOPODIUM* foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus pedunculis geminis. *Linn. Sp. pl.* 1101.

Lycopodium caule repente, foliis patulis, pedunculis spica gemina terminatis. *Fl. Lapp.* 418. *Fl. Suec.* 859.

Lycopodium vulgare pilosum anfragosum & repens. *Dill. musc.* 441. t. 58. f. 1.

Muscus terrestris clavatus. *Baub. pin.* 360.

Habitat in sylvis Breininis, aliisque Styriæ vicinis.

POLYTRICHUM.

1. *POLYTRICHUM* caule simplici anthera parallelepipedo. *Linn. Sp. pl.* 1109.

Polytrichum quadrangulare vulgare, *Yuccæ* foliis ferratis. *Dill. musc.* 420. t. 54. f. 1.

Polytrichum aureum majus. *Baub. pin.* 356.

Muscus juniperifolius, capitulo quadrangulo. *Vaill. paris.* 131. t. 23. f. 8.

- β. *Polytrichum quadrangulare juniperi foliis brevibus, & rigidioribus.* *Dill. musc.* 424. t. 54. f. 2.

Polytrichum aureum medium. Baub. pin. 356.

Muscus coronatus humilis. Moris. hist. 3. p. 630. s. 15. t. 7. f. 6. 8.

Muscus erectus, Juniperi folio glauco. Vaill. paris. 131. t. 23. f. 6.

Habitat a copiose circa Latifontum. β. circa Burckersdorff.

M N I V M.

1. *MNIUM caule simplici geniculis inflexo. Linn. Sp. pl. 1110. Fl. Lapp. 414. Fl. Suec. 913.*

Bryum palustre, scapis teretibus stellatis, capsulis magnis subrotundis. Dill. musc. 340. t. 44. f. 2.

Muscus capillaceus tenuissimus, pediculo longissimo purpurascens, capitulo rotundiore T. Vaill. paris. 134. t. 24. f. 10.

Muscus trichodes palustris erectus coronatus, capitulis sphaericis amplioribus. Moris hist. 3. p. 628. s. 15. t. 6. f. 8.

Muscus parvus stellatus. Pluk. alm. 255. t. 47. f. 6.

Habitat ad scaturiginem Leytæpontum inter & Winden sitam, alibique ad fontes, & scaturigines paludosas.

2. *MNIUM caule dichotomo, foliis subulatis. Linn. Sp. pl. 1110. Fl. Suec. 912.*

Mnium majus, ramis longioribus bifurcatis. Dill. musc. 233. t. 31. f. 3.

Muscus palustris erectus flavescens, capillaceo folio. Vaill. paris 135. t. 24. f. 1.

Muscus palustris, flagellis erectis luteolis raro divisis, capitulis oblongis adianti. Moris. hist. 3. p. 629. s. 15. t. 6. f. 9.

Habitat in pratis paludosis Leytæponti ad hortum phasianorum sitis, alibique.

3. *MNIUM caule ramoso, androgynum. Linn. Sp. pl. 1110. Fl. Suec. 910.*

Mnium perangustis & brevibus foliis. Dill. musc. 230. t. 31. f. 1.

Bryum angustiori folio, capsula longa pyriformi inclinata. Hall. belv. 114.

Muscoides: muscus capillaris minimus, capitulo minimo pulverulento. Vaill. paris. t. 29. f. 6.

Muscus trichodes parvus, capitulo glomerato s. botryoides. Mich. gen. 108. t. 59. f. 8. H. K.

Muscus coronatus humilis minimus, foliolis pediculis
& capitulis minimus erectis. *Moris. hist. 3. p. 631.*
s. 15. t. 7. f. 20.

Habitat in sylvis umbrosis Leytæponti, & Fischamentæ.

B R Y V M.

1. *BRYVM* anthera erecta oblonga minori calyptris laxis
æqualibus. *Linn. Sp. pl. 1116. Fl. Suec. 891.*

Bryum calyptra extincorii forma, minus. *Dill. musc.*
349. t. 45. f. 8.

Muscus capillaceus minimus calyptra longa conoide ni-
tida. T. Vaill. paris. 137. t. 26. f. 1.

Muscus coronatus humilis tenuifolius, pileolo magno
acuto infra aperto, extincorium referente. *Moris.*
hist. 3. p. 350. t. 45. f. 9.

β. *Bryum calyptra extincorii figura majus & ramosum.*
Dill. musc. 350. t. 45. f. 9.

Habitat Fischamentæ in insula olim Geimanniana nunc Haue-
riana, alibique.

2. *BRYVM* antheris erectiusculis, foliis piliferis recurvis.
Linn. Sp. pl. 1116. Fl. Suec. 900.

Bryum caule erecto, foliis reflexis seta terminatis, ca-
pitulis falcatis. *Fl. Lapp. 397.*

Bryum rurale unguiculatum hirsutum elatius, & ramo-
sius. *Dill. musc. 352. t. 45. f. 12.*

Muscus capillaris tectorum, densis cespitibus nascens,
capitulis oblongis, foliis in pilum oblongum de-
sinentibus. *Vaill. paris. 133. t. 25. f. 3.*

Muscus erectus hirsutus, capitulis longis acutis ungui-
culis avicularum similibus, vulgatissimus. *Moris.*
hist. 3. p. 628. s. 15. t. 6. f. 12.

Habitat in tectis rusticorum, præsertim Gallbrunnensium, &
Arbesthalensium, aliorumque.

3. *BRYVM* antheris erectis, foliis piliferis rectiusculis, sur-
culis simplicibus cespitosus. *Linn. Sp. pl. 1117.*

Bryum tegulare humile pilosum & incanum. *Dill. musc.*
355. t. 45. f. 14.

Muscus capillaris minor, capitulis erectis, vulgatissi-
mus, foliis in pilum desinentibus. *Vaill. paris. 133.*
t. 24. f. 15.

Muscus vulgaris omnium vulgatissimus non villosus.
Vaill. paris. 133. t. 24. f. 14.

Muscus capillaris minor capitulis erectis vulgatissimus non villosus. *Vaill. paris. t. 25. f. 4.*

Habitat ubique in tegulis, saxis, muris, præsertim in mœniis Leytæpontanis arcem Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach cingentibus.

4. *BRYUM* antheris erectis subrotundis: operculo mucronato. *Linn. Sp. pl. 1119. Fl. Suec. 889.*

Bryum exiguum, creberrimis capsulis rufis. *Dill. musc. 347. t. 45. f. 7.*

Muscus capillaceus, omnium minimus. *Vaill. paris. 130. t. 26. f. 2.*

Muscus coronatus minimus, foliis, & capitulis oblongis in pediculis brevissimis. *Moris. hist. 3. p. 631. s. 15. t. 7. f. 18.*

Habitat Fischamentæ in nemore ad molam minorem sito, alibique.

H Y P N V M.

1. *HYPNUM* ramis vagis subrepentibus, foliolis ovatis mucronatis imbricatis. *Linn. Sp. pl. 1124.*

Hypnum dentatum vulgatissimum operculis obtusis. *Dill. musc. 295. t. 38. f. 29.*

Muscus myosuroides rutabuli fructu. *Vaill. paris. t. 27. f. 8. & t. 23. f. 2.*

Muscus denticulatus minor sericeus nostras, capitulis adianti. *Moris. hist. 3. p. 626. s. 15. t. 6. f. 35.*

Habitat in saltibus Leytæpontanis ad arborum radices, alibique.

2. *HYPNUM* furculis pinnatis: ramulis distantibus foliolis imbricatis incurvis acutis secundis. *Linn. Sp. pl. 1125. Fl. Suec. 875.*

Hypnum repens filicinum crispum. *Dill. musc. 282. t. 36. f. 19.*

Muscus filicinus palustris. *Vaill. paris. 138. t. 29. f. 9.*

Habitat in pratis humidiusculis Leytæpontanis circa hortum phasianorum Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach sitis, præsertim in illo quod canales aquam in forum ducentes transcurrunt.

3. *HYPNUM* furculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. *Linn. Sp. pl. 1125. Fl. Suec. 872.*

Hypnum filicinum, tamarisci foliis minoribus non splendidibus. *Dill. musc. 276. t. 35. f. 14.*

Muscus filicinus major. Moris. hist. 3. p. 625. s. 15. t. 5. f. 20. Tournes. inst. 556. t. 326. f. C. Vaill. paris. 140. t. 25. f. 1.

Habitat in pratis, & sylvis circa Leytæpontum, ac circa Grinzing, alibique.

4. *HYPNUM* furculis plano-pinnatis continuatis, pedunculis aggregatis. *Linn. Sp. pl. 1125. Fl. Suec. 873.*

Hypnum filicinum, tamarisci foliis majoribus splendentibus. Dill. musc. 274. t. 35. f. 13.

Muscus filicinus major. Buxb. Cent. 2. p. 2. t. 1. f. 2. & p. 3. t. 2. f. 1. & 4. t. 28. f. 1. & t. 29. f. 1.

Habitat in pratis & sylvis circa Leytæpontum, Latifontum, ac in monte Cecio seu Kalenberg.

5. *HYPNUM* furculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, antheris erectis. *Linn. Sp. pl. 1129. Fl. Suec. 882.*

Hypnum vulgare sericeum recurvum, capsulis erectis cuspidatis. Dill. musc. 323. t. 42. f. 59.

Muscus arboreus splendens sericeus. Vaill. paris. 132. t. 27. f. 3.

Habitat ad truncos arborum ubique fere in sylvis præsertim Leytæpontanis, Latifontanis, & Fischamentensibus.

6. *HYPNUM* furculo repente, ramis confertis erectis, foliis subulatis, antheris subnutantibus. *Linn. Sp. pl. 1129. Fl. Suec. 883.*

Hypnum velutinum, capsulis ovatis cernuis. Dill. musc. 326. t. 42. f. 61.

Muscus squamosus ramosus tenuior, capitulis incurvis. Vaill. paris. 133. t. 26. f. 9.

Muscus terrestris minor omnium vulgatissimus. Buxb. cent. 4. p. 35. t. 62. f. 23.

Habitat ad radices arborum in sylva Leytæpontum, inter & Lapidicinas Cæsareas sita, alibique passim.

A L G Æ.

M A R C H A N T I A.

- I. *MARCHANTIA* calyce communi decemfido. *Linn. Sp. pl. 1137. Fl. Suec. 931.*

Marchantia major capitulo stellato: radiis teretibus. Mich. gen. 2. t. 1. f. 1.

Lichen

Lichen fontanus major stellatus æque, ac umbellatus,
& cyathophorus. *Dill. musc. 523. t. 76. f. 6.*

Lichen petræus latifolius, f. Hepatica fontana. *Bauh. pin. 362.*

Lichen. *Fuchs. hist. 179. Cam. epit. 782.*

Habitat circa Dornbach, & Grinzing juxta aquas locis
in umbrosis, præsertim vero in puteo Leytæpontum inter &
Julaschium vulgo Jois, ad viam sito copiose.

L I C H E N.

LICHEN leprosus albicans, lineolis nigris ramosis cha-
racteriformibus. *Linn. Sp. pl. 1140. Fl. Suec. 941.*

Lichenoides crusta tenuissima, peregrinis veluti literis
inscripta. *Dill. musc. 128. t. 18. f. 1.*

Habitat in Quercubus, & Ulmis circa Leytæpontum.

LICHEN leprosus cinereo-virescens, tuberculis atris.
Linn. Sp. pl. 1140.

Lichenoides leprosum crusta cinereo-virescente, tu-
berculis nigerrimis. *Dill. musc. 126. t. 18. f. 3.*

Habitat ubique fere circa Leytæpontum in Fagis, & Quera-
cubus junioribus quibus cortex nondum rimosus sed lævis est.

LICHEN leprosus candidus, tuberculis atris. *Linn. Sp. pl. 1140.*

Lichenoides tartareum candidum tinctorium tuberculis
atris. *Dill. musc. 128. t. 18. f. 8.*

Habitat in petris Leytæponti circa furnum calcareum, & in
monte Spitalberg sitis.

LICHEN leprosus albus tuberculis albis farinaceis. *Linn. Sp. pl. 1141.*

Habitat in truncis Fagorum circa Leytæpontum passim.

LICHEN leprosus candidus, tuberculis incarnatis. *Linn. Sp. pl. 1141. Fl. Suec. 936.*

Lichen crustaceus, calyce convexo foliis majore. *Fl. Lapp. 455.*

Lichen terrestris ericetorum basi mucosa (verrucosa gri-
sea) capitulis fungoidibus, cornei coloris. *Hall. Jen. Rupp. 379.*

Coralloides fungiforme carneum, basi leprosa. *Dill. musc. 76. t. 14. f. 1.*

Fungus omnium minimus turbinatus croceus. *Bocc. mus. 2. p. 150. t. 10.*

Fungilli incarnati coloris minuti musco infidentes.
Mentz. pug. t. 6.

Habitat præsertim in declivitate montis Cecii seu Kulenberg
 ad semitam, quæ ex monasterio Weidlingam ducit inter frutices.

6. LICHEN imbricatus, foliolis sinuatis scabris lacunosis, scutellis folio concoloribus. *Linn. sp. pl. 1142. Fl. Suec. 946. Mat. med. 494.*

Lichen foliis planis acute laciniatis rubiginoso-albidis. *Fl. Lapp. 447.*

Lichen opere phrygio ornatus. *Vaill. paris. t. 21. f. 1.*

Lichenoides vulgarissimum cinereo-glaucum lacunosum, & cirrhosum. *Dill. musc. 188. t. 24. f. 83.*

Musco-fungus lichenoides minor cinereus vulgarissimus.
Morif. hist. 3. p. 634. s. 15. t. 7. f. 6.

Habitat in rupibus passim præsertim circa Medling.

7. LICHEN crustaceus flavus, scutellis luteis. *Linn. Sp. pl. 1141.*

Byssus farinacea flava. *It. Oel. 30.*

Habitat ubique in parietibus, tegulis, & muris circa Leytæpontum.

8. LICHEN imbricatus, foliis crispis fulvis, peltis concoloribus fulvis. *Linn. Sp. pl. 1143.*

Lichenoides vulgare sinuosum, foliis & scutellis luteis.
Dill. musc. 180. t. 24. f. 76.

Habitat ubique in arboribus, & fruticibus circa Leytæpontum.

9. LICHEN imbricatus: laciniis obtusis subinflatis. *Linn. Sp. pl. 1144.*

Lichen foliaceus subdepressus lævis. laciniis integerrimis truncatis subtus concavis lacunosis atris. *Fl. Suec. 951.*

Lichen pulmonarius arboribus adnascens: desuper cinereus, subtus anthracinus: segmentis teretibus tubulosis. *Mich. gen. 91. t. 50. f. 1. 2.*

Lichenoides ceratophyllum obtusius, & minus ramosum. *Dill. musc. 154. t. 20. f. 49.*

Habitat passim in corticibus Betulæ, & in sylvis cæduis in putrescentibus arborum truncis circa Leytæpontum.

10. LICHEN imbricatus foliis oblongis laciniatis angustis cinereis, scutellis pullis. *Linn. Sp. pl. 1144. Fl. Suec. 950.*

Lichen foliis laciniatis cinereis: laciniis obtusiusculis sæpius apicetrifidis. *Roy. lugdb. 510.*

Lichen pulmonarius vulgatissimus superne albo cinereus inferne nigricans, segmentis angustis, receptaculis nigricantibus. *Mich. gen. 91. t. 43. f. 2.*

Lichenoides cinereum, segmentis argutis stellatis, scutellis nigris. *Dill. musc. 176. t. 24. f. 70.*

Habitat passim in ramis Populi folio tremulo, figorum, & quercuum juniorum, circa Leytæpontum autem copiose in Pruno Spinosa, & in Cratægo Oxyacantha dicto, aliisque fruticibus cortice minus aspero donatis.

1. LICHEN foliaceus erectiusculus: laciniis linearibus ciliatis, scutellis pedunculatis crenatis. *Linn. Sp. pl. 1144. Fl. Suec. 952.*

Lichen foliis laciniatis cinereis: lacinis linearibus apice pilosis. *Roy. lugdb. 509.*

Lichen cinereus arboreus, marginibus pilosis major, *Vaill. paris 115. t. 20. f. 4.*

Lichenoides hispidum majus, & rigidius, scutellis nigris. *Dill. musc. 150. t. 20. f. 45.*

Musco-fungus arboreus cinereus scutellatus; marginibus pilosis. *Moris. hist. 3. p. 634. s. 15. t. 7. f. 6.*

Muscus arboreus pyxoides pilosus. *Loës. pruss. 171. t. 50.*

Habitat ubique fere in arboribus, præsertim circa Dornbach, & Burckersdorff.

2. LICHEN foliaceus laciniatus obtusus glaber: supra lacunofus; subtus tomentosus. *Linn. Sp. pl. 1145. Fl. Suec. 960.*

Lichen foliis oblongis divisis, superficie reticulato punctata. *Fl. Lapp. 444. Roy. lugdb. 509.*

Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare marginibus peltiferis. *Dill. musc. 212. t. 29. f. 113.*

Muscus pulmonarius. *Baub. pin. 361.*

Pulmonaria. *Fuchs. hist. 631. Cam. epit. 783.*

Habitat in Quercubus & fagis antiquis circa Dornbach, Murobadium, Latifontum, & alibi.

3. LICHEN foliaceus erectiusculus lacunofus: subtus tomentosus albus. *Linn. Sp. pl. 1147. Fl. Suec. 954.*

Lichen foliis mollibus candicantibus dichotomis, calycibus orbiculatis sessilibus. *Roy. lugdb. 570.*

Lichen cinereus vulgatissimus cornua damæ referens. *Vaill. paris. 115. t. 20. f. 11. 12.*

Lichenoides cornutum, bronchiale molle subtus incanum. *Dill. musc.* 160. t. 21. f. 55.

Habitat in *Prunis spinosis circa Leytæpontum præsertim versus Lapidicinas Cæsareas.*

14. *LICHEN* *scyphifer simplex integerrimus*, stipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Linn. Sp. pl.* 1151. *Fl. Suec.* 972.

Lichen caule simplici, calyce turbinato margine caroso colorato prolifero. *Fl. Lapp.* 429. *Roy. lugdb.* 512.

Lichen pyxidatus, oris coccineis & tumentibus. *Vaill. paris.* 115. t. 21. f. 4. *Mich. gen.* 82. t. 41. f. 3.

Coralloides *scyphiforme*, tuberculis coccineis. *Dill. musc.* 82. t. 14. f. 7.

Habitat in *sylvis vallis Breininæ, & Burckersdorffensibus, ac Grinzingensibus aliisque.*

15. *LICHEN* *scyphifer simplex crenulatus*, tuberculis fuscis. *Linn. Sp. pl.* 1151. *Fl. Suec.* 971.

Lichen caule simplici, calyce turbinato: margine tenui. *Fl. lapp.* 428.

Lichen pyxidatus major. *Tournef. inst.* 549. t. 325. *F.D. Vaill. paris.* 115. t. 21. f. 8. *Mich. gen.* 82. t. 41. f. 1.

Coralloides *scyphiforme*, tuberculis fuscis. *Dill. musc.* 79. t. 14. f. 6.

Habitat in *sylvis cum præcedente, præsertim circa Grinzing, & in monte Cecio, seu Kalenberg.*

16. *LICHEN* *fruticulosus perforatus ramosissimus*, ramulis nutantibus. *Linn. Sp. pl.* 1153. *Fl. Suec.* 980.

Lichen caule erecto tereti ramosissimo, alis perforatis. *Fl. lapp.* 437.

Coralloides *montanum*, fruticuli specie ubique candidans. *Dill. musc.* 107. t. 16. f. 29.

Musco-fungus *coralloides montanus ramosissimus cinereus vulgaris.* *Moris. hist.* 3. p. 633. s. 15. t. 7. f. 9.

Muscus *coralloides f. cornutus montanus.* *Baub. pin.* 361.

Muscus *corallinus f. corallina montana.* *Baub. hist.* 1198.

Habitat in *alpe Breinina, & Latifonti in juniperetis.*

16. *LICHEN* *filamentosus pendulus*, ramis implexis scutellis radiatis. *Linn. Sp. pl.* 1154. *Fl. Suec.* 984.

Lichen ramis filiformibus ramosis pendulis confertis. *Fl. lapp.* 457.

Usnea *vulgaris*, loris longis implexis. *Dill. musc.* 56. t. 11. f. 1. Muscus

Musculus arboreus, usnea officinarum. *Baub. pin.* 361.

Habitat passim in arboribus sylvarum umbrosarum, præsertim in Breininis.

CHARA.

CHARA caulibus lævibus, frondibus interne dentatis.

Linn. Sp. pl. 1156.

Chara vulgaris. *Fl. lapp.* 469. *Fl. Suec.* 992.

Chara vulgaris fœtida. *Vaill. act.* 1719. p. 23. t. 3. f. 1.

Equisetum fœtidum sub aqua repens. *Baub. pin.* 16. prodr.

25. *Theatr.* 251. *Baub. hist.* 3. p. 731.

Hippuris crassior. *Hall. Jen. Rupp.* 350.

Habitat Leytæponti in rivulo Leyta minor dicto, alibique in aquis pigris, seu sègnioribus.

TREMELLA.

TREMELLA sessilis membranacea auriformis cinerea.

Linn. Sp. pl. 1157.

Agaricum auriculæ forma. *Mich. gen.* 124. t. 66. f. 1.

Fungorum perniciosorum genus 1. *Clus. hist.* 2. p. 276.

Habitat passim ad arbores putridas præsertim in Sambuco.

TREMELLA subglobosa sessilis solitaria glabra. *Linn. Sp. pl.* 1158. *Fl. Suec.* 1022.

Lichenoides tuberculosum amœne purpureum. *Dill. musc.* 127. t. 18. f. 6.

Habitat in ramis arborum moribundis, & emortuis hinc inde, præsertim in pruno spinoso in fruticeto Gerlthof inter & Pezlsdorff ad sinistram viæ sito.

CONFERRA.

CONFERRA filamentis simplicissimis æqualibus longissimis.

Linn. Sp. pl. 1164. *Fl. Suec.* 1023.

Conferva capillaris simplicissima enodis. *Roy. lugdb.* 511.

Conferva fluviatilis sericea vulgaris, & fluitans. *Dill. musc.* 12. t. 2. f. 2.

Habitat in fluvio Leyta, & in rivulo Steinbachl dicto Leytæponti alibique

CONFERRA filamentis æqualibus basin versus ramosioribus. *Linn. Sp. pl.* 1164.

Con-

Conferva rivulorum capillacea, densissime congestis ramulis. *Dill. musc.* 21. t. 4. f. 15.

Alga in tubulis aquam fontanam ducentibus. *Baub. pin.*

364.

Habitat in tubis aquam ad forum Leytæpontanum ducentibus alibique in rivulis.

B Y S S V S.

1. BYSSVS filamentis plumosis natantibus. *Linn. Sp. pl.* 1168.

β. Byffus membranacea aquatica. *Fl. lapp.* 529.

Byffus latissima, papyri instar supra aquam expansa.

Dill. musc. 1.

Habitat ubique fere in aquis quietis prima æstate.

2. BYSSVS pulverulenta atra. *Linn. Sp. pl.* 1169. *Fl. Suec.* 1126.

Habitat copiose in antiquis muris vineas Leytæpontanas vulgo die ungarische Setze dictas cingentibus.

3. BYSSVS pulverulenta sanguinea faxis innascens. *Linn. Sp. pl.* 1169.

Byffus perennis pulverulenta tubra Lapidibus innascens.

Fl. lapp. 528. *Fl. Suec.* 1125.

Byffus germanica minima faxatilis aurea violæ odorem spirans. *Mich. gen.* 210. t. 89. f. 3.

Habitat copiose in montibus Bohemiam à Silesia distinguentibus vulgo Riesengebürg, dictis.

Hospitabatur inde una cum lapide allatus in hortulo botanico Fratris Honorii apud FFr. Misericordiæ in suburbio Vienne[n]si Leopoldino.

4. BYSSVS pulverulenta flava lignis adnascens. *Dill. musc.* 3. t. 1. f. 4.

Byffus farinacea flava. *Linn. Sp. pl.* 1169.

Habitat copiose in quercubus, & carpinis circa Leytæpontum, sed constanter in ea tantum parte quæ meridiem respicit.

5. BYSSVS pulverulenta viridis. *Linn. Sp. pl.* 1169.

Byffus botryoides saturate virens. *Raj. angl.* 3. p. 5. 6.

Dill. musc. 3. t. 1. f. 5.

Habitat Leytæponti ad canales per quos aquæ sordidæ ex culinis effusæ in plateas fluunt.

6. BYSSVS pulverulento-crustacea albissima. *Linn. Sp. pl.* 1169.

Byffus candidissima, calcis instar muscos vestiens. *Dill. musc.* 2. t. 1. f. 2.

Habitat in corticibus arborum, præsertim Cerasorum, & ulmorum circa Leytæpontum.

F V N G I.

A G A R I C V S.

AGARICVS stipitatus, lamellis ramosis decurrentibus.
Linn. Sp. pl. 1171. Fl. Suec. 1049.

Agaricus caulescens fulvus, pileo concavo: marginere-
 flexo, lamellis erectis, stipite brevissimo. *Fl. lapp.*
 493.

Fungus minimus flavescens infundibuliformis. *Bauh.*
pin. 373. Vaill. paris. t. II. f. 9. 10.

Habitat in sylva dicta Gatterhölzl, alibique.

AGARICVS stipitatus, pileo testaceo succo lutescente.
Linn. Sp. pl. 1172.

Amanita lateritii coloris, croceo succo turgens. *Dill.*
giss. 179.

Fungus perniciosus, lateritio colore varians, succum
 acrem & croceum fundens. *Mich. gen. 141. Hall.*
helv. 49.

Habitat in sylvis sparsim, præsertim in Fischamentensibus.

AGARICVS stipitatus, pileo plano carneo lactescente, la-
 mellis ruffis, stipite longo carneo. *Linn. Sp. pl.*
1172. Fl. lapp. 484.

Fungus flavo rufus in medio depressus, lacte non acri-
 manans. *Hall. helv. 50.*

Habitat in sylvis Leytæpontanis, Latifontanis, Vindensibus, aliisque.

AGARICVS stipitatus, pileo planiusculo lactescente: mar-
 gine deflexo, lamellis incarnato-pallidis. *Linn. Sp.*
pl. 1173. Fl. Suec. 1035.

Fungus piperatus albus crassus, lacteo succo turgens.
Mich. gen. 141. Hall. helv. 34 n. 1.

Fungus albus acris *Bauh. pin. 371.*

Habitat in pascuis, & sylvis, præsertim circa Dornbach.

AGARICVS stipitatus, pileo flavo convexo, lamellis al-
 bis. *Linn. Sp. pl. 1173. Fl. Suec. 1052.*

Agaricus caulescens, pileo plano sulphureo, lamellis
 albis, stipite crassiusculo. *Fl. lapp. 496.*

Fungus orbicularis exalbidus pratensis. *Bauh. pin. 370.*
Hall. helv. 38.

Fungus divi Georgii, coloris exalbidi cum pauca flavitie,
 esculenti pratensis I. *Bauh. hist. 3. p. 824.*

Fun-

Fungus croceus magnus. *Sterb. fung.* 63. t. II. f. 3.

Habitat in locis apricis sylvarum fere omnium.

6. AGARICUS stipitatus, pileo campanulato lacero, lamellis nigris lateraliter flexuosus, stipite fistuloso. *Linn. Sp. pl.* 1174.

Agaricus caulescens pileo conico cinereo, lamellis nigris: margine lacero, stipite longissimo albo. *Fl. lapp.* 503. *Fl. Suec.* 1036.

Fungus comatus. *Sterb. fung.* 218. t. 22. F.I. K.L.

Fungus albus ovum referens. *Buxb. cent.* 4. p. 16. t. 27. f. I.

Fungorum perniciosorum genus 16. *Spec.* 3. *Clus. hist.* 2. p. 282.

Habitat in finetis horti oleracei ad Excellentissimum Comitem Ernestum ab Harrach *Speſtantis* Leytæponti.

7. AGARICUS acaulis, lamellis labyrinthiformibus. *Linn. Sp. pl.* 1176. *Fl. Suec.* 1082.

Agaricus villosus, lamellis sinuosis & invicem implexis. *Buxb. cent.* 5. t. 4. f. I.

Agarico-fungus lamellis crassissimis rigidis. *Hall. helv.* 57.

Habitat in quercubus, præsertim in sylvis Breininis.

8. AGARICUS acaulis, lamellis pectiniformibus.

Agaricus coriaceus longissimus, pectinatim inferne divisus. *Raj. Syn. Brit. edit.* 3. p. 25. §. 26. t. I. f. 5.

Habitabat in trabe quercina, ad ripam horti Leytæpontani Excellentissimi Comitis Ernesti ab Harrach contra tumentis fluvii impetum defendendam illuc posita, varissimus iste fungus.

BOLETVS.

1. BOLETVS acaulis: fasciis dicoloribus poris albis. *Linn. Sp. pl.* 1176.

Agarico-polyporus versicoloribus lineis variis, poris albis tenuissimis. *Hall. helv.* 26.

Habitat ad truncos carpini, quercus, ulmi, & aliarum arborum antiquarum circa Leytæpontum.

2. BOLETVS stipitatus perennis, pileo utrinque planiusculo. *Linn. Sp. pl.* 1177.

Boletus caulescens, pileo utrinque planiusculo, perennis. *Fl. lapp.* 519. *Fl. Suec.* 1086.

Fungus lignosus fasciatus. *Vaill. paris. t.* 12. f. 7.

Habitat in sylvarum caudicibus putridis, & consumtis præsertim circa Leytæpontum.

Descriptio. Pileus in nostro utrinque planiusculus irregularis centro tamen utrinque in maturo prominulo: figura Vaillantiana duplo major: Superne sanguineus fasciis seu sulcis 8. vel 9. pluribusque exornatus: inferne testaceus poris oculo nudo vix visibilibus; margine rubro. Petiolus fuscus ultimam phalangem digiti auricularis, vel primam remigum tardæ crassitie, longitudine vero digitum indicem viri majoris æquans. Hic ut alii stipitati non fugax est, sed per integrum annum durat rigidus, & lignosus; Hinc Boleti in Flora Lapponica descripti n. 519. varietas solum.

PHALLVS.

- PHALLVS pileo ovato, stipite nudo rugoso. Linn. Sp. pl. 1178. Fl. Suec. 1102.
 Phallus petiolo nudo, pileo subtus undique annexo. Hort. Cliff. 379. Roy. lugdb. 517.
 Boletus esculentus rugosus albicans, quasi fuligine infertus. Tournef. inst. 561. t. 329. f. A.
 Boletus esculentus rugosus 1. 2. 3. Mich. gen. 203. t. 85. f. 1. 2.
 Fungi esculenti species tres. Clus. hist. 2. p. 164.
 Habitat in sylvis passim circa Leytæpontum, & Latifontum. Observatio, qui sub Quercubus habitat nigrescit, qui sub Cerasis flavescit.

ELVELA.

- ELVELA acaulis. Linn. Sp. pl. 1180.
 Agaricus utrinque planiusculus. Fl. Lapp. 517.
 Habitat in pinis vallis Breininæ.

PEZIZA.

- PEZIZA campanulata lentifera. Linn. Sp. pl. 1180.
 Peziza calyce campanulato. Hort. Cliff. 479. Roy. lugdb. 518.
 Peziza calyciformis lentifera lævis. Dill. giss. 195. Fl. Suec. 1109.
 Cyathoides cyathiforme cinereum & veluti sericeum. Mich. gen. 222. t. 102. f. 1.
 Fungoides infundibuli forma, semine fœtum. Vaill. paris. 56. t. 11. f. 6. 7.

Fungus pyxoides feminifer. *Loes. pruss.* 98.
 Habitat Leytæponti in pratis ad hortum phasianorum pagum
 Bachfurt versus sitis.

CLAVARIA.

1. CLAVARIA ramis confertis ramosissimis inæqualibus. *Linn.*

Sp. pl. 1182. *Fl. Suec.* 1106.

Clavaria ramosissima. Roy. lugdb. 518.

Corallo-fungus flavus. Vaill. paris. 41. t. 8. f. 4.

Coralloides flava & albida. Tournef. inst. 564. t. 332. f. B.

Barba caprina. Sterb. fung. 96. 97. t. 11. f. A. B. C. D.

Habitat in sylvis opacis inter muscos frequens, præsertim circa
 Leytæpontum, & Latifontum sub corylis.

LYCOPERDON.

1. LYCOPERDON solidum muricatum, radice destitutum.

Linn. Sp. pl. 1183.

Lycoperdon solidum. Fl. Lapp. 526. *Fl. Suec.* 1116. *Roy.*
lugdb. 519.

Tuber brumale, pulpa obscura odorata. Mich. gen. 221.
 t. 164.

Tuber. Math. Diosc. 544. *Mich. gen.* 221. t. 102.

Habitat sub terra circa Mannersdorff, Latifontum, Laden-
 dorff, & alibi varius.

2. LYCOPERDON subrotundum: lacerato dehiscens. *Linn. Sp.*

pl. 1183. *Fl. Lapp.* 525. *Fl. Suec.* 1115.

Lycoperdon vulgare. Tournef. inst. 563.

Fungus maximus rotundus pulverulentus, dictus germa-
nis Bofist. Baub. hist. 3. p. 848.

Habitat in campis, præsertim Leytæponti in pascuis ad lanio-
 nes pertinentibus vulgo Sallasch dictis.

3. LYCOPERDON stipite longo, capitulo globoso glabro: ore

cylindrico integerrimo. Linn. Sp. pl. 1184. *Fl. Suec.*
1112. Roy. lugdb. 519. *Hall. helv.* 12.

Lycoperdon parisiense minimum pediculo donatum.

Tournef. inst. 563. t. 331. f. E. F.

Fungus pulverulentus minimus, pediculo longo infi-
dens. Raj. angl. 3. p. 27.

Habitat in valle Döblingensi, in vinearumque aggeribus ibi-
 dem, & alibi.

M V C O R.

Mycor seta nigra, villo fusco. Linn. Sp. pl. 1185.

Embolus seta nigra villo fusco. Fl. Suec. 1136.

Embolus nigerrimus villo albo adspersus. Hall. helv. 8.
t. 1. f. 1.

Habitat in lignis putridis hinc inde.

Mycor stipitatus, capsula globosa. Linn. Sp. pl. 1185.

Mucor filamentis granulatis fugacibus putrescentibus innatus. Fl. Lapp. 534. Fl. Suec. 1119. Roy. Lugdv. 520.

Mucor vulgaris capitulo lucido per maturitatem nigro, pediculo griseo. Mich. gen. 215. t. 95. f. 1.

Habitat in variis putridis, præsertim in pane.



ANIMALIUM CLASSIS I.

Q V A D R V P E D I A.

ANTHROPOMORPHA.

H O M O.

I. **H**OMINES inhabitantes Austriam, cum tam oculorum iridibus cinereis, cinereo-cæruleis, cæruleis, fuscis, nigricantibusque; ac capillis albidis, flavis, rufis, nigrisve; prolixis & calamistratis, brevibus & longis: corporeque procèriore, toroso, macro, & parvo reperiantur; illorum varietates secundarias recensere: tam ob adeo diversas nationes, quæ Austriam olim inhabitaverunt, vel transmigrarunt, quam propter hodiernum omnium fere in Austriam vicinarum nationum confluentum non solum impossibile, sed & physico, cui pallidum quamquam alias in Europa phlegma Africam pariter tamen ac reliqua temperamenta inhabitare notum est, illicitum foret. Siquidem sub iudice adhuc hæc est, an iridium capillorumque color & figura a temperamento (per quod rhythmum perpetuum & constantem solida inter & fluida, ac ex his dependentes motus intelligo) an ab avis, elevationeque poli seu climate dependeat: quemadmodum inter philosophos adhuc litigatur an variarum nationum diversæ consuetudines, vitia & virtutes educationi & vivendi modo, an temperamento in his provinciis prædominante debeant adscribi, certum enim est horum qui in frigidioribus regionibus vivunt irides cærulefcere magis, capillos magis albescere, calidiore vero mundi plagas inhabitantium irides capillosve magis nigrescere: sed pariter certum est iridium cæruleum, capillorumque colorem album phlegmatico temperamento, nigrum melancholico in Europa magis proprium esse. Quemadmodum æque constat in Septentrione pariter ac in Africa homines hilares & inconstantes: iracundos, & superbos: ad negotia suscipienda aptos, in hisque peragendis indefessos, sed meticulosos: mansuetosve & pigros reperiri; Phlegmaticos vero pigros & ignavos (de simplicibus temperamentis loquor) Cholericos iracundos & superbos: Sangu-

guineos hilares & in constantes: Melancholicos suspiciosos & timidos, sed in negotiis peragendis indefessos esse. Nam ex phlegmaticorum fibra flaccida, massa humorum pituitosa motus segnius procedunt. Sanguineorum fibra mollis quidem sed attamen sufficiente robore donata, humores fluxiles non tamen pituitosi, motus facilitant. Cholericorum humores quidem satis fluxiles, sed phlogistici, fibræ vero strictæ, & robustæ faciunt motus sat bene quidem procedere, levi tamen ex causa in violentos abire. Melancholicorum humores spissi, & terrestres, fibræ siccæ, motus quidem retardant, vi vitæ tamen superatis obstaculis eosdem constantes, & in hoc temperamento præ cæteris æquales reddunt. Motus autem vitales, cum animales pariter adæquent, tanta mores inter & oeconomiam animalem similitudo oriri videtur. Sic experientia quoque docet in Gallia sanguineum, in Italia melancholicum, in Hungaria cholericum, alibi phlegmaticum temperamentum præ cæteris observari. Unde si seria reflexione instituta præter dicta phlegmaticorum tardum & hebes, sanguineorum volubile, ac docile, cholericorum audax & promptum, melancholicorum acre, & meditabundum perpendis ingenium, & exinde pullulantes virtutes, ac vitia annotaveris, hæsitabis an animi mores ex corporis fabrica, & nutriendi modo fluere, an corporis structuram, cujus robur mechanicos labores, debilitas præmatura studia sequitur, ab animo dependere censendum; an iridis capillorumque color progeniei, an elevationi poli, seu climati, an temperamento prædominanti, an his omnibus adscribendus.

Hominis autem varietates primariæ, quæ in Austria observantur sunt.

a. Europæus albus. *Linn. Syst. natur. 3.*

Habitat ubique in Civitatibus, oppidis, pagis.

β. Asiaticus fuscus. *Linn. Syst. natur. 3.*

Hospitatur Viennæ potissimum merces Orientales adferens, & venum dans.

γ. Africanus niger, *Linn. Syst. natur. 3.*

Hospitatur hinc inde in aulis magnatum.

S I M I A.

SIMIA ecaudata subtus glabra. *Linn. Syst. natur. 3. Tulp.*

obs. t. 271. Pont. ind. 85.

Austriacis Bald & Teufel.

Hospitabatur olim in vivario S. P. Eugenii Viennæ.

2. SIMIA ecaudata clunibus tuberosis. Linn. Syst. natur. edit. Lips. 1748. secundum G. Stockholmensem, quam & in posterum intelligo, nisi editio expresse alia notetur.

Austr. Uffe.

Hospitabatur ibidem, & adhuc in domibus curiosorum.

3. SIMIA ecaudata rufo-nigricans, Alp. Ægypt. 242. t. 20. f. 16. Linn. Syst. natur. 3.

Hospitabatur olim cum aliis hujus generis rarissimis speciebus in vivario S. P. Eugenii.

4. SIMIA semicaudata, maxilla inferiore barbata, vertice setis erectis mitram referentibus obsito, unguibus acutis.

an Simia semicaudata, ore vibrissato, unguibus acutis. Linn. Syst. natur. 3. n. 5.?

Austr. Choras.

5. SIMIA caudata, ore ciliisque vibrizatis. Pet. gaz. t. 13. f. 11. Linn. Syst. natur. 3.

Austr. Meerstade.

Hospitabatur ibidem, & adhuc in domibus curiosorum. Victitant omnes species fructibus. An choras etiam carnibus?

F E R Æ.

V R S V S.

1. VRSVS cauda abrupta. Linn. Syst. natur. 4.

Ursus. Gesn. quadr. 14. Jonst. quadr. 125. t. 55. Raj. quadr. 171.

Ursus. Aldr. digit. 117.

Austr. Bär.

Habitat in Schneeberg, alpe Breinina, aliisque montibus Styriæ, & Austriæ superiori vicinis.

Victitat fructibus, carne.

F E L I S.

1. FELIS cauda elongata floccosa, thorace jubato. Linn. Syst. natur. 4.

Leo. Linn. Syst. natur. edit. Stockholm. 2. p. 35. n. 6.

Austr. Löwe.

Hospitabatur olim in vivario S. P. Eugenii, & in Amphitheatro Viennensi.

Victitat carnibus.

2. *FELIS* cauda elongata, maculis virgatis. *Linn. Syst. natur. 4.*
Tigris. Raj. quadr. 165.
Austr. Zieger.

Hospitabatur ibidem. Viſtat carnibus.

3. *FELIS* cauda elongata, maculis superioribus orbiculatis, inferioribus virgatis. *Linn. Syst. natur. 4.*

Pardalis. Raj. quadr. 166.

Pardus mas. Panthera femina. Alp. Ægypt. 237. t. 15. f. 2.

Austr. Leopart, Pantherthier.

Hospitabatur ibidem. Viſtat carnibus.

4. *FELIS* cauda elongata, auribus æqualibus. *Linn. Syst. natur. 4.*

Felis vulgo catus. Gesn. quadr. 98.

Felis. Aldr. digit. 564.

Felis domestica. Jonst. quadr. 180. t. 72.

Austr. Wildkaze, & cicurata. Einheimische Kaze.

Habitat in omnibus fere sylvis præſertim montanis.

Viſtat volatilibus, piſcibus, quadrupedibus, & cicurata etiam farinaceis.

5. *FELIS* cauda truncata, corpore rufescente maculato. *Linn. Syst. natur. 4. Fl. Suec. 4.*

Lynx. Aldr. digit. 90. Jonst. quadr. t. 71. Raj. quadr. 166.

Lupus cervarius. Gesn. quadr. 155.

Austr. Lur.

Habitat in sylvis montanis præſertim in illis retro campum Liliaceum vulgo Lilienfeld ſitis; ac Styriæ vicinis.

Viſtat quadrupedum, & præſertim cervorum ſanguine, quem ex carotidibus ſugit, raro vel nunquam animalia macſata devorat in libertate vivens. In duas a venatoribus varietates diſtinguitur; quæ albescit magis ſylveſtris Baldlur, altera vero minor, & magis rufescens, atque ferocior: montana ſeu Steinlur, dicitur.

M V S T E L A.

MVSTELA rufo-fusca: medio dorsi nigro. *Linn. Syst. natur. 5. Fn. Suec. 6.*

Gulo. Scheff. Lapp. 339.

Austr. Bielfraß.

Hospitabatur olim in vivario S. P. Eugenii Viennæ.

Viſtat carnibus.

MVSTELA fulvo-nigricans, gula pallida. *Linn. Syst. natur. 5. Fn. Suec. 7.*

Martes. Gesn. quadr. 151. Jonst. quadr. t. 64.

Martes aliis Foyna. *Raj. quadr. 200.*

Austr. Mader, Marder.

Habitat in sylvis, civitatibus, & pagis.

Venatores duas varietates statuunt, unam nigricantem gula flava, Edlmader, quæ sylvas inhabitat, alteram fulvam magis gula pallida Steinmader, quæ murorum, & granariorum incola est. Hujus speciei mustelam albam oculis rubris in suburbio Viennensi extra portam Scottensem ad Ecclesiam PP. Trinitariorum captam vidi. Viçtitat volatilibus ovis.

3. *MVSTELA* flavescente nigricans, ore albo, collari flavescente. *Linn. Syst. natur. 5. Fn. Suec. 8.*

Mustela sylvestris viverra dicta. Raj. quadr. 201.

Putorius. Raj. quadr. 199. Jonst. quadr. 155. t. 64.

Austr. Stesf.

Habitat in horreis, ac sylvis: Hæc nigricat, illa flavet.

Viçtitat volatilibus ovis.

4. *MVSTELA* caudæ apice atro. *Linn. Syst. natur. 5. Fn. Suec. 9.*

Mustela. Gesn. quadr. 149.

Mustela vulgaris. Aldr. quadr. 307. Jonst. quadr. t. 74, Raj. quadr. 195.

β. *Mustela candida* s. animal Ermineum recentiorum, *Raj. quadr. 198.*

Austr. Biesel.

Habitat in sylvis, campis, horreis, & columbariis. β. rufæ vulgaris varietas minus quidem frequens non tamen rara ibidem.

Viçtitat volatilibus, ovis.

L V T R A.

I. *LVTRA* digitis æqualibus. *Linn. Syst. natur. 5.*

Lutra digitis omnibus æqualibus. Fn. Suec. 10.

Lutra. Bellon. aquat. 31. t. 32. Gesn. ichth. 515. Aldr. quadr. 294. Jonst. quadr. 104. Raj. quadr. 187.

Austr. Fisch-Diter.

Habitat in fluviis, lacubus, & piscinis. Viçtitat piscibus.

C A N I S.

I. *CANIS* cauda recurva. *Fn. Suec. 12.*

Canis. Aldr. quadr. 482. Jonst. quadr. 122.

Canis socius & fidelis. Gesn. quadr. 91.

Canis oicurus, domesticus s. socius. *Raj. quadr. 177.*

Austr. Hund.

Habitat in domibus ubique.

Viçtitat carnibus, farinaceis, fructibus.

CANIS cauda incurva. *Linn. Syst. nat. 5. Fn. Suec. 13.*
Canis cauda recta corpore brevior. *Linn. Syst. natur.*
edit. Stockh. 2da. p. 36.

Lupus. Aldr. quadr. 144. Jonst. quadr. 89. Raj. quadr. 173.
Austr. Wolf.

Habitat in sylvis majoribus; & inter arundines præsertim circa lacum Nischiteriensem. Quare duplex a venatoribus varietas recensetur: quæ inter arundines corpore quidem minor, & magis grisea, ferocior tamen Rohrwolf nuncupatur.

Vicitat carnibus potissimum.

CANIS pilis cervicis erectis longioribus. *Linn. Syst. natur. 5.*
Hyæna s. Taxus porcinus. Kampf. 407. f. 4.
Austr. Indianischer Wolf.

Hospitabatur olim in vivario S. P. Eugenii Viennæ.

Vicitabat carnibus.

Observatio. Pili quoque in dorso erecti, rigidi, longissimi.

CANIS cauda erecta. *Linn. Syst. natur. 5. Fn. Suec. 14.*

Canis cauda erecta longitudine corporis. *Linn. Syst. natur. edit. Stockh. 2. p. 36.*

Vulpes. Gesn. quadr. 55. Aldr. quadr. 195. Jonst. quadr. t. 56. Rai. quadr. 177.

Austr. Fuchß.

Habitat in montibus, & sylvis ubique secundum ætatem, sexum, vehementius, remissiusque hyemale tempus colore varians. Unde & caudæ extremitas in adultis nigra, in junioribus unicolor, in his qui in alpibus tegunt hyberno tempore dum plantitiem petunt, sæpius alba. Vicitat carnibus, fructibus.

M E L E S.

MELES unguibus anticis longissimis. *Linn. Syst. natur. 6.*
Fn. Suec. 15.

Meles. Gesn. quadr. 686.

Taxus. Aldr. quadr. 264. Jonst. quadr. t. 64.

Taxus seu Meles. Rai. quadr. 185.

Austr. Dachß.

Habitat ubique fere in sylvis depressis lapidosis, & circa vineas. Vicitat potissimum fructibus.

E R I N A C E V S.

ERINACEUS auriculatus. *Linn. Syst. natur. 6.*

Erinaceus spinosus auriculatus. Fn. Suec. 16.

Erinaceus. Jonst. quadr. 119. t. 68.

Echinus s. Erinaceus terrestris. Rai. quadr. 231.

Echinus terrestris. Gesn. quadr. 368. Aldr. quadr. 459.
Austr. Igel.

Habitat ubique in sylvis, campis, & ad sepes.

Victitat muribus, scarabæis, astacis, fructibus. Duas venatores
varietates numerant, unam ore fuillo. Samigl, alteram canino
Hundsigl.

TALPA.

I. *TALPA caudata.* Linn. Syst. natur. 7. Fn. Suec. 17.

Talpa. Gesn. quadr. 231. Aldr. quadr. 451. Jonst. quadr.
118. Raj. quadr. 236.

Austr. Scheer, Scheermauß, Maulwurf.

Habitat sub terra in pratis, agris, hortis.

Victitat lumbricis.

VESPERTILIO.

I. *VESPERTILIO caudatus, ore nasoque simplici.* Linn. Syst.
natur. 7. Fn. Suec. 18.

Vespertilio. Bellon. av. 147. Gesn. av. 694 Aldr. orn. 1.
p. 571. Jonst. av. 34. Raj. quadr. 243.

Austr. Fledermauß.

Habitat in cavis arboribus, turribus, cavernis, ac murorum.
rimis. Victitat phalanis.

GLIRES.

HYSTRIX.

I. *HYSTRIX manibus tetradactylis, plantis pentadactylis, ca-
pite cristato.* Linn. Syst. natur. 9.

Hystrix. Rai. quadr. 206.

Austr. Stachel-Schwein.

Hospitabatur olim in vivario S. P. Eugenii Viennæ.

Victitat - - - -

SCIVRVS.

I. *SCIVRVS palmis folis saliens.* Linn. Syst. natur. 9. Fn.
Suec. 21.

Sciurus. Gesn. quadr. 13. Jonst. quadr. t. 66.

Sciurus vulgaris. Raj. quadr. 214.

Austr. Eichhorn, Eichfagl.

Habitat ubique fere in sylvis potissimum tamen in quercubus, pi-
nis, juglande, colore rufo, fusco, & nigro varians.

Victitat fructibus.

2. SCIV-

2. *Sciurus hypochondriis prolixis volitans.* Linn. Syst. natur. 9. Fn. Suec. 22.

Austr. fliegendes Eichfähl.

Hospitabatur olim in vivario S. P. Eugenii Viennæ.
Victitat fructibus.

L E P V S.

1. *Lepus cauda nulla.* Linn. Syst. 9.

Cuniculus brasiliensis Tapeti dictus. Raj. quadr. 205.

Austr. Meerschwein, Meersardl.

Hospitatur passim in domibus.

Victitat oleraceis, graminibus.

2. *Lepus cauda abrupta, pupillis atris.* Linn. Syst. natur. 9.
Fn. Suec. 19.

Lepus. Gesn. quadr. 69. Aldr. quadr. 247. Jonst. quadr. t. 65.
Raj. quadr. 204.

Austr. Hase, Feldhase.

Habitat in sylvis, campis, vineis.

Victitat oleraceis, graminibus, avena.

Duplex ejus varietas occurrit, vulgaris, qua omnes fere campi austriaci abundant, magis rufescit, nec hyeme colorem mutat, alia vero, quæ hyeme tota albet, nec æstivo tempore rufescit, sed pallidior, & magis grisea est, in locis montanis Styriæ vicinis subinde reperitur Dresdæ autem in Saxonia vulgaris.

3. *Lepus cauda abrupta, pupillis rubris.* Linn. Syst. nat. 9.
Lepus cauda brevissima, pupillis rubris. Fn. Suec. 20.
Cuniculus. Gesn. quadr. 72. Aldr. quadr. 382. Jonst. quadr. t. 65. Raj. quadr. 205.

Austr. Künigshase, Kaninchen.

Habitat in cavernis in monticulo regio Enzersdorffensi & circa Simering & Schwandorff, adhuc : olim passim nunc autem ob causata in vineis, agrisve, & hortis damna extirpatus. Ubique fere in domibus. albi, rufi, grisei & nigri coloris quorum ultimorum pupilla atra est.

Victitat oleraceis, graminibus.

C A S T O R.

1. *Castor cauda ovata plana.* Linn. Syst. natur. 10. Fn. Suec. 23.

Castor. Gesn. ichth. 185. Jonst. ichth. t. 68.

Castor f. Fiber. Raj. quadr. 202.

Austr. Biber.

Habitat in fluviis variis. Ad peninsulam tamen Fischamenten-
fern

sem majorem domicilium construxisse reperivi, dum plures populi, & alni ramos devotos, ac cortice exutos, una cum castoris vestigiis ad ripam danubii observavi. Anno 1712. copiose reperiebatur Ebenfurti versus pontem vulgo die Wasen-Brucke in fluvio Leyta.

Victitat corticibus populi, alni, sorbi &c.

M V S.

1. Mus cauda brevi, corpore nigro fusco, abdomine cinerasciente. *Linn. Syst. natur. 10.*

Mus agrestis, capite grandi, brachyuros. *Raj. quadr. 218.*
Austr. Erzeisl.

Habitat sub terra in pascuis, & in agris. Victitat granis.

2. Mus cauda longa pilosa, auribus subrotundis vellere brevioribus. *Linn. Syst. natur. 10. Fn. Suec. 29.*

Austr. Wassermauß.

Habitat circa Leytæpontum, sub terra, & in aquis, unde a piscatoribus sæpius capitur. Victitat corticibus radicum diversarum arborum: hinc hortulanis adeo exosus.

3. Mus cauda longa subnuda, corpore fusco cinerasciente. *Linn. Syst. natur. 10. Fn. Suec. 28.*

Mus domesticus major. *Gesn. quadr. 109.*

Mus domesticus major seu Rattus. *Raj. quadr.*

Glires. Jonst. quadr. t. 66.

Austr. Ratte.

Habitat in cellis, horreis, & stabulis.

Victitat granis, carnibus, oleraceis, fructibus.

4. Mus cauda longa corpore nigro flavesciente, abdomine albo. *Linn. Syst. natur. 10. Fn. Succ. 30.*

Mus domesticus medius. *Raj. quadr. 218.*

Austr. Mauß mit weissen Bauch.

Habitat in pagis, hortis, & sylvis alias minus frequens sed anno 1753. ubique in campis, & hortis circa Leytæpontum reperiebatur. Victitat granis, oleraceis, fructibus, corticibus ficus. An carne?

5. Mus cauda nudiuscula, corpore cinereo fusco, abdomine subalbesciente. *Linn. Syst. natur. 10. Fn. Suec. 31.*

Mus domesticus vulgaris s. minor. *Raj. quadr. 218.*

Austr. Mauß, & dum in campis tegit Feldmauß.

Habitat ubique in domibus, horreis, campis, & sylvis.

Victitat granis, glandibus, carne corticibus ficus &c.

Variat corpore albo pupillis rubris.

6. Mus

6. Mvs cauda pilosa elongata, corpore rufo, gula albicante. *Linn. Syst. natur. 10. Fn. Suec. 32.*

Mus avellanarum minor. *Raj. quadr. 220.*

Austr. rothe Waldmauß.

Habitat in sylvis, præsertim in sylva Dornbacensi frequens.

Victitat glandibus.

7. Mvs cauda elongata, corpore cinereo rutilo nigroque longitudinaliter vario. *Linn. Syst. natur. 10.*

Cricetu. *Raj. quadr. 221.*

Austr. Krietsch, Hamster.

Habitat in campis, & in marginibus agrorum passim.

Victitat graminis fructibus, gramine.

8. Mvs cauda elongata nuda, corpore rufo. *Linn. Syst. natur. 10.*

Mus alpinus. *Raj. quadr. 221.*

Austr. Mummelhier.

Hospitatur subinde Viennæ ex Carniola, Carinthia, & Tirole allatus.

Victitat oleraceis, fructibus.

S O R E X.

I. SOREX. *Linn. Syst. natur. 10. Fn. Suec. 33.*

Mus araneus. *Gesn. quadr. 747. Aldr. quadr. 441. Jonst. quadr. t. 66. Raj. quadr. 239.*

Austr. Spitzmauß.

Habitat in sylvis, & cavernis passim, præsertim in valle Breinina.

Victitat - - - - -

J V M E N T A.

R H I N O C E R O S.

I. RHINOCEROS cornu unico conico. *Linn. Syst. natur. 11.*

Austr. Rhinoceros.

Hospitabatur 1750. & 1751. a batavo allatus Viennæ.

Victitabat feno, pane.

E Q V V S.

I. EQVVS cauda undique fetosa. *Linn. Syst. natur. 11. Fn. Suec. 34.*

Equus, Caballus, Equa. *Gesn. quadr. 132.*

Equus, *Aldr. quadr. 12. Raj. quadr. 62.*

Austr. Pferd.

Habitat ubique in Civitatibus, oppidis, & pagis.

Diversæ ejus sunt varietates secundum provincias ex quibus primo allatæ.

Viçtitat granis, graminibus, feno.

2. *Eqvvs* cauda extrema setosa. Linn. Syst. natur. 11. Fn. Suec. 35.

Asinus. Gesn. quadr. 40. Aldr. quadr. 295. Jonst. quadr. 12. t. 6. Raj. quadr. 63.

Austr. Esel.

β. *Mulus*. Raj. quadr. 64.

Austr. Maulthier, Maulesel.

Habitat in pagis, β. in magnatum prædiis, Equæ, & *Asini* sexu quidem distincta, sed sterilis progenies.

Viçtitat granis, feno, carduis. &c.

S V S.

1. *Svs* dorso antice setoso, cauda pilosa. Linn. Syst. natur. 12. Fn. Suec. 36.

Aper. Gesn. quadr. 146. Aldr. bisulc. 1013. Jonst. quadr. 56.

Austr. Wildschwein, Wildsau.

β. *Sus*. Aldr. bisulc. 937. Jonst. quadr. 47. Gesn. quadr. 872.

Sus s. *Porcus domesticus*. Raj. quadr. 92.

Austr. gemeines Schwein, einheimische Sau.

Habitat ubique in sylvis, præsertim in insulis danubialibus, & ad ripam ejus sitis. β. ubique ab æconomis alitur.

Variat β. 1. auribus parvis acutis antice porrectis, secundo magnis largis semidependentibus &c.

Observatio an *Aper* à *Porco* domestico specie differt propter setarum profundiorum radicationem, lardique absentiam hinc integumentorum communium diversam structuram?

Viçtitat granis, glandibus, pontis, herbis, radicibus, carnibus, piscibus.

P E C O R A.

C A M E L V S.

1. *CAMELVs* topho dorsi unico. Linn. Syst. natur. 13.

Camelus unico in dorso gibbo. Raj. quadr. 143.

Austr. Kamel.

Hospitabatur Viennæ à nuntio turcico 1740. allatus.

Viçtitabat granis, feno, gramine, frondibus.

2. *CAMELVs* tophis dorsi duobus. Linn. Syst. natur. 13.

Austr. Drampthier.

Hospitatur in vivario Augustissimi nostri Imperatoris Belifonti. Viçtitat iisdem.

CER

CERVVS.

1. CERVVS cornibus ramosis teretibus incurvis. *Linn. Syst. natur. 13. Fn. Suec. 38.*

Cervus. *Gesn. quadr. 79. Jonst. quadr. t. 31. Raj. quadr. 84. Austr. Hirsch.*

Habitat ubique in sylvis.

Victitat graminibus, oleraceis, rapis; hyeme fæno, corticibus, & gemmis arborum.

2. CERVVS cornibus ramosis teretibus: summitatibus palmatis. *Linn. Syst. natur. 13. Fn. Suec. 40.*

Rangifer. *Gesn. quadr. 130.*

Tarandus. *Aldr. bisulc. 859.*

Cervus palmatus. *Jonst. quadr. t. 37.*

Cervus Rangifer. *Raj. quadr. 88.*

Austr. Menuthier.

Hospitabatur olim in vivario S.P. Eugenii, ex Moscovia in donum missus.

Victitabat gramine muscis: in Lapponia teste celeberrimo Linnæo per hyemem Lichenibus.

3. CERVVS cornibus ramosis compressis: summitatibus palmatis: *Linn. Syst. natur. 13. Fn. Suec. 40.*

Cervus platyceros. *Raj. quadr. 85.*

Dama vulgaris platyceros. *Gesn. quadr. 84.*

Dama. *Aldr. bisulc. 741. Jonst. belg. 31.*

Austr. Dendl, Zannhirsch, Damhirsch.

Habitat in vivariis magnatum passim.

Victitat graminibus, oleraceis, frondibus.

4. CERVVS cornibus ramosis teretibus erectis. *Linn. Syst. natur. 13.*

Capra, Capreolus, s. Dorcas. *Gesn. quadr. 64.*

Caprea plinii, Capreolus. *Aldr. quadr. 738. Raj. quadr. 89.*

Austr. Reh.

Habitat ubique in sylvis.

Victitat graminibus, oleraceis, frondibus, & hyeme corticibus ac gemmis arborum, fæno visco.

CAPRA.

1. CAPRA cornibus carinatis arcuatis. *Linn. Syst. natur. 14. Fn. Suec. 42.*

Capra. *Gesn. quadr. 57.*

Capra domestica. *Raj. quadr. 77.*

Caper. Aldr. bisulc. 619.

Hircus. Jonst. quadr. 27.

Austr. mas Boek, fœmina Geiß, Ziege.

Habitat ubique in pagis.

Vicitat graminibus, herbis, arundinibus, fruticum tenellis ramulis, foliis vitis &c.

2. CAPRA cornibus erectis uncinatis. Linn. Syst. natur. 14.

Rupicapra. Bellon. obs. 126.

Austr. Gamse.

Habitat in alpibus gregatim.

Vicitat graminibus, floribus fabarum, radicibus, præsertim radice Athamanthæ Meum alias dictæ.

Observatio: *Ægagropilæ* genuinæ figuræ sunt oblongæ: intus fibrosæ fusco-viridis coloris: externe pellicula nigra instar vernicis splendente tectæ; hæ in rupicapris alpes *Athamantia* carentes inhabitantibus nunquam inveniuntur, quæ tamen in aliis hac radice fibris obsita pascen-
tibus sæpe reperiuntur: Unde harum pilarum originem & effectum præsertim emmenagogum intelligere licet cum vero nec crusta lapidea illis superinducta sit, verum ex meris fibris radicis *Athamantia* (quod præter dicta sapor, & odor prodit) mediante mucosæ cœsophagi & ventriculi rupicaprarum in formam farciminis, non pilæ, sicut adulteratæ, compactis consent; non ad calculos animalium, seu regnum minerale referri possunt sed *Floræ* restitui debent. Talia autem concreta etiam in ventriculis bovum solo fœno per hyemem vicitantium vidi, vel sola structura vegetabili ac *Ægagropilæ* calculis animalium distincta. Hinc nec mirum si *Ægagropilæ* tanquam corpora vegetabilia succo ammoniacalis naturæ gastrico rupicaprarum imprægnata concreta illa terrea in animalibus reperta effectum superant; Miratu potius dignum saburræ in cavitatibus corporis animalis repertas quasdam species tam magni æstimari, unde nescio quæ sibi, & ægrotis promittant medicorum non nulli, qui his miasma venenosum morborum malignorum corrigere, & expellere, venenorum vegetabilium & mineralium fere omnium virus, & vires obtundere, sanitatemque morbo per morbosum ablato restituere posse venatorum narratiunculis decepti arbitrantur: Siquidem omnes calculi *Bezoardici* vocati nil aliud sunt quam terræ paucis sale permixtæ in cavitatibus con-

por

poris animalis præternaturaliter vel ob fibrarum debilitatem, vel organi rugosam fabricam, vel denique ipsius materiæ tenacitatem, & dum pleræque terræ humidum absorbent crustam constituendi capacitatem retentæ, ac potissimum lamellatim collectæ; Quare non immerito & calculos e vesica humana extractos ad *Bezoar* relatos, illisque easdem vires a clarissimo Josepho Montio Historiæ Naturalis, Materiæ medicæ, & Botanici Professore Bononiensi adscriptas fuisse judico, quod ejus distributionem exoticorum simplicium perlegenti patebit: in cujus parte prima plantarum indicibus Bononiæ 1724. editis appensa numero secundo legit: *Bezoar microcosmi. Calculi e Vesica humana.* 3. 15. 17. 19. Quibus numeris vires præfati calculi completitur: nimirum in Elenchi Classe tertia p. 26. *Bezoar* species omnes, hinc & calculus humanus, alexipharmacæ dicuntur. In Classe 15. *Bezoar* omnes cordiales, & stomachici nuncupantur. In Classe 17. *Bezoar* omnes diaphoretici vocantur. In Classe 19. *Bezoar* omnes edulcorantes creduntur. Cur autem inter diuretica solo excretionis loco a diaphoreticis distincta, ad quam tamen Classem merito ut excrementa terrestria æconomix animali inimica hinc urina excernenda referri potuissent, fuerint omitti ignoro. Quibus consideratis quale auxilium ab hac causa morbi jam huic corpori animali, cui inhærebat inimica in curandis morbis sperandum erit? Sane idem quod sibi quidam Friderici Hoffmanni discipuli terras absorbentes ad calculi molem augendam potius, quam vi diuretica expellendam aptas in nephritide calculosa exhibentes compromittere possunt.

. CAPRA cornibus nodosis in dorsum reclinatis. *Linn. Syst. natur.* 14.

Ibex. *Raj. quadr.* 79.

Austr. *Steinbock.*

Hospitabatur olim in vivario S. P. Eugenii.

Vicitabat gramine, frondibus, granis.

O V I S.

. OVIS cornibus compressis lunatis. *Linn. Syst. natur.* 15.
Fn. Suec. 43.

Ovis. *Aldr. bisulc.* 370. *Gesn. quadr.* 138. *Jonst. quadr.* 38.

Ovis domestica. Raj. quadr. 73.

Austr. Schaaf.

Habitat ubique culta.

Victitat gramine, herbis, per hyemem foliis vitis, feno, stramine.

2. *Ovis cornibus erectis spiralibus. Linn. Syst. natur. 15.*

Strepsiceros Aries cretensis. Bellon. obs. 1. c. 14.

Austr. Zackl.

Habitat in Hungaria vulgaris.

Hospitatur copiose & fere unica in domibus lanionum austriacorum inde allata.

Victitat iisdem.

B O S.

1. *Bos cornibus teretibus flexis. Linn. Syst. natur. 15. Fr. Suec. 44.*

Bos. Aldr. bisulc. 13. Gesn. quadr. 25.

Bos domesticus. Raj. quadr. 70.

Austr. Dchs.

Habitat ubique cultus.

Victitat graminibus, plantis paludosis, feno, stramine, fursure

Duplex in Austria varietas occurrit, una collo brevi, & crasso, pedibus respectu corporis brevioribus; cornibus in mar brevissimis haud flexis, fusca, rufa, vel nigra steyrische Dchs, alia vero collo & cornibus respectu corporis longioribus, pedibusque altioribus ungarischer Dchs nuncupata; Hæ in pagis ac oppidis circa confinia Hungarica sitis potissimum observatur, illa vulgaris est.

2. *Bos juba longissima, cornibus in se flexis. Linn. Syst. natur. 15.*

Bonafus. Raj. quadr. 71.

Austr. Muer = Dchs.

Hospitabatur olim in vivario S.P. Eugenii sobolem producens.

3. *Bos cornibus vastis intortis resupinatis. Linn. Syst. natur. 15.*

Bubalus. Raj. quadr. 72.

Austr. Büssl = Dchs.

Hospitatur subinde Viennæ ex Hungaria a lanionibus allatu.

Victitat graminibus, feno.

CLASSIS II.

AVES

ACCIPITRES.

STRIX.

1. **S**TRIX capite aurito, corpore rufo. *Linn. Fn. Suec. 45.*
Bubo primus. Gesn. av. 234. Willugb. ornith. 62. n. 12.
Bubo. Bellon. av. 25. a.
Austriacis Buhu.
Habitat subinde in petris sylvarum, & montium circa Scotto-
Viennam, & confinia Styriæ.
Hospitatur autem ubique in domibus venatorum, qui hac utun-
tur ad alias aves prædantes alliciendas, & dein Sclopeto ene-
candas.
Viçtitat avibus, gliribus.
2. **S**TRIX capite aurito pennis sex. *Linn. Fn. Suec. 47.*
Asio, Otus. Bellon. icon. 25.
Otus f. Noctua aurita. Willugb. orn. 64. f. 12.
Otus f. Noctua aurita, Asio latinis. Raj. av. 25. n. 2.
Austr. Horn = Eule.
Habitat in sylvis, cavis arboribus, & in domibus desertis.
Viçtitat avibus, gliribus, vespertilionibus.
3. **S**TRIX capite subaurito, corpore ex nigro albo, & fusco
tenuissime undulatum mixtis variegato.
Austr. Wald = Müssl. Bononiensibus Giu.
Habitat in cavis arboribus apud nos varius.
Viçtitat aviculis.
Descriptio. Magnitudo merulæ, color exacte Caprimulgi,
vel Torquillæ, caput dum vivit, pennis erectis non ta-
men rigidis aures referentibus ornatum, quæ vero cum
teneræ sint, & componi possint in cadavere haud ob-
servantur.
4. **S**TRIX capite lævi pone aures circuli segmento nigro e
pennis singularis structuræ, dorso ferrugineo.
Strix capite lævi, corpore ferrugineo; oculorum iridi-
bus atris, remigibus primoribus ferratis. Linn. Fn.
Suec. 48.
Ulula. Gesn. av. 773. Aldr. ornith. 8. c. 6.

Ulula Aldrovandi. *Willughb. ornith. 68. t. 13.*

Ulula latinis. *Raj. av. 26. n. 4.*

Austr. Nacht = Eule, gemeine, oder kleine Eule.

Habitat in cavis arboribus, autumnno in terra inter scirpos, & in carectis.

Victitat avibus, gliribus, vespertilionibus.

5. **STRIX** capite lævi, facie alba, pone aures circuli segmento ochreo e pennis singularis structuræ, dorso cærulescente.

Austr. Schleuer = Eule, Schleuer = Muffe.

Habitat in turribus, templis, antiquis ædificiis murisque præ-altis.

Victitat gliribus, vespertilionibus, passeribus.

DESCRIPTIO. Magnitudo Corvi. Facies alba utrinque tamen linea fusca a naribus ad aures extensa oculos ambit, pone aures circuli segmentum eleganter ochreum e pennis singularis structuræ compositum caput, gulamque cingit, in parte anteriore maculis quibusdam nigris secundam quasi lineam constituentibus notatum. Oculorum irides atræ; pectus ochreum hinc inde maculis fuscis, albisque adpersum, abdomen pallidius; Vertex & dorsum ex griseo cærulescunt & undulis, minutissimisque punctis nigris ac albis maculantur. Remigum fere omnium præsertim tamen primorum pars exterior ochrea fasciis griseocæruleis ut vertex & dorsum maculatis, pars interior alba quatuor tamen semifasciis fuscis notata extremitatibus griseis. Rectrices ochreæ fasciis quatuor pariter ita maculatis: pars illarum exterior grisea. Subtus Remiges, & Rectrices transparentibus fasciis pallent. Pedes lanati ochrei versus digitos magis albentes, ungues nigri.

An Strix capite lævi corpore luteo. *Linn. Fn. Suec. 49.*

6. **STRIX** capite lævi; corpore fusco, remigibus albis maculis quinque ordinum. *Linn. Fn. Suec. 53.*

Noctua. *Gesn. av. 620. Aldr. ornith. l. 8. c. 7.*

Austr. Tschavatl, Rauglein.

Habitat in cavis arborum, potissimum vero in dirutis ædificiis, turribus templorum, mæniis, & horreis.

Victitat gliribus, vespertilionibus, passeribus, grillis seu locustis.

7. **STRIX** capite lævi, corpore griseo.

Bubo secundus. *Aldr.*

Austr.

Austr. Wald = Muffe.

Habitat in cavis arboribus sylvarum.

Viſitat avibus gliribus.

ANNOTATIO. Magnitudo Gallo major; pupillæ nigræ iris cæruleſcens, corpus griseum. Cæterum cum aldrovandi, aliorumque authorum opera ad manus nunc rurantis non ſint, omiſſum paginæ numerum non ſolum hac vice ſed quotieſcumque contigerit condonare benevolus lector rogatur.

8. STRIX capite lævi, corpore rufo.

Austr. Stein = Muffe.

Habitat in ſylvis montanis.

Viſitat iisdem.

ANNOTATIO. Magnitudo præcedentis ſeu Gallo major. Corpus ſupra fuſcoferrugineum, inferne rufoſtaceum maculis nigricantibus oblongis adſperſum, Remiges & Rectrices nigris albidisque faſciis ornata. Supercilia & genæ ruſæ; pupilla nigræ, iris cæruleſcens.

F A L C O.

1. FALCO cera lutea; pedibus lanatis; corpore rufo. Linn.

Fn. Suec. 56.

Aquila Germana. Gefn. av. 168.

Aquila Gefneri ſ. Chryſætos aquila. Jonſt. av. t. 1.

Chryſætos. Willugb. ornith. 27. t. 1. Raj. av. 6. n. 1.

Austr. Stein = Adler.

Habitat in petris altis & præruptis rarius, ſæpius tamen hyberno tempore in ſylvis.

Viſitat avibus, & quadrupedibus etiamnum pridem emortuis.

2. FALCO, pedibus ceraque cæruleis; corpore ſupra fuſco, capite albo. Linn. Fn. Suec. 57.

Falco cui pedes cærulei. Cyanopoda. Gefn. av. 74.

Haliætus. Aldr. ornith. l. 2. c. 3.

Morphnos. ejusdem l. 2. c. 7.

Balbufardus. Willugb. ornith. 37. t. 6.

Balbufardus anglorum. Raj. av. 16. n. 3.

Austr. Blaufuß.

Habitat inter arundines.

Viſitat avibus aquaticis.

OBSERVATIO Capitis, remigum primorum, & ſubinde Rectricum, totiusque corporis color albus a climate frigidiore & ſolis defectu dependere, non tantum ex avi-

bus septentrionem inhabitantibus & autumnno vel hyeme austriam petentibus constat, verum etiam sequenti experimento confirmatur: dum acupes nostri aves per æstatem in cellis subterraneis, aliisque locis frigidioribus, & obscuris custodiunt, ac illis, ne canant, remigum & rectricum aliquas extrahunt, quæ in his locis sole carentibus iterum crescentes albescent, præsertim in *Emberiza flava*, utpote quæ hac ratione dum autumnno eximitur, & radiis solaribus, ut canat ac ad alias allicendas aptior fiat exponitur sæpe semialbescit.

3. *FALCO* cera flava, rectricibus albis versus apices nigris.
Linn. Fn. Suec. 58.

Pygargus. Bellon. icon. 15. Gesn. av. 205. Raj. av. 7. n. 5.

Pygargus s. *Albicilla*, quibusdam *Hinnularia*. *Willugd. ornith. 31.*

Austr. Gamsen = Geyer.

Habitat subinde asperrima tantum hyeme apud nos.

Hospitatur in vivario Ebergassingenfi S. P. de Lichtenstein, ex Polonia allatus.

4. *FALCO* cera flava; cauda forcipata, corpore ferrugineo, capite albidior. *Linn. Fn. Suec. 50.*

Milvus. Gesn. av. 610. Aldr. ornith. 368. t. 1. Willugb. ornith. 41. t. 6. Raj. av. 17. n. 6.

Austr. Rother Milou.

Habitat ubique vulgaris.

Vicitat avibus, quadrupedibus minoribus.

DIFFERT a sequente primo magnitudine *Galli* majoris. Secundo pedibus brevioribus & fortioribus, tibiisque semitectis. Colore in dorso & alis ferrugineo magis, ubi alter fuscus est. Tertio cauda forcipata rufa, rectricibus intermediis vel immaculatis, vel parum tantum ad rachin variegatis, sequentis vero cauda subfurcata est rectricibus omnibus fasciatis. Quarto, alis subtus alben-
tibus, quæ in sequente nigro-fuscæ sunt. *Iris flava. Palatus luteus.*

5. *FALCO* cera flava, cauda subfurcata fasciata, corpore castaneo-ferrugineo, capite albidior.

Austr. Brauner Wald = Geyer.

Habitat in sylvis majoribus & montanis, præsertim hyeme.

Vicitat avibus, gliribus.

DESCRIPTIO. Magnitudo gallinæ, caput albidum pennæ acuminatis rachi, & apicibus nigris (citra rufi coloris mixturam

turam in priore vero apices albidī & rufus color admixtus eſt) *Pectus* longis pennis caſtaneis rachi nigra veſtitum, *femora* & *abdomen* autem pennis ferrugineis rachi nigra. *Remiges* ſupra & ſubtus nigro - fuſcæ, quæ in præcedente ſubtus albenſ. *Dorſum* fuſcum. *Rectrices* omnes fuſcæ faſciis 7. vel 3. obſcurioribus, inferius cinereo fuſcæ faſciis transparentibus: *Cauda* ſubfurcata. *Pedes* lutei; unguēs nigri, *tibiæ* parum plumoſæ, quarum media pars in præcedente plumis tegitur. Quamquam *tibiæ* in hoc altiores ſint quam in præcedente, ſuperantur tamen altitudine a pedibus ſubſequentis ſeu ſeptimi. *Iris* lutea. *Palatus* luteus.

6. **FALCO** cera flava; capite corporeque caſtaneo pennarum rachi nigra, *Rectricibus* fuſcis faſciis nigris; apicibus albis.

Auſtr. Brauner Milon. Brauner Geyer.

Habitat in ſylvis.

Viſtat avibus, gliribus.

DESCRIPTIO. *Magnitudo* Falconis cauda forcipata, ſeu quarti, figura eadem. *Roſtrum* verſus apicem nigrum, ad baſin, ut & cera, flavum; *palatus* cæruleus; *frons* albidā maculis bruneis, *gula* ejusdem coloris. Utrunque inter roſtrum & oculos maculæ duæ nigricantes, *iris* nigricans. Cæterum *caput*, *collum*, *dorſum*, *pectus*, & *alæ* caſtaneæ pennarum rachi nigra. *Abdomen* & *urropygium* teſtaceo bruneum maculis obſcurioribus, ſeu magis bruneis. *Remiges* primores maxima ex parte nigræ verſus baſin tamen, & ubi teguntur albæ faſciis fuſcis. *Pedes* flavi: *Tibiæ* ad medium uſque pennis teſtæ unguēs nigri.

Differt a 4to præter reliqua iride in hoc nigricante in illo flava. Cauda non forcipata nec ferruginea, ſed tantum ſubfurcata atque faſciis pluribus nigricantibus ornata, apicibusque *rectricum*, & *remigum* ſecundariarum albis, nec *pectus* ut in illo rufum, ſed caſtaneum.

a 6to iride nigricante in alio lutea. Capite concolore quod in illo albet, *Rectricum* & *Remigum* ſecundariarum apicibus albis; *Tibiis* brevioribus & ad medium fere pennis teſtis palatoque cæruleo, in illo luteo, nec cauda hujus ut illius ſubfurcata.

a 7mo ſeu ſequentē iridibus in hoc nigricantibus, in

sequente flavis, basi manillarum canthoque oris flavis, in sequente sola cera flava est basis maxillarum, & canthus oris autem cæruleus. Abdomen in hoc non ferrugineum ac in sequente, sed testaceum maculis bruneis. Pennarum pectus vestientium rachis in hoc nigra, in illo concolor. Cauda fasciis ornata, quæ in sequente simpliciter testacea est. Præterea pedes in hoc breviores fortiores, Tibiæ ad medium fere plumis testæ.

7. **FALCO** cera flava corpore subtus ferrugineo, superne fusco, capite concolore, rectricibus testaceis.

Austr. Brauner Rohr-Geyer.

Habitat inter arundines.

Vicitat avibus aquaticis.

DESCRIPTIO. Magnitudo quarti, seu Gallinæ; caput, collum, pectus, dorsum, & alæ fuscæ, nucha albida, femora & abdomen ferruginea; cauda testacea ad urrhopygium alba maculis bruneis. Rostrum cæruleo nigrum, cera flavescens, palatus cæruleus, irides, & pedes flavi, ungues nigri.

Differt a quarto, & quinto.

1. Capite fusco, quod in illis albet, nec in hoc pennis acuminatis sed subrotundis tegitur.
2. Tibiis altioribus.
3. Cantho oris & palato cæruleis in quinto lutei coloris.
4. Cera ex flavo quasi virescente, quæ in aliis vividius flavet, & quasi ad fulvum declinat.
5. Cauda nec forcipata, nec subfurcata, nec rufa, nec fasciis donata, sed testacea.
6. Pennis abdomen & pectus vestientibus rachi nigra destitutis.

Cæterum quinto adeo similis, ut & a venatoribus minus expertis ejusdem speciei credatur.

8. **FALCO** pedibus flavis; corpore cinereo, maculis fuscis; cauda fasciis quatuor. *Linn. Fn. Suec. 60.*

Falco gentilis i. e. nobilis dictus. *Willughb. ornith. 46.*

Raj. av. 13.

Falco montanus. *Willughb. ornith. 45. t. 5.*

Austr. Galf.

Habitat autumnno, & initiant hyeme subinde in montibus.

Hospitatur autem Laxenburgi ad capiendas ardeas, aliaque animalia a venatoribus S. C. M. suæ nutritus.

Vicitat avibus, quadrupedibus.

9. **FAL-**

9. *FALCO* rostro nigro; pedibus luteis; corpore supra fusco, subtus albido - cinereo maculis transversis. *Linn. Fn. Suec. 62.*

Gyrfalco. Willughb. ornith. 44. Raj. av. 12. n. 3.

Austr. Gesprängter Falk, Baum = Falk.

Habitat vere, & autumnno apud nos, transmigrans.

Vicitat avibus.

10. *FALCO* cera lutea; pedibus exceptis digitis lanatis, corpore testaceo maculis nigris, capite & collo albidioribus.

Austr. Schnee = Geyer, Rauchfuß, Moos = Geyer.

An Falco cera luteo-viridi, pedibus luteis, corpore ferrugineo, vertice fulvo. Linn. Fn. Suec. 63. quo ad descriptionem.

Habitat hyberno tempore circa paludes.

Vicitat avibus.

DESCRIPTIO. *Magnitudo Galli, caput, collum & pectus ochreo-album maculis longitudinalibus nigris, abdomen & præsertim hypochondria nigra in aliis nigro maculata. Alarum remiges primores latæ mox versus apicem angustæ ita ut interna parte quasi lobatæ videantur: latere interiore excepto nigro apice albæ, exteriori cinereo nigræ rachi alba. Subtus ejusdem coloris. Remiges secundariæ fusce fasciis nigris. Tectrices alarum rufo testaceo & nigro maculatæ. Cauda ultra medium alba versus apicem fusca margine testaceo in aliis fasciis 5. nigricantibus. Uropygium & anus albi raris maculis fuscis testaceisque. Tibiæ plumis tectæ testaceis lituris maculisque irregularibus nigris. Digiti lutei, unguibus nigris: ungue pollicis & digiti interioris reliquis majoribus fortioribus. Rostrum nigro cæruleum fortissimum. Cera lutea. Iris nigricans.*

11. *FALCO* cera pedibusque luteis dorso fusco, pectore pallido maculis longitudinalibus fuscis. *Linn. Fn. Suec. 65.*

Buteo. Gesn. av. 46.

Buteo vulgaris. Willughb. ornith. 38. t. 6.

Buteo vulgaris s. Triorchis. Raj. av. 16. n. 2.

Austr. Wald = Geyer.

Habitat passim in sylvis.

Vicitat avibus, quadrupedibus, serpentibus.

12. *FALCO* cera luteo viridi; cinereus: maculis abdominalibus longitudinalibus ferrugineis.

Austr. Kleiner Spitz-Geyer. Blanes Geyerl.
 Habitat in nemoribus, & circa paludes.
 Victitat passeribus.

DESCRIPTION. Magnitudo corvi; caput, collum, pectus, & dorsum ex cinereo cærulescunt maculis in disco pennarum dorsi fuscis. Alæ cinereæ complicatæ fascia seu linea transversa nigra. Remiges primores sex utrinque atræ. 7-10. cinereæ. 11-22. cinereæ fasciis duabus nigris, quarum superior complicata ala a tectricibus obtegitur, secunda vero prædictam lineam transversam in alis constituit: reliquæ cinereo-fuscæ; inferne omnes exceptis primis sex albæ fasciis tribus cinereis transparentibus. Abdomen album maculis longitudinalibus ferrugineis. Sub alis utrinque pennæ aliquot longæ ferrugineæ maculis albis septem notatæ Rectrices intermediae duæ superne cinereæ rachi fusca: utrinque proximæ duæ parte exteriori cinereæ, ea qua intermediæ respiciunt albidiores fasciis quatuor latis ferrugineo-fuscis pictæ: reliquæ tres utrinque albæ, versus apicem tamen cinereæ, fasciis pariter quatuor ferrugineis. Rachis in omnibus exceptis duabus intermediis varia est, ubi enim rectrices alben pallet, ubi fascia notantur fusca est. Inferne rectrices cinereæ evanescente pededentim cinereo colore ita ut extimæ albescant fasciis cinereis rufisque transparentibus: rachis in omnibus subtus alba. Femora pennis albis rachi ferruginea donatis tecta. Pedes flavi, ungues nigri. Rostrum nigrum. Cera luteo-viridis & subinde in quibusdam luteo-nigricans seu lividi coloris observatur. Iris flava.

13. FALCO cera flavo-viridi; testaceo, ferrugineo, & fusco varius; abdomine pallido maculis longitudinalibus ferrugineis.

Austr. Kleiner Spitz-Geyer, Kleiner Mohr-Geyer.
 Habitat inter arundines. Victitat aviculis.

DESCRIPTION. Magnitudo corvi majoris seu præcedente duodecimo major. Caput ad latera, & subtus albidum, supra oculos linea utrinque alba: ad aures utrinque macula magna fusca. Vertex ferrugineus maculis nigris: nucha albida. Dorsum fuscum; collum antice & pectus testaceum maculis longitudinalibus fuscis. Abdomen pallidum seu sordide album maculis longitudinalibus ferrugineis; alarum tectrices fuscæ margine ochreo-ferrugineo.

gineo. *Remiges* primores sex superne cinereo fuscæ fasciis quinque nigris: subtus pallide testaceæ fasciis nigricantibus: secundariæ cinereo fuscæ fasciis duabus, vel tribus latioribus nigris, margine albidæ; sub alis pariter ac in præcedente seu duodecimo pennæ aliquot longæ ferrugineæ maculis septem testaceo albis notatæ conspiciuntur. *Urrhopyghii* extremitas seu potius caudæ principium pennis albis tegitur. *Rectrices* intermediae duæ superne testaceo-fuscæ fasciis quatuor fuscis: his utrinque proximæ duæ magis cinereæ fasciis pariter quatuor fuscis: extimæ utrinque tres albæ fasciis quatuor ferrugineo fuscis: *Rachis* in omnibus varia ad fascias fusca, secus testacea, vel in extimis alba. Subtus tectrices pallidæ fasciis transparentibus cinereis, rachi alba. *Rostrum* nigrum ad basin virescens. *Cera* flavo viridis, *femora* pennis testaceis ad rachin ferrugineis testata. *Pedes* flavi. *Ungues* nigri. *Iris* flava. Præcedenti seu duodecimo valde congener an ejus varietas an fæmina? Magnitudine quidem distincta, sed cum in accipitrino genere fæmina semper major mare sit, vix differentia hæc sufficere videtur. Venatores unanimi consensu distinctas species statuunt, cum nulla illis accipitrini generis præter Tinnunculum species innotescat, cujus fæmina a mare colore distinguitur. Ego plures duodecimæ, & decimæ tertiæ speciei examinavi, sed 12. constanter marem, 13. fæminam reperivi. An id per accidens contigerit, an re vera nidum ambo conjuncti struant venturo vere detegere conabor.

14. *FALCO* pedibus seminudis; cera nigra, capite cinereo; cauda fascia cinerea, apice albo. *Linn. Fn. Suec.* 66.

Buteo apivorus, s. *Vespivorus*. *Willughb. ornith.* 38. t. 3. *Raj. av.* 16. n. 2.

Austr. Frosch = Geyerl, Mauß = Geyerl, Bögel = Geyerl.

Habitat in sylvis, & vinearum arboribus.

Victitat aviculis, gliribus, ranis.

15. *FALCO* pedibus ceraque flavis, dorso rufescente; pectore maculis longitudinalibus fuscis; cauda rotundata. *Linn. Fn. Suec.* 67.

Tinnunculus accipiter. *Gesl. av.* 54.

Tin-

Tinnunculus f. Cenchris. *Aldr. ornith. l. 5. c. 6. Willughb. ornith. 50. t. 5.*

Tinnunculus. *Raj. av. 16. n. 16.*

Austr. Windwachtel, Kitzlweyer, Wannenweher.

Habitat in turribus, & muris præaltis præsertim Viennæ in turre Ecclesiæ Metropolitanæ ad St. Stephanum, & ad Scalas Marianas.

Viçitat passeribus, gliribus.

16. FALCO cera viridi; pedibus flavis; pectore albo undulis transversis fuscis, cauda fusca fasciis nigricantibus. *Linn. Fn. Suec. 68.*

Falco fringillarius. *Gesn. av. 51.*

Accipiter fringillanus. *Bellon. icon. 19.*

Accipiter fringillarius f. recentiorum Nisus & Sparverius. *Willughb. ornith. 51. t. 5. Raj. av. 18. n. 2.*

Austr. mas Sprinzel, femina Sperber.

Habitat in turribus, mœniis alibique.

Viçitat passeribus.

PSITTACVS.

1. PSITTACVS cauda corpore sesquolongiore.

Pica indica. *Fonst.*

Austr. Indianischer Rabe.

Hospitabatur olim in vivario S. P. Eugenii.

Viçitat - - - Magnitudo fere gallinæ.

2. PSITTACVS cinereus cauda cuneiformi phænicea.

Psittacus cinereus. *Fonst.*

Austr. Grauer Paperl.

Hospitatur hinc inde in domibus magnatum. Magnitudo corvi majoris.

Viçitat amygdalis, semine cannabis, pane albo &c.

3. PSITTACVS viridis remigibus, rectricibusque introrsum cæruleis, phœniceis, & flavis.

Psittacus viridis. *Fonst.*

Austr. Grüner Paperl.

Hospitatur in domibus nobilium. Magnitudo corvi.

Viçitat iisdem.

4. PSITTACVS viridis cauda longitudine corporis.

Psittacus macrourus. *Willughb.*

Austr. Grosses Peruquetl.

Hospitabatur olim in vivario S. P. Eugenii, & in domibus magnatum. Magnitudo Merulæ. Viçitat iisdem.

5. PSIT-

PSITTACVS viridis, rostro carneo, anteriore capitis parte miniacea.

Austr. Kleines Perquettl.

Hospitabatur olim passim in domibus magnatum, & nobilium Viennæ. Magnitudo curvirostræ.

Victitabat iisdem.

PSITTACVS albus, rostro nigro, capite cristato, crista plicatili lutea.

Austr. Kakatu, a voce quoniam tota die nil præter Kakuta reiterat. Indianischer Wildhops ob caput cristatum.

Hospitabatur olim in vivario S. P. Eugenii. Magnitudo columbæ vulgaris.

Victitabat iisdem.

P I C Æ.

C O R V V S.

CORVVS ater, dorso cærulescente. Linn. Fn. Suec. 69.

Corvus. Gesn. av. 334. Jonst. ornith. 38. t. 16. Willughb. ornith. 82. t. 18. Aldr. ornith. l. 12. c. 1. Raj. av. 31. n. 1.

Austr. Rab.

Habitat in densis & montosis sylvis, hyberno tempore planitiem petens.

Victitabat cadaveribus.

CORVVS ater. Linn. Fn. Suec. 70.

Cornix frugilega. Aldr. ornith. l. 12. t. 3. Raj. av. 39. n. 3.

Cornix frugifera, & frugilega. Willughb. ornith. 84. t. 18.

Austr. Schwarze Kran, schwarze Krähe.

Habitat in sylvis montanis, hyeme ubique juxta vias publicas, & in agris.

Victitabat frugibus.

CORVVS capite gula alis caudaque nigris, trunco cinerascete. Linn. Fn. Suec. 71.

Cornix cinerea frugilega. Aldr. ornith. l. 12. c. 4. Willughb. ornith. 84. t. 77. Raj. av. 39. n. 4.

Austr. Graue Kran, Kranveitl.

Habitat ubique in sylvis præsertim in nemoribus insularum danubialium; hyeme ubique juxta vias publicas pagos, & in agris, ac hortis.

Victi-

Victitat *uvīs, frugibus, cadaveribus, conchis, ranis, erucis, aviculis, ovis & pullis gallinarum, anserum &c.* Uti pleræque hujus generis species.

4. CORVVS fronte nigra; occipite incano; corpore fusco; alis caudaque nigris. *Linn. Fn. Suec. 72.*

Monedula s. Lupus. Willughb. ornith. 85. t. 19. Raj. av. 40. n. 5.

Austr. Egerl. Dohle. Eschockert.

Habitat in sylvis montanis. Hyeme gregatim volitans vias publicas, agros, domos, fimetæ, & hortos petit.

Victitat *frugibus, cadaveribus.*

5. CORVVS alis cauda pedibus rostroque nigris; trunco fusco, excepto vertice, maculis albis guttato.

Caryocatactes. Gesn. av. 245. Raj. av. 42. n. 5.

Caryocatactes. Gesneri & Turneri. Willughb. ornith. 90. t. 20.

Austr. Baldstarl, Steinhöcher. Pistaci Heher.

Habitat in sylvis montosis Helvetiæ, Styriæ, & Austriæ Superioris unde initiant autumno gregatim ad nos volitat.

Victitat *frugibus, glandibus, & præsertim fructu pini sativæ.*

6. CORVVS cæruleo viridis dorso ex rufo lutescente.

Cornix cærulea. Gesn. av. 335. Aldr. ornith. l. 12. c. 5. Willughb. ornith. 85. t. 20.

Garrulus argentoratensis. Aldr. ornith. l. 12. c. 18. Raj. av. 41. n. 3.

Austr. Mandlfran, Meerheher.

Habitat passim in sylvis, & nemoribus danubialibus.

Victitat *frugibus, glandibus.*

DESCRIPTIO Magnitudo picæ glandariæ seu sequentis. Collum, pectus, & abdomen virent, colorem æruginis cupri æmulando, alarum tectrices virides, obvestientes in mare adulto cyanei, quæ vero remigum basin tegunt cælestis coloris sunt: in fæmina & pullis obvestientium basis cærulea discus vero viridis. Remiges primores nigræ, inferius cæruleæ; interiores ochreæ, tergum ochreum in scapulis ad ferrugineum declinans. Urrhopyghium cæruleum. Rectrices virides. Rostrum & pedes fusci, a naribus linea fusca per oculos extensa.

7. CORVVS variegatus, tectricibus alarum cæruleis: lineis transversis albis nigrisque. *Linn. Fn. Suec. 74.*

Pica glandaria l. Garrulus avis. Gesn. av. 700.

Pica glandaria. Aldr. ornith. l. 12. c. 14. Willugb. ornith. 88. t. 19. Raj. av. 41. n. 22.

Austr. Nußheher.

Habitat ubique in sylvis.

Viſitat glandibus, aviculis minoribus &c.

3. *CORVUS* cauda cuneiformi. Linn. Fn. Suec. 76.

Pica. Gesn. av. 695. Jonst. ornith. 44. t. 17.

Pica varia f. caudata. Willugb. ornith. 87. t. 19. Raj. av. 41. n. 1.

Austr. Alster.

Habitat ubique in sylvis, & nemoribus præſertim danubialibus, hyeme juxta domos.

Viſitat frugibus, glandibus, aviculis, & præſertim Gallinarum & anſerum ovis, pullis, quadrupedumque cadaveribus, gliribus.

PICV S.

1. *PICVS* pedum digitis duobus anticis, posticis duobus; corpore nigro vertice coccineo.

Picus niger vertice coccineo. Linn. Fn. Suec. 79.

Picus maximus vel niger. Gesn. av. 708.

Picus maximus. Aldr. ornith. l. 12. c. 31.

Picus niger maximus. Willugb. ornith. 92. t. 21. Raj. av. 42. n. 1.

Austr. Hohlſran, Schwarzſpecht.

Habitat in sylvis montanis in cavis arboribus.

Viſitat erucis, muſcis, formicis &c.

2. *PICVS* pedum digitis duobus anticis; posticis duobus; viridis, vertice coccineo

Picus viridis vertice coccineo. Linn. Fn. Suec. 80.

Picus viridis. Gesn. av. 710. Willugb. ornith. 93. t. 21.

Picus viridis major. Raj. av. 42. n. 2.

Picus viridis nostras. Aldr. ornith. l. 12. c. 34.

Austr. Grünſpecht.

Habitat paſſim in ſylvis, & nemoribus.

Viſitat iisdem, & præſertim apibus.

3. *PICVS* pedum digitis duobus anticis: posticis duobus; albo nigroque varius; vertice nigro.

Picus albo nigroque variegatus, vertice nigro rectricibus tribus lateralibus utrinque albescens. Linn. Fn. Suec. 81.

Picus

Picus varius major. Gesn. av. 708. Willugb. ornith. 94.
t. 21. Raj. av. 43. n. 4.

Austr. Grosses Baumbachl.

Habitat in cavis arboribus.

Victitat iisdem.

4. *Picus* pedum digitis duobus anticis: posticis duobus: albo nigroque varius; vertice coccineo, pube rubra.

Picus albo nigroque varius, rectricibus tribus lateralibus apice albo variegatis. Linn. Fn. Suec. 82.

Picus varius minor. Gesn. av. 708. Aldr. ornith. l. 12. c. 33.
Willugb. ornith. 94. t. 31. Raj. av. 43. n. 5.

Austr. Kleines Baumbachl.

Habitat passim in cavis arboribus sylvarum, & præsertim nemorum danubialium.

Victitat iisdem.

5. *Picus* pedum digitis duobus anticis; posticis duobus; albo nigroque varius; vertice coccineo, pube testacea.

Picus albo nigroque varius; rectricibus tribus lateralibus feminigris. Linn. Fn. Suec. 83.

Picus varius tertius. Raj. av. 43.

Austr. Baumbacherl.

Habitat cum prioribus.

Victitat iisdem.

6. *Picus* pedum digitis tribus anticis: postico uno; albo rubro nigroque varius.

Picus murarius. Aldr. ornith. l. 12.

Austr. Mauerspecht, todten Vogl.

Habitat in antiquis muris, præsertim in cæmeterio Medlingensi ubi in calvariis nidificat.

Victitat iisdem, & præsertim araneis.

Ÿ Y N X.

1. *Jynx.* Gesn. av. 573.

Jynx f. *Torquilla.* Aldr. ornith. l. 12. c. 42. Willugb. ornith. 95. t. 22. Raj. av. 44. n. 8.

Jynx, *Torquilla*, *Turbo*, *Sifopigis.* Bellon. icon. 76. a.
Cuculus subgrisea maculata, rectricibus nigris fasciis undulatis. Linn. Fn. Suec. 78.

Austr. Ratterwindl, Wendelhalß.

Habitat ubique in sylvis, & nemoribus.

Victitat iisdem quibus pici.

CVCVLVS.

1. CVCVLVS rectricibus nigricantibus punctis albis. Linn. Fn. Suec. 77.
 Cuculus. Gesn. av. 363. Aldr. ornith. t. 5. c. 107. Bellon. icon. 22. 6. Willughb. ornith. 62. t. 77. Raj. av. 23.
 Austr. Ruckuck.
 Habitat ubique in sylvis.
 Viçtitat insectis.

VPVPA.

1. VPVPA. Linn. Fn. Suec. 85. Bellon. icon. 72. a. Gesn. av. 776. Aldr. ornith. l. 17. c. 11. Willughb. ornith. 100 t. 24. Raj. av. 48. n. 6.
 Epops, Upupa. Jonst. ornith. t. 42. 27.
 Austr. Widhopf.
 Habitat in sylvis, & pascuis passim, nidificat in cavis arboribus.
 Viçtitat insectis.

ISPIDA.

1. ISPIDA cauda molli.
 Ispida. Linn. Fn. Suec. 86.
 Merops. Bellon. icon. 599. Aldr. ornith. l. 12. c. 45.
 Merops f. Apiafter. Willughb. ornith. 102. t. 24. Raj. av. 49. n. 3.
 Austr. Meerschwalbe.
 Habitat in abruptis littoribus danubii, præsertim in arenosis præcipitiis Fischamentensibus infra vineas & agros nemora danubialia versus sitis, & septentrionem respicientibus. Ova 4. vel 5. alba. Nidus ex muscis confectus, in caverna profunde excavata absconditus.
 Viçtitat insectis præsertim muscis, & culicibus.
2. ISPIDA cauda rigida.
 Certhia. Linn. Fn. Suec. 213. Gesn. av. 251. Aldr. ornith. l. 12. c. 44. Willughb. ornith. 100. t. 23. Raj. ornith. 47. n. 5. Jonst. ornith. t. 42.
 Certhias, Certhius, Reptatrix. Bellon. icon. 98. a.
 Austr. Baumlaufferl.
 Habitat in sylvis passim, in arborum truncis.
 Viçtitat erucis.

ANSERES.

ANAS.

1. *ANAS* rostro plano apice dilatato rotundatoque. *Linn. Fn. Suec. 87.*
Pelecanus f. *Platea*. *Gesn. av. 666. Jonst. ornith. t. 46. Mars. danub. 5. p. 28. t. 12. Raj. av. 102. n. 1.*
Leucoradius f. *Platea*, *Pelecanus* *Ornithologi. Aldr. ornith. l. 20. c. 13.*
Platea f. *Pelecanus*, *Leucorodius* f. *Albardeola. Willughb. ornith. 212. t. 52.*
 Austr. Kößlganß.
 Habitat in fluviis Hungariæ.
 Hospitabatur olim in vivario S. P. Eugenii.
 Viçtitat piscibus.
2. *ANAS* rostro semicylindrico; cera flava; corpore albo. *Linn. Fn. Suec. 88.*
Cygnus, *Cygnus*. *Bellon. icon. 30. a.*
Cygnus. Gesn. av. 372.
Cygnus ferus. Willughb. ornith. 212. Raj. av. 136.
Cygnus. Aldr. ornith. l. 19. c. 1.
 β. *Cygnus mansuetus. Willughb. ornith. 271. t. 69. Raj. av. 136. n. 1.*
 Austr. Schwane.
 Habitat sæpe hyberno tempore in lacu Nischiteriensi.
 Hospitatur β. passim in piscinis magnatum.
 Viçtitat frugibus, piscibus.
3. *ANAS* rostro semicylindrico, basi gibbo. *Linn. Fn. Suec. 89.*
Anser cygneus Guineensis. Raj. av. 138.
Anser hispanicus an potius Guineensis. Willughb. ornith. 275.
 Austr. Türkische Gans, Schwanen Gans.
 Habitat in vivario Ebergassingenli S. P. de Lichtenstein.
 Viçtitat frugibus, piscibus.
4. *ANAS* rostro semicylindrico; corpore supra cinereo sub-
 tus albido; rectricibus margine albis. *Linn. Fn. Suec. 90.*
 α. *Anser ferus. Gesn. av. 158. Aldr. ornith. l. 19. c. 18. Willughb. ornith. 274. t. 69.*
 β. *Anser domesticus. Gesn. av. 141. Willughb. ornith. 273. t. 75. Raj. av. 136. n. 4.*

Austr.

Austr. Wildgans. *B. einheimische Gans.*

Habitat *a. ubique in paludibus, & lacubus. B. ubique ab æconomis culta.*

Victitat *frugibus, piscibus.*

OBSERVATIO duæ varietates an species diversæ dicam? in Austria observantur. Primæ rostrum nigrum ad apicem macula pallida notatum, corpus supra cinereum subtus albidum, rectrices margine albæ, pedes lutescentes, sequente seu secunda specie multo minor. Austriacis Schneegans habitat hæc hyeme in fluviis & lacubus ex frigidioribus provinciis in austriam accedens. Secundæ rostrum lividum seu nigro-luteum, corpus supra cinereum subtus albidum. Rectrices margine albæ, pedes cinereo lutescentes. Austriacis Wild-Gans. Hæc ubique in paludibus habitat vere & æstate, ubi nidificat, autumno avolat nec per hyemem sicut prima manet.

5. ANAS capite colloque nigris. *Linn. Fn. Suec. 91.*

Branta f. Bernicla. *Gesn. av. 110. Aldr. ornith. l. 19. c. 33.*

Bernicla f. Bernacla. *Willugb. ornith. 274. Raj. av. 137.*

Austr. Moth-Gans.

Hospitatur in vivario S. P. de Lichtenstein in arce Ebergassingenfi. Victitat *frugibus.*

6. ANAS cinerea; fronte alba. *Linn. Fn. Suec. 92.*

Austr. Pöhlische Gans.

Habitat *hyemali tempore in fluviis, & lacubus rarius.*

Victitat *frugibus, piscibus.*

7. ANAS fronte tuberosa, palearibus albidis.

Austr. Große Meergans, Arabische Gans.

Habitat in vivario Ebergassingenfi S. P. de Lichtenstein.

Victitat *quibus congeneres.*

DESCRIPTIO magnitudo cygni vel paulo major; color supra cinereus subtus pallidior, per culturam albus, frons tuberosa; palearia duo seu lamellæ duæ flaccidæ membranaceæ ac in gallo domestico albidæ tamen a gula dependent.

8. ANAS rostro coccineo, capite rufo cristato, macula alarum pallide carnea.

Austr. Türkische Ente.

Habitat *vere in lacubus, & fluviis.*

Victitat *quibus congeneres.*

DESCRIPTIO. Magnitudo anatis domesticæ, vel paulo major. Rostrum anserinum coccineum apice maxillæ superioris

rioris incurvato macula pallida: maxillæ inferioris apex pariter macula seu semicirculo pallidiore notatus. *Lingua* apice trilobo obtuso, lateralibus brevioribus, margine ciliato. *Caput* cristatum rufum crista pallidiore. *Collum pectus*, & *abdomen* exceptis hypochondriis fusca; *hypochondria* alba maculis bruneis magnis. *Dorsum*, & alarum tectrices ochreo-bruneæ subcinereæque ac ultimæ remigum. *Urrhopygium*, & *cauda* superius nigro-virent apicibus rectricum pallidis: subtus cinereæ. *Macula* alarum pallide carneæ linea cinereo-fusca distinctæ; *Remiges* superius maxima parte albæ seu pallide carneæ apicibus fuscis: inferius omnino dilutioris carnei coloris, extremitatibus cinereo-fuscis. *Pedes* fusci; *membrana* nigra.

Fœmina Scolopacini coloris est macula alarum albida; *rostrum* fuscum marginibus obsolete coccineis.

9. *ANAS* cauda forcipata pedibus longiore; macula alarum cupreo-fusca.

Austr. Schwalbenschweif.

Habitat hyeme in lacubus, & fluviis.

Vivitat quibus aliæ.

DESCRIPTION. *Magnitudo* anatis domesticæ, vel paulo minor. *Rostrum* & *pedes* nigri. *Caput*, *gula*, & *colli* pars superior ac anterior fusca: in postica colli parte linea nigra a capite ad dorsum extensa, utrinque alia alba, quæ cum reliqua inferioris colli partis albedine unitur. *Pectus* album; *abdomen* pallide cinereum lituris minutissimis albis & nigricantibus: pars ejus utrinque ad *Urrhopygium* & principium caudæ sita pallide ochrea, *dorsum* & *femora* cinerea lituris nigris albisque *Urrhopygium* ejusdem coloris disco tamen pennarum fusco. Ad basin alarum pennæ longæ nigræ limbo utrinque albo. *Humeri* cinerei. *Macula* alarum primo testacea dein fusca antiqui cupri ad instar splendens, tandem nigra, & ultimatim alba. *Remiges* supra fuscae parte interna pallidiore, subtus cinereæ. *Cauda* pedibus longior forcipata, subtus nigra: *Rectrices* cinereæ limbo exteriori albo, mediæ duæ longissimæ acutissimæ nigræ.

10. *ANAS* facie nuda papillosa. Linn. Fn. Suec. 98.

Anas moschata. Rai. av. 150. n. 3.

Anas indica mas. Gesn. av. 122.

Anas indica. Aldr. ornith. l. 19. c. 26.

Anas libyca Bellonii. *Willughb. ornith.* 294.

Austr. Bisen-Ente.

Habitat passim a curiosis, & æconomis culta, præsertim copiose in vivario Ebergassingenfi S. P. de Lichtenstein.

Victitat iisdem.

II. *ANAS* caudæ rectricibus intermediis recurvis. *Linn. Fn. Suec.* 97.

Anas fera torquata minor (mas) *Gesn. av.* 114.

Anas fera torquata major (fæmina) *Gesn. av.* 115.

Boschas major s. *Anas torquata minor.* *Aldr. ornith. l.*

19. c. 15.

Anas fera latine. *Jonst. ornith. t.* 49.

Boschas major. *Willughb. ornith. 84. t.* 72.

Anas torquata minor. *Raj. av. 145. n.* 1.

β. *Anas domestica vulgaris.* *Willughb. ornith. 293. t.* 75.

Raj. av. 150. n. 1.

Anas domesticus. *Jonst. ornith. 143. t.* 49.

Anas cicur. *Gesn. av.* 96.

Austr. Stocf-Ente. β. einheimische Ente.

Habitat ubique in lacubus, fluviis, & paludibus. β. ubique ab æconomis culta.

Victitat frugibus piscibus, & præsertim lenna.

12. *Anas cristata* dependente; corpore nigro; ventre maculæque alarum albis. *Linn. Fn. Suec.* 99.

Anas fuligula prima. *Gesn. av. 107. Willughb. ornith. 280. t.* 73.

Querquedula cristata s. *Colymbus bellonii.* *Aldr. ornith. l. 19. c. 34.*

Anas cristata. *Raj. av. 142. n.* 7.

Habitat rarius apud nos vere, copiosè autem hyemali tempore in lacubus & stagnis Bononiensibus, & Ferrariensibus.

Victitat quibus congeneres.

13. *ANAS* nigro alboque variegata; capite nigro viridi; sinu oris alba macula. *Linn. Fn. Suec.* 100.

Clangula. *Gesn. av.* 119.

Clangula Gesneri. *Aldr. ornith. l. 19. c. 42. p.* 224.

Anas platyrhynchos mas. *eiusdem ornith. l. 19. c. 42. p. 225. Willughb. ornith. 282. t.* 73. *Raj. av. 142. n.* 8.

Austr. Eiß-Ente.

Habitat hyeme ubique in lacubus & fluviis.

Victitat quibus congeneres, & præsertim conchis aquaticis.

14. *ANAS* cinereo, albo, nigroque variegata. capite castaneo.

Austr. Braunköpfge Eiß-Ente.

Habitat hyemali tempore in lacubus & fluviis, præsertim circa lacum Nischiteriensem.

Victitat quibus congeneres.

DESCRIPTION. Magnitudo Penelope paulo major. Rostrum anserinum nigrum maxillæ superioris apice incurvato macula sordide miniacea notato. Caput castaneum colli pars anterior gulæ proxima alba. Collum & dorsi pars anterior cinerea nigro maculata seu nebulosa, colore tamen in collo & femoribus magis griseo: reliqua dorsi pars pededentim versus urrhopygium magis nigricat; Urrhopygium ejusdem coloris. Maculæ alarum majores albæ, minores nigræ, ita ut ala complicata macula primo nigra, dein alba, iterum nigra rursusque alba conspiciatur. Pectus, & abdomen alba. Remiges nigræ, Rectrices obscure cineræ. Pedes rubri, membrana nigra. Iris flava pupilla nigra.

15. **ANAS** rostri extremo dilatato rotundatoque ungue incurvo. Linn. Fn. Suec. 102.

Anas latirostra major. Gesn. av. 120.

Anas latirostra major. Aldr. ornith. 3. p. 227.

Anas latirostra Taschenmaul. ejusdem p. 224.

Anas platyrhynchos altera s. Clypeata Germanica. Willughb. ornith. 283. t. 74. Raj. av. 143.

Austr. Schauffl-Ente, Köffl-Ente.

Habitat in fluviis & paludibus passim.

Victitat iisdem.

16. **ANAS** capite bruneo, fronte alba, cauda subtus nigra. Linn. Fn. Suec. 105.

Penelope. Gesn. av. 109. Aldr. ornith. l. 12. c. 3. Jonst. ornith. t. 49. Willughb. ornith. 283. t. 72. Raj. av. 143. n. 3.

Austr. Eißente mit weisser Platten.

Habitat hyemali tempore in fluviis, præsertim circa Moosbrunn.

Victitat iisdem.

17. **ANAS** toto corpore fusca macula alarum alba.

Austr. Mohrente.

Habitat in paludibus.

Victitat iisdem.

DESCRIPTION. Magnitudo anatis clypeatæ germanicæ, seu Penelope paulo minor. Caput totumque corpus supra fuscum, subtus testaceo-fuscum; macula alarum alba, quam

quam remiges secundariæ apicibus nigris alias albæ constituunt. *Alæ* subtus albidæ; *Rostrum* maxilla superior nigra, inferior plumbea *pedes* plumbei; *linguæ* apex trilobus. *Iris* fusca. *Fœmina* erat quam descripsi.

18. *ANAS* macula alarum viridi; linea alba supra oculos.

Linn. Fn. Suec. 108.

Kernell. Gesn. av. 107.

Kernell argentoratensis Gesneri. Aldr. ornith. l. 19. c. 33.

Querquedula prima. Willughb. ornith. 291. Raj. av. 148. n. 9.

Querquedula altera. Willughb. ornith. t. 74.

Austr. Riffantl.

Habitat in lacubus, fluviis, & paludibus passim.

Victitat iisdem.

19. *ANAS* macula alarum viridi: linea alba supra infraque oculos. *Linn. Fn. Suec. 109.*

Querquedula. Gesn. av. 105.

Phascus s. Querquedula minor. Aldr. ornith. l. 19. c. 31.

Querquedula secunda. Willughb. ornith. 290. Raj. av. 147.

n. 6.

Austr. Rothantl, Pfeiffantl.

Habitat in fossis, lacubus, paludibus, & fluviis ubique.

Victitat quibus congeneres.

M E R G V S.

1. *MERGVS* crista dependente capite nigro cærulescente, collori albo. *Linn. Fn. Suec. 113.*

Merganser. Aldr. ornith. l. 19. c. 63. Willughb. ornith. 253.

t. 64. Raj. av. 134. n. 1. Mars. danub. 78. t. 37.

Austr. Meer = Mache.

Habitat hyeme, & initiante vere in fluviis, & lacubus, præsertim in fluvio Fische, utpote qui raro vel nunquam congelatur.

Victitat piscibus.

2. *MERGVS* crista dependente cinereo albus, capite castaneo; pedibus luteis.

Austr. Braunkopfiger Tilger, Taucher.

Habitat hyeme in fluviis & lacubus passim.

Victitat iisdem.

DESCRIPTIO. *Magnitudo* anatis torquatae, *Rostrum* cylindraceum rubrum denticulis recurvis subulatis. *Caput* castaneum, *crista* dependens; *Gula* alba, *collum* antice cinereo

nereo & albo nebulosum. *Pectus* & *abdomen* alba; *collum* pone, *dorsum*, & *alæ urrhopyghiumque* & *cauda* cinerea. *Macula* alarum alba. *Remiges* primores nigrae, subsequentes & ultimæ pededentim magis cinerae, mediæ maculam constituentes albæ. *Pedes* lutei.

3. *MERGVS* cristatus nigro, alboque varius; utrinque ad dorsi alarumque principium duobus semicirculis nigris. Habitat hyemali tempore in lacu Nischiteriensi, & in fluviis. Vicatit piscibus.

DESCRIPTION. Magnitudo circiter penelopsis vel paulo major. *Rostrum* cylindraceum nigrum dentatum apice maxillæ superioris incurvato maculaque ut maxillæ inferioris apex sordide albente notato. *Caput*, *collum*, *pectus*, & *venter* alben; utrinque inter rostrum & oculum macula magna nigra, ut & utrinque in occipite macula alia oblonga nigra. *Dorsum* nigrum, a quo semicirculus niger utrinque per colli basin excurrit, sicut utrinque alius elegans semicirculus niger priore major ab alarum basi ortus per pectus excurrit. *Alæ* versus scapulas albæ lineis hinc inde nigris; humeri nigri *Remigum* basin tegentes seu tectrices primi ordinis albæ, secundi ordinis nigrae extremitatibus albis. *Remiges* (exceptis primoribus sex atris & corpori proximis quinque cinereis) nigrae sunt apicibus albis, ita ut complicata alæ una cum tectricibus secundi ordinis consideratæ maculas duas nigras lineis duabus albis distinctas constituent. *Urrhopyghium* & *cauda* cinerescunt. *Ilia* & *femora* alba subtilissimis lituris, & undulis nigricantibus depicta. *Pedes* nigri, membrana ad digitum extimum lobata. *Caput* cristatum, crista tamen non dependens. *Femina* a mare distinguitur. *Dorso* magis fusco; macularum in occipite absentia, quod una cum vertice rufescit; semicirculorum in pectore rudimentis tantum conspicuis. *Rostrum*, & *pedibus* plumbeis.

4. *MERGVS* vertice & fronte castaneo-ferruginea; capite subcristato; pedibus nigris; nigro cinereo, alboque varius.

Austr. Kleines Taucherl, Kleines Eisantl, Tuckantl.

Habitat hyeme in fluviis, lacubus, & paludibus.

Vicatit piscibus.

DESCRIPTION. Magnitudo *Querquedula*; *rostrum* cylindraceum nigrum dentatum, apice maxillæ superioris incurvato, ma-

maculaque ut maxillæ inferioris apex fordide albente notato. *Frons vertex, occiput, & aures* castaneo ferruginei coloris. *Gula, buccæ, & tempora* alba. *Collum* antèrius & *pectus* cinerea, posterius vero & *dorsum* atra extremitatibus pennarum cinerascens. *Venter* albus in alis complicatis maculæ seu fasciæ duæ nigræ lineis pariter duabus albis distinctæ. *Remiges & rectrices* nigrescunt extremitatibus fuscis. *Pedes* nigri.

PELECANVS.

PELECANVS gula faccata.

Onocrotalus gula faccata. *Linn. Syst. natur.* 23.

Austr. Rimmerfatt.

Habitat in fluviis Hungariæ.

Hospitatur in vivario Bellifontano Augustissimi Imperatoris nostri, & in vivario Ebergassingenſi S. P. de Lichtenstein.

Vicitat piscibus.

LARVS.

LARVS rostro pedibusque miniaceis, vertice & nucha atris, dorso cano; abdomine albo.

An *Sterna* rectricibus extimis dimidiato - albis nigrisque *Linn. Fn. Suec.* 127.

Austr. Grauer Fischer.

Habitat circa paludes varius.

Vicitat pisciculis.

DESCRIPTION. Magnitudo turdi. Rostrum & pedes miniacei seu cinnabarini, maxilla inferior infra apicem gibba; pedes natatori, *frons vertex & nucha* atra; *dorsum & alæ* canæ. *Gula, buccæ, & tempora* alba. *Collum antice, pectus, urropygium & abdomen* albertia, *cauda* bifurcata alba: *rectricibus* duabus extimis longissimis dimidiato albis nigrisque.

SCOLOPACES.

ARDEA.

ARDEA vertice papilloso. *Linn. Fn. Suec.* 131.

Grus. Bellon. icon. 41. b. *Gesn. av.* 529. *Aldr. ornith.* l. 20.

e. 5. *Fonst. ornith.* 106. t. 54. *Willughb. ornith.* 200.

t. 48. *Raj. av.* 91. n. 1.

Austriacis Kranich.

Habitat varius apud nos transmigrans.

Hospitatur autem hinc inde in prædiis magnatum, præsertim olim in domo Archiepiscopali.

Vicitat - - -

2. ARDEA tota alba; capite lævi, rostro luteo.

Ardea alba tota capite lævi. Linn. Fn. Suec. 132.

Ardea alba major. Raj. av. 99. n. 4. Willughb. ornith. 203.

Austr. Großer weisser Rager.

Habitat circa paludes varius.

Vicitat piscibus.

3. ARDEA tota alba, crista dependente, rostro superius nigro, inferius albido, pedibus nigris.

Austr. Kleiner weisser Rager.

Habitat subinde apud nos autumnno, & vere. Præsertim ann. 1753. Gregatim ad ripas fluviorum, paludum, & præcipue lacus Nischiteriensis habitabat.

Vicitat piscibus; sequente duplo minor est.

4. ARDEA cinereo alba crista dependente.

Ardea crista dependente. Linn. Fn. Suec. 133.

Ardea cinerea. Jonst. ornith. 151. t. 50.

Ardea cinerea major. Aldr. ornith. l. 20. c. 9. Willughb. ornith. 203. t. 49. Raj. av. 98. n. 1.

Austr. Blauer Rager.

Habitat ubique juxta paludes, fluvios, piscinas, & lacus.

Vicitat piscibus.

5. ARDEA vertice dorsoque rufis, remigibus nigris, pectore testaceo; crista dependente.

Austr. Rother Rager.

Habitat autumnno & vere passim juxta paludes, & fluvios.

Vicitat piscibus.

DESCRIPTION. Magnitudo ardeæ cinereæ vulgaris. Rostrum luteum superius nigrum, pars faciei nuda flava. Vertex rufus ad ferrugineum declinans. Frons nigra, crista dependens. Collum rufum; pennarum dorsaliū, & alarum tectricum discus fuscus; limbus rufus. Remiges nigre. Rectrices obscure cinereæ. Gula alba. Cæterum tota avis subtus testacea maculis in collo & pectore longitudinalibus nigris. Femora seminuda flava. Tibiæ antice, & digiti superius nigri: postice tibiæ & digiti subtus flavi. Ungues fusci. Palpebræ & irides flavæ, pupillæ nigre. Plumæ in pectore & abdomine sub pennis absconditæ flavæ.

6. AR-

ARDEA cinereo fusca subtus castaneo - ferruginea crista dependente.

Austr. Brauer Mager.

Habitat juxta paludes varius, præcedente multo minor.

Victitat piscibus.

ANNOTATIO. Dorsum fuscum disco pennarum obscuriore petus & pars abdominis castaneo ferruginea. Hujus descriptionem tradere hæctenus non potui, cum ejus exuvias devoraverint dermestes.

ARDEA cinereo, nigro, alboque varia; crista horizontali ex tribus pennis longitudine rostri composita.

Ardea cinerea minor. Aldr.

Austr. Nacht = Nabe.

Habitat vere apud nos transmigrans; insidet arboribus & præsertim ceraso pado.

Victitat piscibus.

DESCRIPTIO. Magnitudo Galli. Rostrum nigrum. Pars faciei nuda cærulea. Iris coccinea: pupilla nigra. Vertex niger. Collum antice & abdomen ac femorum pars plumis tecta albicant; collum pone; alæ, & cauda cinereæ; dorsum nigrum viride resplendens. In occipite pennæ tres albæ longissimæ tenuissimæ horizontaliter extensæ. Femora seminuda ac pedes lutei s. ochrei. Ungues fusci. Fæmina a mare distinguitur pennis his tribus in capite brevioribus, apicibus nigricantibus.

ARDEA testaceo fusca, capite lævi.

Austr. Mittere Moos = Ruh.

Habitat passim in paludosis, insidet fruticibus.

Victitat piscibus.

DESCRIPTIO. Magnitudo exacte præcedentis, seu galli. Rostrum fuscum. Pars faciei nuda livida, seu colorem qui in contusionibus evanescente cæruleo conspicitur, & nigro luteus evadit æmulans. Iris coccinea. Vertex nigro fuscus soli expositus viride resplendens. Dorsum fuscum; alarum tectrices fusco cinereæ; Remiges cinereæ apicibus albis. Rectrices cinereæ. Subtus tota avis testaceo albida, maculis in collo longitudinalibus cinereo-fuscis. Femora seminuda & pedes testacei seu pallide ochrei; ungues fusci.

ARDEA vertice nigro, collo pallido maculis longitudinalibus ferrugineo nigris; pedibus viridibus.

Ardea

Ardea vertice nigro; pectore pallido maculis longitudinalibus nigricantibus. *Linn. Fn. Suec.* 134.

Ardea Stellaris. *Willughb. ornith.* 207. t. 50. 52. *Raj. av.* 10. n. 11.

Austr. Moosßküh, Mohrtrummel.

Habitat ubique in paludibus.

Victitat piscibus.

10. *ARDEA* vertice, dorsoque nigris, collo antice & alarum tectricibus lutescentibus.

Austr. Stauden-Magerl, kleine Moosßküh.

Habitat juxta paludes seu in paludosis passim insidet fruticibus.

Victitat pisciculis.

DESCRIPTION. Magnitudo turdi seu ortygometræ. Rostrum pars nuda faciei flava. Vertex dorsum, urrbopygium & cauda supra nigra. Pennæ ad alarum basin sitæ, remigesque superne nigræ, inferne cineræ. Alarum tectrices, collum antice, pectus abdomen & femora lutescunt. In pectore, & ad principium dorsi pennarum quarundam discus niger, limbus lutescens. Femora ad genua usque in hac specie plumis tecta. Pedes antice virides, posteriores flavi; ungues fusci, postico reliquis majore. Iris crocea.

11. *ARDEA* nigra; pectore abdomineque albo. *Linn. Fn. Suec.* 135.

Ciconia nigra. *Aldr. ornith.* l. 20. c. 2. *Willughb. ornith.* 211.

Raj. av. 97. n. 2. *Gesn. av.* 273.

Austr. Schwarzer Storch.

Habitat circa lacum Nischiteriensem varius in Hungaria infere copiose.

Hospitabatur olim in vivario S. P. Eugenii.

Victitat - - - -

12. *ARDEA* alba remigibus nigris. *Linn. Fn. Suec.* 136.

Ciconia. *Bellon. icon.* 45. a. *Gesn. av.* 262. *Aldr. ornith.* l. 20. c. 1. *Fonst. ornith.* 147. t. 50.

Ciconia alba. *Willughb. ornith.* 210. *Raj. av.* 97. n. 1.

Austr. Storch.

Habitat in pratis, & juxta paludes, nidificat in fumariis.

Victitat quadrupedum minorum aviumque pullis, ranis, serpentibus.

RECURVIROSTRA.

1. *RECURVIROSTRA* albo nigroque varia. *Linn. Fn. Suec.* 137.

Avosetta, Recurvirostra. *Gesh. av.* 232.

Avosetta italica dicta. *Aldr. ornith. l. 19. c. 64.*

Recurvirostra avosetta italorum. *Willughb. ornith. 240. t. 60. Raj. av. 117.*

Austr. Krumb Schnabl.

Habitat copiose circa lacum Nischiteriensem.

Vicinitat insectis.

SERVATIO. Urrhopygium & dorsum in nostra alba; macula alba parva sub, sed non supra oculum utrinque conspicua.

ORTYGOMETRA.

ORTYGOMETRA alis rufo-ferrugineis. *Linn. Fn. Suec. 162.*

Ortygometra. *Aldr. orn. l. 13. c. 23. Willughb. ornith. 522. t. 29.*

Crex Aristotelis. *Turn.*

Austr. Wachtel = König.

Habitat passim in pratis, & inter segetes, ac in carectis.

Vicinitat insectis.

ORTYGOMETRA alis fuscis, lumbis nigris lituris transversis albis.

An Ortygometra alis fuscis. *Linn. Syst. natur. 25.*

Austr. Wasser = Hendl.

Habitat in pratis, & circa paludes in fine autumnus, & versus principium hyemis.

Vicinitat

SCRIPTIO. Magnitudo præcedentis, seu turdi. Corpus ad latera compressum exacte præcedentis. Rostrum tamen non adeo gallinaceum, sed capite longius, digitis brevius, compressum acutiusculum supra fuscum, maxillæ superioris marginibus & maxilla inferiore præsertim in mare miniaceis. Capitis latera, pectus, & collum subtus, cinerea. Gula in aliquibus pallidior, in aliis æqualis; dorsum, collum supra & caput supra maculis nigris subfuscisque cortices arborum colore æmulantibus varia. Sub cauda albo nigroque maculata est, ita ut hypochondria & abdominis maxima pars nigra lituris transversis albis præsertim in mare videatur; ad podicem tamen testaceo admixto. Femora seminuda, pedesque tetradactyli, in mare sordidi, in femina obsolete fusci; iris rubra, pupilla nigra.

NUMENIVS.

1. NUMENIVS rostro arcuato, alis nigris: maculis niveis, pedibus cæruleo-virescentibus. *Linn. Fn. Suec. 139.*

Numenius f. Arquata. *Gesn. av. 222.*

Numenius. *Aldr. ornith. l. 20.*

Numenius Aldr. f. Arquata. *Willugb. ornith. 216. t. 54. F. 1. 2.*

Numenius f. Arquata major. *Raj. av. 103. n. 1.*

Austr. Goïsser, Brach-Schnepf.

Habitat ubique circa paludes gregatim.

Victitat insectis.

2. NUMENIVS rostro arcuato; corpore castaneo; alis & cauda cæruleo, viridi, violaceoque splendentibus; pedibus, obscure virentibus.

Austr. Türkischer Goïsser, türkischer Schnepf.

Habitat circa lacum Nischiteriensem præsertim.

Victitat insectis.

DESCRIPTION. Magnitudo prioris, figuraque eadem. *Rostrum* tamen fortius, arcuatum nigrum; *faciei* pars a rostro ad oculos nigra nuda. *Vertex*, *capitis* latera, & *collum* antice maculis parvis cinereo-nigris albisque variegatum. *Occiput*, *collum* posterius, *pectus*, *abdomen* & *dorsum* castanea; *femora* ferruginea magis. *Urrhopygium*, pars dorli vicina, *Rectrices*, ac *alæ* cæruleo, viridi, violaceoque splendentes. *Pedes* cæruleo-virides, seu marini coloris. *Digitum* membrana connexi. Variat subinde toto corpore nigro cæruleum viride, & violaceum splendente.

3. NUMENIVS rostro arcuato, pectore albo maculis cordatis; pedibus nigris.

Austr. Kleiner Goïsser.

Habitat in pratis paludosis.

Victitat insectis.

DESCRIPTION. Magnitudo præcedentibus multo minor, circiter Vanelli. *Rostrum* arcuatum nigrum. *Gula* alba. *Capitis* latera & *collum* alba maculis longitudinalibus fuscis. *Vertex* *dorsum* & *alæ* albo nigro testaceoque maculatæ, seu Scolopacini coloris. *Remiges* primores tres fusce reliquæ fusce maculis seu fasciis albis pededentim magnitudine & numero crescentibus ita ut ultimæ sicut dorsum fusco testaceo & albo variegatæ sint. *Pectus* album

ma-

maculis cordatis ob rachin ad illas nigram quasi petiolatis, seu figuram Pique in chartis gallicis expressam exacte referentibus. *Abdomen & femorum pars pennis tecta alba. Urrhopygium album maculis oblongis nigricantibus paucissimis; Rectrices albæ fasciis raris nigricantibus. Femora seminuda & pedes nigri. Digiti marginati membrana connexi.*

NUMENIVS Urrhopyghio albo; rectricibus nigris, basi albis; remigibus transversa alba macula: exceptis quatuor primis. *Linn. Fn. Suec. 144.*

Austr. Stod = Schnepf.

Habitat in pratis.

Victitat insectis.

SERVATIO. *Rostrum rectum longissimum ad latera luteum apice utriusque maxillæ glabro nigro cochlearis auricularis ad instar excavato. Pedes longissimi nigri. Fæmina caput, collum, & pectus cinerea magis.*

NUMENIVS rostri apice lævi; capite linea utrinque nigra; rectricibus nigris apice albis. *Linn. Fn. Suec. 141.*

Rusticula s. Perdix rustica major. Gesn. av. 502.

Scolopax s. Perdix rustica, Aldr. ornith. l. 20. c. 51.

Scolopax. Willugh. ornith. 213.

Scolopax, Gallinago maxima. Raj. av. 104. n. 1.

Austr. Wald = Schnepf.

Habitat potissimum autumnis & vere transmigrans in hortis, sylvis cædis, ac in pascuis udis illis vicinis; in quibus boves de die pascuntur. Raro apud nos nidificat.

Victitat vermibus.

SERVATIO. *Avis hæc septentrionalium provinciarum æstivo tempore incola est; ubi plerumque nidificat, nec æstate in regionibus calidioribus vitam sustentare posset lumbricis potissimum victitans: quare tam diu tantum moratur in regionibus quas accessit, quam diu immisso in terram rostro (quod in cultis & bovum excrementis conspicitur) alimentum adipisci conceditur. Congelanda autem terra appropinquante hyeme in provinciis septentrionalibus, australiores petit; hinc circa plenilunium mensis octobris (nisi anni constitutio maturius vel tardius frigus causaverit) plerumque austriam transmigrat, italiam aliasque australes provincias petens, ibi tam diu manet donec appropinquante sole lo-*

ca uda huic avi amica exsiccari pertimescat, tunc rursus circa plenilunium potissimum mensis Martii per austriam matrimonio juncta ad septentrionales provincias redit; de nocte potissimum volitans.

6. *NUMENIVS* capite lineis quatuor fuscis longitudinalibus, rostri apice tuberculoso; femoribus seminudis.

Linn. Fn. Suec. 143.

Gallinago f. *Rusticola* minor. *Gesn. av. 503.*

Scolopax f. *Gallinago* minor. *Aldr. ornith. l. 20. c. 53.*

Gallinago minor. *Willughb. ornith. 214. Raj. av. 105. n. 3.*

Austr. *Moos = Schnepf.*

Habitat in caretis.

Victitat vermiculis.

TRINGA.

1. *TRINGA* capite rufo; collo antice pennis longissimis atris obsito, pedibus luteis.

Austr. *Gröbler.*

Habitat in pratis.

Victitat insectis.

DESCRIPTIO. *Magnitudo* pici viridis circiter. *Rostrum* fuscum; *caput* & *collum* postice ferrugineum; *collum* antice pennis longissimis atris barbam quasi dispersam referentibus tectum; *pectus* nigro maculatum, *abdomen* album. *Dorsum* ferrugineum maculis liturisque nigris. *Alæ* cinereæ magis remigibus fuscis parte tecta pallidiore: *Remigum* ultimarum tectrices ferrugineæ lituris nigris, apice vero macula rhomboidali nigra semicirculo albo cincta notato. *Urrhopygium* cinereo fuscum limbo pennarum pallidiore; *Rectricum* superiores tectrices intermediae testaceo-fuscae fasciis nigris: extremae albæ maculis transversis nigris. *Rectrices* fuscae maculis transversis nigris, apex earum pallidior. Inferiores rectricum tectrices albæ apicis disco macula longitudinali nigra. *Femora* seminuda, & *pedes* lutei, *ungues* nigri. *Avis pugnacis* species est hæc *Tringa*, ut & sequens distincta tamen ab illa quam clarissimus Linnæus in *Fauna suecica* numero 145. descripsit.

2. *TRINGA* vertice, & collo postice nigro; antice collo pennis longis testaceis lituris, maculisque nigris obsito, pedibus fuscis.

Austr.

Austr. Rösfler.

Habitat cum præcedente.

Vicitat iisdem.

DESCRIPTION. Magnitudo & figura præcedentis. Rostrum fuscum, vertex & collum postice atra. Capitis latera testacea nigro maculata. Gula alba. Collum antice pen- nis longis testaceis lituris maculisque nigris variegatis tectum. Pectus albidum nigro maculatum. Venter al- bus. Dorsum cinereo fuscum maculis nigris nitidis. Ala cinereo fusca. Remiges fusca, ea qua reguntur parte albidæ. Remigum corpori proximarum rectrices fusca in apice macula nigra nitida versus extremitatem semicircu- lo albidæ, superius semicirculo irregulari rufescente notatæ. Urrhopygium & Rectrices ea fusco cinerescunt: Rectricum quædam rectrices superiores & intermedia rufo nigro- que maculatæ, laterales albæ. Femora seminuda, & pedes fusci. Ungues nigri.

TRINGA rostro lævi, corpore cinereo lituris nigris, sub- tus albo. Linn. Fn. Suec. 147. t. 1.

Gallinula aquatica hypoleucos, Gesn. av.

Gallinula hypoleucos. Aldr. ornith. 3. p. 469.

Tringa minor. Willughb. ornith. 223. t. 35. Raj. av. 108. n. 5.

Austr. Sandlaufferl.

Habitat ad lacus, paludes, & ripas fluviorum.

Vicitat insectis.

TRINGA crista dependente, pectore nigro. Linn. Fn. Suec. 148.

Capra, Capellus, Vanellus. Bellon. icon. 49. a.

Vanellus. Gesn. av. 764.

Capella f. Vanellus. Aldr. ornith. l. 20. c. 63. Willughb. ornith. 228. t. 57. Raj. av. 110. n. 1.

Vanellus f. Capella, Jonst. ornith. 164. t. 27.

Austr. Riwib.

Habitat ubique in pratis udis.

Vicitat insectis.

TRINGA rostro nigro, basi rubra. pedibus coccineis, Linn. Fn. Suec. 149.

Totanus. Raj. av. 107. n. 7.

Austr. Rothfussler.

Habitat ad paludes, & præsertim circa lacum Nischiteriensem.

Vicitat insectis.

CHARADRIVS.

1. CHARADRIVS nigro lutescenteque variegatus, pectore concolore. *Linn. Fn. Suec. 157.*

Pluvialis viridis. *Willughb. ornith. 229. t. 57. Raj. av.*

III. n. 7.

Austr. Brachhennl.

Habitat in campestribus gregatim.

Victitat insectis.

2. CHARADRIVS pectore nigro, fronte nigricante lineola alba, vertice fusco. *Linn. Fn. Suec. 159.*

Charadrios. *Jonst. ornith. 166. t. 53.*

Charadrios, f. Hiaticula. *Aldr. ornith. l. 20. c. 67.*

Charadrius, f. Hiaticula. *Willughb. ornith. 230. t. 57. Raj.*

av. 112. n. 6.

Austr. Griesbhennl.

Habitat ad ripas arenosas fluviorum, & lacuum.

Victitat insectis.

GALLINÆ.

STRUTHIO.

1. STRUTHIO. *Linn. Syst. natur. edit. Stockh. 2. p. 47.*

Struthio - Camelus. *Dodart. Gall. 335.*

Austr. Strauß.

Hospitabatur olim in vivario S. P. Eugenii.

Victitat - - - -

CASVARIVS.

1. CASVARIVS. *Linn. Syst. natur. edit. Stockh. 2. p. 47.*

Emeu. *Dodart. Gall. 377.*

Austr. Casuarius.

Hospitatur in vivario Augustissimi nostri Imperatoris.

Victitat - - - -

OTIS.

1. OTIS. *Linn. Syst. natur. edit. Stockh. 2. p. 47.*

Otis f. Tarda. *Aldr. ornith.*

Tarda. *Dodart. Gall.* 309.

Austr. Trap.

Habitat gregatim in campestribus circa Leytæpontum, Ebergassing, Rohraviam, & Hamburgum, alibique circa confinia Hungariæ.

Vicitat frugibus.

P A V O.

Pavo cauda longa. *Linn. Fn. Suec.* 162.

Pavo. *Aldr. orn. l. 13. c. 1. Gesn. av. 656. Jonst. ornith. 56. t. 22. Willugb. ornith. 112. t. 27.*

Austr. Pfau.

Habitat passim in hortis nobilium & curiosorum cicur.

Vicitat frugibus.

M E L E A G R I S.

MELEAGRIS. *Linn. Fn. Suec.* 164. *Bellon. icon.* 60. a.

Gallo-pavo. *Gesn. av. 482. Aldr. ornith. l. 13. c. 4.*

Gallo-pavo s. meleagris, & numidica avis. *Willugb. ornith. 113. t. 27.*

Gallo-pavo s. avis numidica & meleagris quibusdam. *Raj. av. 51. n. 3.*

Aust. Indian, Indisch, Piphun.

Habitat ubique ab æconomis culta.

Vicitat frugibus.

G A L L V S.

GALLVS cauda compressa adscendente. *Linn. Fn. Suec.* 165.

Gallus gallinaceus, & Gallina. *Aldr. ornith. l. 14. c. 1.*

Gallus gallinaceus. *Gesn. av. 395. Willugb. ornith. 109. t. 26.*

Austr. ms. Han, fæmina Henne.

Habitat ubique ab æconomis culta varietates hujus plurimæ & speciosissimæ coluntur in vivario Ebergassingenli. S. P. de Lichtenstein.

Vicitat frugibus.

GALLVS vertice corneo. *Linn. Syst. natur.* 28.

Gallus niger maculis ovalibus, & orbiculatis. *Barr.* 79.

Gallina Guineensis. *Worm. mus.* 297.

Austr. Perthan mas. Perthenne fæmina.

Habitat passim in hortis, & domibus curiosorum. Vicitat frugibus.

PHASIANVS.

1. PHASIANVS cauda erecta, capite lævi.

Phasianus vulgaris. *Raj. av. 56. n. 1.*

Austr. Japan.

Habitat passim in sylvis. Viçitat frugibus.

TETRAO.

1. TETRAO rectricibus exterioribus, alarum basi alba macula. *Linn. Fn. Suec. 166.*

Urogallus. *Gesn. av. 491. (mas)*

Grygallus major. *Gesn. av. 495. (fæmina)*

Urogallus f. Tetrao major. *Aldr. ornith. l. 13. c. 6.*

Willughb. ornith. 123. t. 30. Raj. av. 53. n. 1.

Austr. Muerhan mas. Muerhenne fæmina.

Habitat in sylvis montanis vallis Breininæ, & retro Scotto-Viennam.

Viçitat baccis, seminibus.

2. TETRAO omnibus remigibus secundariis a medio basin versus albis, cauda bifurca. *Linn. Fn. Suec. 168.*

Urogallus minor. *Gesn. av. 494. (mas.)*

Grygallus minor. *Gesn. av. 496. (fæmina)*

Urogallus f. Tetrao minor. *Aldr. ornith. l. 13. c. 7.*

Tetrao f. Urogallus minor. *Willughb. ornith. 124. t. 31.*

Raj. av. 53. n. 2.

Austr. mas. Birkhan, Schildhan, fæmina Birkhenne.

Habitat in sylvis montanis. Viçitat baccis, seminibus.

3. TETRAO rectricibus albis intermediis nigris apice albis.

Linn. Fn. Suec. 169.

Lagopus. *Gesn. av. 577.*

Perdix alba f. Lagopus. *Aldr. ornith. l. 13. c. 21.*

Lagopus avis. *Willughb. ornith. 127. t. 32. Raj. av. 55. n. 5.*

Austr. Schneehun, Schneehennl.

Habitat in alpibus, præsertim in Schneeberg.

Viçitat seminibus, baccis.

4. TETRAO rectricibus cinereis punctis nigris fascia lata nigra exceptis intermediis duabus. *Linn. Fn. Suec. 170.*

Gallina corylorum f. Bonasia alberti. *Gesn. av. 229.*

Aldr. ornith. l. 13. c. 11. Willughb. ornith. 126. t. 21.

Raj. av. 55. n. 6.

Austr. Haselhun.

Habitat circa Neobergam subinde, copiose autem in Sclavonia, præsertim circa Elsecium unde Viennam ad forum fertur.

5. TE.

TETRAO rectricibus cinereis superiore medietate hinc inde rufis, *Linn. Fn. Suec. 171.*

Perdix major. Gesn. av. 682.

Perdix rufa major. Aldr. ornith. l. 13. c. 18.

Perdix major. Jonst. ornith. 68. t. 27.

Perdix rufa. Willughb. ornith. 118. t. 29. Raj. av. 57. n. 2.

Austr. Berghun.

Hospitatur in vivario Augustissimi nostri Imperatoris, nec non hinc inde in domibus curiosorum.

Vicitat frugibus.

BSERVATIO. Mirum hanc avem Sueciæ, & Italiæ indigenam, ac in comitatu Tirolensi, & in Carniola circa Tergestum jamjam habitantem, nunquam in Austria sponte reperiri; ubi tamen pleræque aliæ aves, tam septentrionalium, quam australium magis provinciarum incolæ Austriam saltem subinde accedunt, vel transmigrant.

TETRAO macula nuda coccinea pone oculos; rectricibus ferrugineis. *Linn. Fn. Suec. 172.*

Perdix minor cinerea. Aldr. ornith. l. 13. c. 19.

Perdix cinerea. Jonst. 68. t. 27. f. 1. Willughb. ornith. 119. t. 29. Raj. av. 57. n. 2.

Austr. Nebhun.

Habitat ubique in campis, agris, vineis, & fruticetis.

Vicitat frugibus.

TETRAO pedibus nudis, corporeo griseo maculato; linea superciliarum alba. *Linn. Fn. Suec. 173.*

Coturnix. Gesn. av. 353. Jonst. ornith. 69. t. 28. Raj. av. 58. n. 6.

Austr. Wachtel.

Habitat ubique in arvis, & pratis.

Vicitat frugibus.

FULICA.

FULICA nigricans fronte, & rostro incarnatis.

Fulica nigricans. Linn. Syst. natur. 28.

Fulica fronte calva æquali. Linn. Fn. Suec. 130.

Fulica. Bellon. icon. 36. b. Aldr. ornith. l. 19. c. 13. Willughb. ornith. 239. t. 59. Raj. av. 116. n. 1.

Austr. Mohrhennel, Blasßl.

Habitat ubique in paludibus, lacubus, & piscinis.

Vicitat piscibus, seminibus, insectis.

2. *FULICA* cinereo fusca; rostro viridi basin versus coccineo, fronteque coccinea.

Austr. Mohrhenul mit rothem Blasl, fleines Mohrhenul, Wasserhenul.

Habitat in nemoribus ad fluvios sitis populis, & salicibus abundantibus.

Vicinat iisdem.

DESCRIPTION. Magnitudo Ortygometræ, vel paulo major. Rostrum gallinaceum viride, a naribus ad basin coccineum; frons nuda calva coccinea. Caput nigricans; collum cinereo-nigrum, pectus & abdomen cinerea, pubes albida; lumbos pennæ longæ uno latere cinereæ, altero albæ tegunt. Dorsum & Urrhopygium fusca. Alæ superius fusca inferius cinereæ. Cauda brevis inferius alba macula in medio magna nigra. Rectrices fusco-nigræ. Pedes virides, digitum lateribus in hac specie non lobatis sed tantum marginatis; femora seminuda ad pennarum principium annulo coccineo cincta, alias flava. Iris rubra.

P A S S E R E S.

COLV M B A.

- I. *COLV M B A* cærulescens, collo nitido, macula duplici alarum nigricante. Linn. Fn. Suec. 174.

α. *Oenas* s. *Vinago*. Aldr. ornith. l. 15. c. 7. Willugb. ornith. 136. t. 35. Raj. av. 62. n. 10.

Austr. Hohltaube.

β. *Columba domestica* s. *vulgaris*, Willugb. ornith. 130. t. 32. *Columba domestica*. Raj. av. 59. n. 1.

Austr. Feldtaube, Hausstaube, Feldraße.

γ. *Columba gutturosa*. Willugb. ornith. 121. t. 34. Raj. av. 60. n. 2.

Austr. Kropf.

δ. *Columba turbita* dicta. Willugb. ornith. 132.

Austr. Türfl.

ε. *Columba barbarica* s. *Numidica*. Willugb. ornith. 133. t. 34. Austr. Judianer.

ζ. *Columba cucullata* s. *Jacobeæ*. Raj. av. 60. n. 6. Austr. Paredentaube.

η. *Columba percursor*. Raj. av. 60. Austr. Plätscher.

θ. Co-

9. *Columba tremula laticauda*. Willugb.

Austr. Pfaunentaube.

10. *Columba tabellaria*, & *eques*. Willugb.

Austr. Bancadeten.

11. *Columba Gyratrix*. Willugb.

Austr. Burgerl, Burzler.

12. *Columba cristata* duplici una in fronte, altera in occipite.

Austr. Moller, Trummeltaube, a voce tympani sonum æmulante.

Habitat α . passim in sylvis, in arborum cavitatibus nidificans.

β . in muris ecclesiæ Metropolitanæ Viennensis, & PP.

Jesuitarum sponte, ac ubique ab æconomis culta. Reliquæ varietates omnes, & diversæ aliæ non recensitæ in columbariis curiosorum.

Vicitat frugibus.

COLUMBA collo utrinque albo, pone macula fusca. Linn.

Fn. Suec 175.

Palumbus major torquatus. Aldr. ornith. l. 15. c. 5. Willugb.

ornith. 135. t. 35. Raj. av. 62. n. 2.

Austr. Wildtaube, Ringeltaube.

Habitat ubique in sylvis nidificat supra arbores.

Vicitat frugibus.

COLUMBA area oculorum nuda coccinea lævi; collo postice semicirculo nigro.

Austr. Wilde Turteltaube.

β . *Turtur*. Willugb. & Raj. av. 61.

Austr. Einheimische Turteltaube, Lachtaube.

Habitat ubique in sylvis, & nemoribus. β . in domibus passim, culta.

Vicitat frugibus.

DESCRIPTION. Magnitudo turdi viscivori, vel paulo major.

Rostri apex fuscus reliquum, ut & pedes rubrum. Caput cinereo cærulescens fronte magis cærulea, gulaque ex cinereo flavescente, posterius in collo semicirculus latus ex pennis nigris margine albis compositus. Collum anterius & pectus ex cinereo rubescunt. Abdomen album ad latera cærulescens. Dorsum ferrugineum, Uropygium cærulescit, maculis hinc inde ferrugineis. Alarum tectrices ferrugineæ disco nigricante. Remiges & Rectrices fuscæ margine pallidiore, extimarum rectricum limbus albus. Vox a palumbo distincta cachinnum humanum æmulans. β . colore distincta, seu omnino cinerea circulo in collo nigro, vel alba: omnibus nota.

T V R D V S.

1. **T V R D V S** flavus ; alis extremaque cauda nigris.
 Oriolus (flavus alis extremaque cauda nigris) pupillis
 rubris. *Linn. Syst. natur. 29.*
 Oriolus. *Gesn. & Willugb.*
 Chlorio. *Aristotelis.*
 Galbula. *Aldr. & Picus nidum suspendens ejusdem.*
 Austr. *Gugelfabrus. Norimbergensibus gelber Kirschvogel.*
Silesiis Pirohle.
 Habitat passim in nemoribus.
 Victitat insectis, baccis, ficibus, & præsertim cerasis, ac prunis alias mala armoniaca dictis.
2. **T V R D V S** capite cæruleo, cauda ferruginea.
 Petrocosyphos. *Gesn.*
 Austr. *Steinröthl.*
 an **Turdus** rectricibus rufis, duabus intermediis cinereis
 fascia nigricante, proxima apice cinerea. *Linn. Fn.*
Suec. 187. pullus vel fæmina ejus? valde enim vere
& autumno colore differt, ac secundum ætatem & sexum
variat.
 Habitat inter saxa; nidificat in lapidicinis.
 Victitat erucis, baccis.
3. **T V R D V S** ater, rostro palpebrisque fulvis. *Linn. Fn. Suec.*
184.
 Merula nigra. *Bellon. icon. 30. b.*
 Merula. *Aldr. ornith. l. 16. c. 6.*
 Merula vulgaris. *Willugb. ornith. 140. t. 37. Raj. av.*
65. n. 1.
 Austr. *Amstel. Amarl.*
 Habitat ubique in sylvis & nemoribus.
 Victitat baccis, insectis.
4. **T V R D V S** nigricans, rostro flavescente, torque albo.
Linn. Fn. Suec. 185.
 Merula torquata. *Gesn. av. 607. Aldr. ornith. l. 16. c. 11.*
Jonst. ornith. 106. t. 39. Willugb. ornith. 143. t. 37.
Raj. av. 65. n. 2.
 Austr. *Ringlamsel.*
 Habitat in sylvis montanis.
 Victitat insectis, baccis.
5. **T V R D V S** nigricans rostro flavescente, torque fusco. *Linn.*
Fn. Suec. 186.
 Merula fusca non canora. *Gesn.*

Merula montana. Willughb. ornith. 144. t. 38.

Merula saxatilis. Raj. av. 65. n. 3.

Austr. Stoccafemel.

Habitat in montibus sylvaticis.

Vicitat iisdem.

6. *Turdus* pedibus fuscis, alis subtus albescentibus.

Turdus viscivorus. Aldr.

Austr. Zariher, Mislter, Zerrer.

Habitat in sylvis montanis, hyeme vero ubique in juniperetis.

Vicitat insectis, baccis.

7. *Turdus* rectricibus nigris, extimis margine interiore apice albicantibus, capite cano. Linn. Fn. Suec. 188.

Turdus pilaris. Gesn. av. 753. Aldr. ornith. l. 16. c. 1. Willughb. ornith. 138. t. 37. Raj. av. 64. n. 3.

Austr. Kranabetsvogel, Kranabeter.

Habitat in sylvis montanis, hyeme vero ubique in juniperetis.

Vicitat insectis, baccis.

8. *Turdus* alis subtus ochreis.

Turdus simplex. Aldr.

Turdus viscivorus minor. Bellon.

Austr. Weindroschl, Weisdrochl, Sommerdroschl.

Habitat ubique in sylvis & nemoribus vere & æstate; autumnos avolat. Nidificat in fruticibus.

Vicitat insectis, baccis.

9. *Turdus* alis subtus ferrugineis, linea supra oculos albicante. Linn. Fn. Suec. 189.

Turdus illades seu *Tylades*, vel *Iliacus.* Aldr.

Winfela. Gesn.

Austr. Rothdroschl, Balddroscherl, Winterdroschl.

Habitat circa finem autumnus, & initium hyemis ubique in sylvis nostris, tunc transmigrans, nec vere quamquam iterum transeuns apud nos nidificat, jam autem in Bohemia.

Vicitat insectis, baccis.

STURNUS.

1. *Sturnus* rostro flavescente, corpore nigro punctis albis. Linn. Fn. Suec. 183.

Sturnus, Gesn. av. 747. Aldr. orn. l. 16. c. 19. Bellon. icon.

81. a.

Z 5

Austr.

Austr. Starl.

Habitat in cavis arboribus ubi nidificat, volitat gregatim in pascuis, & vineis de nocte arundines petit.

Vicitat locustis, baccis, lumbricis, conchis aquaticis, aliisque insectis.

ALAVDA.

1. ALAVDA crista dependente.

Alauda cristata. Aldr. & Bellon.

Austr. Kothlerche, Schopflerche.

Habitat passim juxta pagos, & in pascuis ubi nidificat.

Vicitat frugibus, insectis.

2. ALAVDA rectricibus extimis duabus extrorsum longitudinaliter albis intermediis interiori latere ferrugineis. Linn. Fn. Suec. 190.

Alauda sine crista. Gesn. av. 78.

Alauda non cristata. Aldr. l. 18. c. 12.

Alauda vulgaris. Willughb. ornith. 149. t. 40. Raj. av. 62. n. 1.

Austr. Feldlerche.

Habitat ubique in agris, & arvis ibique nidificat.

Vicitat potissimum frugibus, insectisque & formicarum ovis.

3. ALAVDA lineola superciliarum alba, torque in collo pallido; cauda brevissima.

Alauda sylvatica. Gesn.

Alauda arborea. Willughb.

Austr. Ludlerche, Baldlerche.

Habitat in arboribus ad sylvarum margines ubi inter frutices nidificat; autumnno gregatim in pascuis, & circa furnos lateritios, insidet arboribus.

Vicitat frugibus, insectis.

4. ALAVDA pectore lutescente punctis atris.

Spipola. Aldrovandi Bononiensibus.

Austr. Dreinvogl. Norimbergensibus Krautvogl. Styriacis Schmeltvogl.

Habitat in pratis, ac campis, autumnno initiantes præsertim inter olera, insidet arboribus.

Vicitat seminibus, vermiculis.

SITTA.

1. SITTA. Aldr. ornith. l. 12. c. 38.

Sitta

Sitta reſtricibus fufcis : quatuor margine apiceque albis, quinta apice cana. Linn. Fn. Suec. 132.

Picus cinereus f. Sitta. Gefn. av. 711.

Sitta f. Picus cinereus. Willughb. ornith. 98. t. 23. Raj. av. 47. n. 4.

Auſtr. Klenner. Cum foramen cavæ arboris in qua nidificat luto uſque ad exiguum orificium per quod intrare, & exire poſſit, occludat.

Habitat paſſim in ſylvis, & nemoribus.

Viſitat inſectis.

A M P E L I S.

1. *AMPELIS* remigibus quibusdam apice membranaceo terminatis. *Linn. Fn. Suec. 179.*

Garrulus Bohemicus. Gefn. av. 703. Raj. 85.

Garrulus Bohemicus Gefneri, Ampelis. Aldr. Joſt. ornith. 44.

Auſtr. Zuſerl, Seidenschweiff.

Habitat certis annis magna copia apud nos hyemali tempore ubique in ſylvis; non tamen omni anno.

Viſitat baccis, præſertim Juniperinis.

2. *AMPELIS* dorſo grifeo, macula ad oculos longitudinali. *Linn. Fn. Suec. 180. t. 2.*

Lanius tertius. Willughb. orn. 54.

Lanius minor rufus f. tertius. Aldr. Raj. av. 13.

Auſtr. Dorngreul, Dornbeher.

Habitat ubique in dumetis.

Viſitat ſcarabæis, cantharidibus, aliisque inſectis, nec non avium minorum pullis.

3. *AMPELIS* fronte nigra, vertice & occipite rufis, urropyghio albo.

Auſtr. Dorngreul mit rother Platten.

Habitat in dumetis præcedente f. ſecunda minus frequens. Bononiæ italorum vulgaris.

Viſitat iisdem.

DESCRIPTION. Magnitudo & figura præcedentis, frons nigra; Occiput & collum ſuperius ac vertex ruſa. Macula nigra a roſtro ad aures extenſa, quæ cum frontis nigredine ſupra & retro oculos unitur, remanente inter oculos & roſtrum utrinque macula alba; dorſum nigrum. Urrropyghium, peſtus & abdomen alba. Scapulæ & alarum trices

trices nigræ. *Remigum* primores nigræ versus basin macula transversa alba, mediæ fuscæ, ultimæ s. corpori proximæ albæ, unde in ala complicata macula magna alba. *Rectrices* fuscæ exceptis extimis quarum extremitates albæ. *Rostrum* & *pedes* nigri.

4. *AMPELIS cærulescens*, alis caudaque nigricantibus. *Linn. Fn. Suec. 181.*

Lanius cinereus major, *Willugb. ornith. 53. t. 10.*

Lanius s. *collurio cinereus major*. *Raj. av. 18. n. 3.*

Austr. Speralster, Grigelsster, Reuntödter.

Habitat ubique in sylvis, & dumetis.

Victitat scarabæis; & parvis aviculis corvorum more.

OBSERVATIO. Hujus speciei unam visco cæpi, quæ aviario incluso *Coccothrausti* robustissimo quamquam rostro donato insidiabatur: plures retibus cæpisse recordor, dum aviculas ibidem alligatas aggrediebantur, victitant enim avibus minoribus corvorum more. Hac ratione aucupes Austriaci ultimas tres species *Alster*, & *Heber* nuncupant: Nec meo judicio erraret, qui easdem corvis annumeraret, illorum etenim more prædam frustatim decerptam devorant; sic, cum hominis adspectum refugiat omne animal, nec lapidum & plantarum instar fixis hæreat sedibus, facile botanicus quivis observatis solum plantarum sceletis, seu cadaveribus exsiccatis genus speciesque debite distinguet, ast consumatissimus quamquam ornithologus avium vita spoliatis corporibus tantum consideratis neutiquam hæc præstabit. Vox etenim, volandique modus, nidificatio, pastus persæpe requiruntur ad genera distinguenda, speciesque jungendas; quæ omnia in concreto sumta characterem genericum tam clare demonstrant, ut & tyronibus, simplicibusque aucupibus differentia innotescat, absque tamen eo quod illam explicare, vel exprimere possint expertissimi ornithologiæ professores. Nam ita quoque indefessa anatomicorum, botanicorumque industria in adæquate definiendis glandulis muscisque frustranea hucusque fuit, dum id verbis explicare nequiverunt, quod vel simplex structura omni rustico patefecit.

LOXIA.

1. *LOXIA lineæ alarum duplici alba*. *Linn. Fn. Suec. 176.*
Coccothraustes. *Gesn. av. 276. Jonst. ornith. 37.*

Coc-

Coccothraustes ornithologi. Aldr. orn. l. 16. c. 20.

Coccothraustes vulgaris Gesneri & Aldrovandi. Willugb. orn. 178. t. 44.

Austr. Kernbeiß, Rußbeißer.

Habitat ubique in sylvis.

Victitat nucleis, seminibus.

2. *LOXIA* rostro forficato. Linn. Fn. Suec. 177.

Loxia. Gesn. av. 592. Willugb. ornith. 181. t. 68. Raj. av. 86.

Austr. Krumb Schnabl, Kreuzvogel.

Habitat in sylvis abietinis.

Victitat seminibus abietis, cannabis, Juniperi, aliarumque baccarum nucleis. Quamquam enim coni abietis vulgarissimus ejus sint cibus, nihilominus tamen hyeme gemmis arborum, & aliarum plantarum seminibus quoque victitat. Plures enim aviario inclutas per annos amygdalis, cannabe, baccis aucupariæ, ligustri, Juniperi, avellanis, & præprimis nucibus alui. Cæterum notandum, quod, quemadmodum ex americanis, Asiaticis, Africanisque avibus constat, elegantiam colorum a climate dependere sicque colorem nigrum & album in septentrionalibus potissimum conspicuum esse, ita loxiæ hujus mas elegantioris coloris in Austria & Styria videatur; variat enim colore viridi, luteo, aurantio, & sæpe sæpius coccineo.

3. *LOXIA* artubus nigris, tectricibus caudæ remigumque posteriorum albis. Linn. Fn. Suec. 178.

Rubicilla, f. *Pyrrhula*. Gesn. av. 733. Willugb. orn. 130. t. 43. Raj. av. 86. n. 5.

Pyrrhula, f. *Rubicilla*. Aldr. ornith. l. 17. c. 31. Jonst. ornith. 122. t. 43.

Austr. Gumpel.

Habitat passim in sylvis montanis, hyeme ubique.

Victitat gemmis arborum, baccis ligustri, cannabe aliisque seminibus.

OBSERVATIO. Maxilla utraque in hoc genere, ac in fringillis & Emberizis mobilis, unde semina non integra deglutiuntur, sed enucleantur.

FRINGILLA

1. *FRINGILLA* remigibus antrorsum luteis: extima immaculata; rectricibus duabus extimis toto, reliquis apice albis. Linn. Fn. Suec. 175. Car-

Carduelis. *Gesn. av. 242. Aldr. ornith. l. 18. c. 3. Jonst. ornith. 97. t. 37. Willughb. ornith. 189. t. 46. Raj. av. 89. n. 1.*

Chrysomitres Aristotelis.

Austr. Stiglis.

Habitat ubique in sylvis, fruticetis, & pomariis.

Victitat seminibus præsertim cannabis, lappæ, & carduorum.

OBSERVATIO. Tempore autumnali rectrices, & remiges apice albert, vere autem omnino nigræ sunt. Nec alio modo mas a fæmina distingui potest, quam quod scapulæ in mare nigræ, in fæmina cinereæ sint, quod ideo certum est, ut etiam in pullis antequam rubedo in capite appareat jam observetur.

2. FRINGILLA remigibus medio luteis: primis quatuor im-maculatis; rectricibus duabus extimis, reliquisque apice albis. *Linn. Fn. Suec. 203.*

Acanthus avicula. *Gesn. av. 1.*

Carduelis croceus. *Alberti.*

Spinus s. ligurinus. *Aldr. ornith. 353. l. 14. f. 28. Willughb. ornith. 192. t. 46. Raj. av. 91. n. 1.*

Ligurinus Spinus. *Jonst. ornith. t. 37.*

Austr. Zeisel, Zeiserl.

Habitat in alnetis ubique. Victitat seminibus, præsertim alni.

OBSERVATIO. Mirum, quod quamquam infinitus numerus pullorum omni anno in nemoribus Danubialibus st. tim antequam primas pennas deposuerint jam videatur, & capiatur; nidus tamen vel nunquam vel rarissime aviculis adhuc intus tegentibus reperiatur. Plures quidem nidos ex lanugine pappoque diversarum plantarum, præsertim populi lybicæ &c. Confectos, & ex ramo salicis supra aquas pendentes vidi, quos mihi venatores, & aucupes pro nidis hujus aviculæ obtruserunt; ast nidi Penduli Bononiensium non ligurini fuerunt. Inde fabula inter plebem ventilatur: lapidem in hoc nido contineri, a quo invisibilis reddatur, nec nidum præsentibus adhuc pullis videri, imaginem vero ejus in aqua conspici posse. Derelicto autem ab aviculis nido lapidem a parentibus quoque auferri, & nidum visibilem reddi. Nec desunt furtorum dicti lapidis adminiculo perpetratorum narratiunculæ, quibus literatorum aliqui subscribere non erubescunt. Causa potius cur vacuus sæpe nidus, non vero pullis repletus inveniat, hac

hac

hæc videtur, quod verno & æstivo tempore foliis arboris obtegatur, quibus autumnali tempore delapsis facile queat videri. Cum anno 1745. circa medium Junii Fischamentæ una cum amico plantas colligendi causa nemora danubialia accesserim, vidimus ligurinos marem & fæminam escam in rostro ad cibandos pullos ferre, & alno ad ripam danubii ibidem sito reiterato volatu insidere, dum vacuo rostro iterum avolare, plenoque rursus redire, idque pluribus vicibus. Ast omni etiam adhibita diligentia nidum nec in arbore, nec in aqua vicina videre, multo minus invenire, aut pullorum sibilum percipere potuimus. Revelabit tamen forte dies & ornithologorum industria nidum occultantem ligurini astutiam.

FRINGILLA alarum basi subtus flavissima. *Linn. Fn. Suec. 198.*

Montifringilla mas. *Jonst. orn. 99. t. 38.*

Fringilla montana s. Montifringilla. *Willughb. orn. 187. t. 45. f. 5.*

Fringilla montana. *Raj. av. 88.*

Austriacis Ricowiz, a corrupta voce Bohemica Scawez, alibi Quecker, Piencken.

Habitat copiose in sylvis faginis; autumnò gregatim in Austriam volitans, vere iterum discedens.

Vicitat arborum gemmis, & seminibus, præsertim fagi.

FRINGILLA artubus nigris; remigibus utrinque albis, tribus primis immaculatis; rectricibus duabus oblique albis. *Linn. Fn. Suec. 199.*

Fringilla. *Gesn. av. 387. Aldr. ornith. l. 13. c. 6. Willughb. ornith. 186. f. 4. t. 45. Raj. av. 88.*

Austr. Ginf.

Habitat ubique in sylvis, & nemoribus; ubi nidificat.

Vicitat arborum gemmis, seminibus.

OBSERVATIO. Fringilla artubus, remigibus, rectricibusque nigris. duabus utrinque extimis a medio extrorsum albis. *Linn. Fn. Suec. 200. fæmina est.* Plurimi mares, & fæminæ gregatim discedunt autumnò, manent tamen aliqui mares, & quædam fæminæ per hyemem, quemadmodum fæminæ prius avolant, ita tardius redeunt, idque non solum in hac specie sed in plerisque avibus observatur.

FRINGILLA remigibus primoribus antice luteis; rectricibus tribus lateralibus basi luteis. *Linn. Fn. Suec. 202.*

Chlo-

Chloris. Gesn. av. 259. Willugb. ornith. 129. t. 44. Raj. av. 85. n. 4.

Austr. Grünling.

Habitat ubique in hortis, & in arboribus inter prata sitis.
Victitat seminibus.

6. *FRINGILLA* rostro corporeque albicante, rectricibus remigibusque virescentibus. Linn. Fn. Suec. 207.

Canaria. Gesn. av. 240.

Passer canariensis. Jonst. ornith. t. 36. Willugb. ornith. 192. t. 46. Raj. av. 91. n. 6.

Austr. Canarien = Vogl.

Habitat in domibus ubique culta, in aviariis, & cubiculis nidificans. Cum chloride, carduele, & gryllo coit, pullosque utriusque speciei effigiem mixtim referentibus, ast steriles, educat.

Victitat seminibus, præsertim cannabis, phalaridis, lactucæ, Myagri, avenæ, Napi &c.

7. *FRINGILLA* vertice, collo antice, pectore, & urrhopyg-hio flavis, dorso virescente; remigibus rectricibusque nigricantibus margine albidis.

Gryllus s. *Serinus*. Gesn. Aldr. Willugb.

Gyrola Alfatis.

Austr. Hirn = Grisserl.

Habitat in arboribus inter prata sitis.

Victitat seminibus, præsertim myagri, Milii.

OBSERVATIO. Quemadmodum hæc omnium fringillarum minima voce & figura canariam viridem refert, a qua tamen rostro obtusiore, & respectu corporis crassiusculo, ac cantu differt, ita ejus mas cum canaria femina caveæ inclusus omnium lubentissime nidificat, & generat.

8. *FRINGILLA* remigibus nigris: primoribus margine utroque albis; rectricibus nigris utroque marginē albis.
Linn. Fn. Suec. 209.

Linaria rubra major. Willugb. ornith. 191. t. 46. Raj. av. 90. n. 2.

Linaria. Gesn. & Aldr.

Miliaria. Ruellii.

Austr. Hanessert, Hämpling.

Habitat in nemoribus & vepretis, ac inter hortos & acera campestria passim; nidificat sub fascibus vitis; in hortorum ambulacris; ac inter frutices.

Victitat seminibus.

OBSERVATIO. Mas vernali tempore captus elegantius rubet, quam autumnali, ambo tamen cavæ inclusi post duos annos elapsos rubedinem amittunt in vertice & pectore alias conspicuam. An idem si in libertate vivunt? Neque pulli mares a fæminis dignosci possunt, nisi colore dorfi & præsertim scapularum quæ in maribus sive pul-
lis, sive adultis magis rufescunt, in fæminis cinere-
scunt, evidentiusque sexum distinguendi signum quam
vertex, & pectus præbent.

9. **FRINGILLA** remigibus rectricibusque fuscis margine ob-
solete pallido, litura alarum albida. *Linn. Fn. Suec.*
210.

Linaria rubra. Gesn. av. 591. Aldr. ornith. l. 18. c. 9.

Linaria rubra minor. Willughb. ornith. 191. Raj. av. 91.
n. 3.

Austr. Grasel, Meerzeisel, Eschötscherl.

*Habitat in alnetis per hyemem tantum, gregatim in Austriam
volans, nec omni anno accedens.*

Vicitat seminibus, præsertim alni.

OBSERVATIO. Magna affinitas cum fringilla secunda, seu li-
gurino cujus potius quam linariæ figuram refert, quare
ab aucupibus Viennensibus Meerzeisel, seu ligurinus ma-
rinus nuncupatur. Forma fere eadem, modus volan-
di idem, pedes & ungues fortissimi quibus ramulos apre-
hendit, alnique fructus erodit uterque, utriusque facies
circa rostrum nigricans, gula nigra, in illo vertex ni-
ger in hoc coccineus; urrhopyghium in hujus speciei
mare & fæmella rubrum quo, sicut & rostro luteo ac
gula nigra a præcedente seu Fringilla octava facile dis-
tinguitur. Vertex in fæmina ac in mare coccineus.
Pectus in mare roseum, in fæmina testaceum. Mas
aviario inclusus colorem in pectore roseum intra annum
in pallide miniaceum mutat, & post biennium plane
amittit remanente tamen semper coccineo colore in ver-
tice utriusque sexus.

10. **FRINGILLA** remigibus rectricibusque fuscis, gula nigra,
temporibus ferrugineis, urrhopyghio testaceo.

*Fringilla remigibus rectricibusque fuscis, gula nigra,
temporibus ferrugineis. Fn. Suec. 212.*

Passer. Gesn. av. 643.

Passer domesticus. Willughb. ornith. 182. t. 44.

Passer domesticus struthos. Raj. av. 86.

Austr. Hauspasp.

Habitat ubique juxta domus, horrea, & mœnia, sæpius in nidis hirundinis nidulans.

Victitat frugibus.

II. FRINGILLA remigibus, rectricibusque fuscis, vertice spadiceo; urrhopyghio virescente.

Passer vertice rubro in cavitatibus arborum nidulans. Alberti.

Passer montanus. Aldr.

Austr. Feldspas, Rohrspas.

Habitat in nemoribus, & salicetis; nidificat in cavis arboribus, hyeme tamen pagos petit.

Victitat frugibus.

DESCRIPTIO. Magnitudo circiter carduelis, facies exacte præcedentis, vox parum distincta. Mas & fœmina in hac specie colore non differunt; gula in mare ac in fœmella nigra, vertex spadiceus, macula illa alba in passere domestico utrinque retro oculum observabilis abest, sed illius loco macula nigra utrinque ad aures; & torques albus in collo, nec urrhopyghium ut in præcedente testaceum, sed cinereo viride.

EMBERIZA.

I. EMBERIZA rectricibus nigricantibus, extimis duabus latere interiore, alba acuminata macula, gula pectoreque flavis.

Fringilla rectricibus nigricantibus, extimis duabus latere interiore alba acuminata macula. Linn. Fn. Suec.

205.

Emberiza flava. Gesn. av. 653. Willugb. ornith. 196. t. 40.

Raj. av. 93. n. 2.

Luteæ alterum genus. Aldr.

Chloris f. lutea. Aristotelis. Turn. hist.

Hortulanus. Bellon. av.

Gursa vel Ameringa. Alberti.

Austr. Ammering, Goldammering, Emmerling.

Habitat vere & æstate ubique in nemoribus, & sylvarum marginibus, hyeme juxta domos, horrea, viasque publicas. Nidificat inter frutices.

Victitat frugibus, & præsertim avena.

2. EMBERIZA rectricibus nigricantibus extimis duabus latere in-

interiore alba acuminata macula; gula, lineaque a ro-
stro per aures extensa nigris.

Austr. Gelbföpfige Wiesen = Ammering. Bononiensibus
Cillo.

Habitat vere in campis, & nemoribus rarius.
Victitat frugibus.

3. EMBERIZA capite cinereo lineis nigricantibus variegato.
Cirlus. Willughb.

Cia Bononiensium sylvatica lutei congemer. Aldr.

Austr. Steinammerling, grauföpfige Wiesen = Ammering.

Habitat vere in campis, fruticetis, & sylvarum marginibus.
Victitat frugibus.

4. EMBERIZA capite virescente, annulo circa oculos gulaque
flavescentibus.

Fringilla remigibus nigris: primis tribus margine albi-
dis: rectricibus nigris: lateralibus duabus extror-
sum albis. Linn. Fn. Suec. 208.

Hortulana. Gesn. av. 561.

Hortulanus. Jonst. ornith. t. 37. Willughb. ornith. 197. t. 40.
Raj. av. 94. n. 6.

Austr. Drtulan.

Habitat in campis & arboribus inter prata sitis, præsertim cir-
ca Medling. Caveæ inclusa noctu canit.

Victitat frugibus, præsertim milio.

5. EMBERIZA capite nigro maxillis rufis, torque albo; cor-
pore rufo nigricante.

Fringilla capite nigro, maxillis rufis, torque albo, cor-
pore rufo-nigricante. Linn. Fn. Suec. 211.

Emberiza pratensis. Gesn.

Passer torquatus in arundinetis nidificans. Willughb. orn.
196. Raj. av. 93. n. 3.

Austr. Mohrammering, Meerspaß.

Habitat in arundinetis, & pratis.

Victitat seminibus, præsertim milio.

6. EMBERIZA pectore ex albo ochreo punctis nigris macu-
lato.

Fringilla grisea nigro maculata. Linn. Fn. Suec. 206.

Emberiza alba. Gesn. av. Raj. av. 93. n. 1. Willughb. orn.
195. t. 40.

Alaudæ congener. Aldr.

Cenchramus. Aristot. & Bellon.

Austr. Bragler.

Habitat in campestribus præsertim circa Leytæpontum.

Victitat frugibus.

7. *EMBERIZA* remigibus albis : primoribus extrorsum nigris, rectricibus nigris: lateralibus tribus albis.

Alauda remigibus albis: primoribus extrorsum nigris, rectricibus nigris: lateralibus tribus albis. *Linn.*

Fn. Suec. 174. t. 1. Acad. Stockb. 1740. p. 368. t. 1. f. 9.

Passer alpino-lapponicus f. *Nivalis*. *Aët. Ups. 1736. p. 11. n. 16.*

Emberiza prima *Avis nivalis*. *Linn. Syst. natur. p. 31.*

Montifringilla calcaribus *alaudæ* f. *major*. *Willughb. orn. 187. t. 77. Rai. av. 88.*

Austr. Meerstiglitz.

Habitat in campis & juxta vias publicas dum omnia nivibus obtecta sunt in Austriam gregatim transmigrans.

Victitat frugibus: nec arboribus insidentem hætenus vidi, cavæ tamen inclusa baculis insidet, ubi milio potissimum vescitur, & ultra modum ac hortulanus pinguescit.

DESCRIPTIO. Magnitudo *alaudæ* campestris. Rostrum luteum; caput, collum, pectus & abdomen in mare alba, excepto quod vertex, linea a rostro per oculos ad aures extensa, & macula utrinque in pectore magna rufescant. Dorsum in quibusdam nigrum, in aliis griseo nigroque maculatum. *Urrhopygium* rufo-testaceum; humeri pennulis nigris margine cinereis in quibusdam teguntur. *Tectrices* alarum primi ordinis ejusdem cum *urrhopyghio* coloris, quæ dein sensim albescunt, alæ complicatæ albæ apicibus versus terram nigræ, litura tamen rufa in iis quasi conspicua. Cauda nigro alboque varia. Color albus in fæmina ad testaceum declinat. Pedes nigri tetradactyli ungue digiti postici longissimo.

Anno 1752. dum Viennæ me ad examen subeundum præparavi, aucupes mihi attulere avem inter descriptas captam; his quoad figuram quidem simillimam sed paulo minorem, voce hæc & simul hortulanum *Gesneri* æmulantem; toto corpore posterius testaceo, rufo, nigroque variam; in collo & capitis lateribus nigro maculatam; vertice nigricante: ad nucham utrinque albidam; Pedibus nigris ungue digiti postici longissimo; rostro ex fulvofusco præcedentis simillimo. Hæc primo intuitu

tuitu progenies *Avis nivalis* cum *Emberiza torquata* videbatur; dein tamen dubitare licuit an fors hæc variatio prioris sit *Avis* ignota a Piperino missa Gesneri, quam celeberrimus Linnæus in *Fauna Suecica* p. 74. ulterius examinandam proponit? Quod determinare non audeo, tunc etenim magis necessariis studere, & examen aviculæ differre oportuit, interim avis periit.

P E N D V L V S.

I. P E N D V L V S. *Instit. Bonon.*

Austr. Rohrspaß, persianischer Spatz, türkischer Spatz.

Habitat in arundinetis, præsertim hyemali tempore copiosè circa Leytæpontum.

Viçtitat seminibus arundinis, Typhæ &c. Vermiculis.

DESCRIPTIO. Aviculam hanc DD. Joseph Monti in antiquissima Europæ universitate Bononiensi Botanices & Historiæ naturalis Professor. Acad. Bonon. Socius mihi ibidem primus monstravit; nomenque huic aviculæ a dicta societate impositum patefecit; dein in patriam redux eandem quoque in Austria habitare observavi. Magnitudo pari caudati; rostrum tenue, fulvum basi subtilissimis setis tectum, maxillæ superioris apice leviter adunco. Caput cinereo cærulescens. Iris flava, pupilla nigra. Collum anterius, pectusque dilute rubent; abdomen album, a rostro versus collum macula in mare utrinque nigra magna ex peculiaribus pennis constructa apice a capite distante Thracicam barbam exacte æmulans. Dorsum & Urrhopygium ex luteo-ferruginea. Anus niger. Rectrices corpore longiores ferrugineæ. Remiges 1-6. cinereæ exteriore margine albæ. 7-15. fusce margine exteriore rufo, interiore & apice albis. 16-17. medietas exterior fusca margine rufo medietas interior alba. Pedes unguiculique acutissimi nigri. Fæmina barba caret. Nidificat in Salicibus ubi nidum ex pappo diversarum plantarum præcipue tamen Typhæ & populi folio tremulo miro artificio construit, & in ramulum sacculi ad instar suspendit.

M O T A C I L L A.

I. M O T A C I L L A pectore nigro. Linn. Fn. Suec. 214.

Motacilla, culicilega, fusurada. Bellon. icon. 88. b.

Motacilla quam nostri albam cognominant. *Gesn. av. 618.*

Motacilla alba. Jonst. ornith. 120. t. 43. Willugb. ornith. 171. t. 42. Raj. av. 75. n. 1.

Austr. graue Bachstelze.

Habitat ubique ad rivos, fluvios, & in pratis.

Vidit at culicibus, erucis, muscis.

2. *MOTACILLA* pectore abdomineque flavo, rectricibus duabus exterioribus dimidiato oblique albis. *Linn. Fn. Suec. 215.*

Motacilla flava. Gesn. av. 618. Aldr. ornith. l. 17. c. 24. Willugb. ornith. 172. t. 68. Raj. av. 75. n. 2.

Austr. gelbe Bachstelze.

Habitat ubique in pratis udis, & circa paludes.

Vidit at iisdem.

3. *MOTACILLA* pectore albo, capite & collo piceis, corpore nigricante.

Motacilla pectore albo, corpore nigricante. Linn. Fn. Suec. 216.

Merula aquatica, f. Miliaria. Gesn. av. 609.

Merula aquatica. Jonst. ornith. t. 53. Willugb. ornith. 104. t. 24. Raj. av. 66. n. 7.

Austr. Wasser = Amsel, Bach = Amsel.

Habitat ad rivos inter montes fluentes, præsertim retro monasterium ad St. Crucem vulgo Heiligenkreuz, Viennam Scottensem seu Scotto - Viennam, & in valle Breinina.

Vidit at insectis aquaticis, pisciculis.

ANNOTATIO. In arce Tirolensi *Ambras* dicta inter alia rarissima naturalia ibidem asservata, monstratur talis motacilla a duce Maximiliano (ni fallor) hamo dum piscabatur loco piscis extracta.

4. *MOTACILLA* dorso cano, fronte urrhopyghio & linea supra oculos albis.

Motacilla dorso cano, fronte alba, oculorum regionibus nigris. Linn. Fn. Suec. 217.

Oenanthe f. Vitiflora. Willugb. ornith. 168. t. 41. Raj. av. 75. n. 1.

Oenanthe Aristoteli & Plinio. Jonst. ornith. 123. t. 45. f. 13.

Oenanthe Bellonii.

Vitiflora Gazæ.

Cinclus Turneri.

Austr.

Austr. Steinschwäger, Steinschnapperl.

Habitat ad lapidicinas, & furnos lateritios, ac juxta aquas.

Victitat insectis.

5. MOTACILLA capite & dorso griseo nigroque variis; pectore testaceo, urrhopyghio rufescente.

Oenanthe secunda. Willughb.

Austr. Gestettenschlager.

Habitat in pratis, salicetis, & praesertim agris Zea seminatis.

Victitat insectis.

- 6 MOTACILLA nigricans, macula alarum magna, supercilliisque albis, pectore & gula ochreis.

Motacilla nigricans, supercillis albis, macula alarum alba, gula flavescente. Linn. Fn. Suec. 218.

Montanellus f. Muscicapa tertia. Aldr. ornith. 735.

Oenanthe nostra tertia. Raj. av. 76. n. 4.

Muscicapa nostra tertia. Willughb. ornith. 169. t. 41. f. 5.

Austr. Cristössl.

Habitat passim in dumetis, & fruticetis.

Victitat insectis, baccis.

7. MOTACILLA pectore caeruleo macula flavescente albedine cincta. Linn. Fn. Suec. 220.

Wegflecklin. Gesn. av. 796.

Phoenicuro similis ornithologo. Aldr. ornith. 749.

Ruticilla 3. Wegflecklin. Willughb. ornith. 160.

Austr. Blaukröpf.

Habitat in salicetis, & alnetis praesertim nemorum danubialium minus tamen frequens.

Victitat insectis, baccis.

8. MOTACILLA corpore subtus testaceo, supra testaceo rufescente.

Junco. Aldr.

Alcedo. Bellonii.

Austr. Rohrvogl.

Habitat in arundinetis; Nidum tribus arundinibus colligatis construit.

Victitat insectis aquaticis.

9. MOTACILLA rufo-cinerea, genuum annulis cinereis.

Linn. Fn. Suec. 221.

Luscinia. Gesn. av. 592. Aldr. ornith. l. 18. c. 2. Jonst. ornith. 45.

Luscinia f. Philomela. Willughb. ornith. 161. t. 41. Raj. av. 78. n. 2.

Austr. Au = Vogel, Auen = Rachtigall.

Habitat in nemoribus danubialibus passim.

Victitat insectis, baccis.

10. MOTACILLA toto corpore rufo, subtus pallidiore.

Luscinia sepium. Bellonii.

Luscinia minor. Aldr. & Jonston.

Austr. Wald = Rachtigall, Wald = Vogel.

Habitat ubique in fruticetis sylvarum, & in pomariis.

Victitat insectis, baccis.

11. MOTACILLA gula nigra, abdomine rufo, capite dorsoque cano. Linn. Fn. Suec. 224.

Ruticilla. Raj. av. 78. n. 5.

Ruticilla, Phoenicurus Græc. Willugb. ornith. 159.

Austr. Waldrothschweissl.

Habitat ubique in nemoribus danubialibus, pratorum arboribus, & pomariis. Nidificat in cavis arboribus.

Victitat insectis, baccis.

OBSERVATIO. Fæmina a mare colore omnino distincta, nisi pedibus, & rostro nigris, ac cauda rufescente cum illo conveniens.

12. MOTACILLA corpore nigro, cauda rufa.

Austr. Hausbrothschweissl.

Habitat ad domos & templa, in cavis parietum nidulatur.

Victitat insectis, baccis.

OBSERVATIO. Præcedente duplo major, fæmina magis cinerea cauda rufescente Turribus, & templorum tectis insidens tota die a solis ortu ad occasum usque egregie cantillat. An Passer solitarius italorum.

13. MOTACILLA grisea, gula pectoreque fulvis. Linn. Fn. Suec. 226.

Rubecula s. Erithacus. Willugb. ornith. 160. t. 38. Raj. av. 78.

Austr. Rothkröpsl.

Habitat ubique in sylvis, pomariis, & fruticetis præsertim autumno.

Victitat insectis, baccis, & præsertim seminibus Evonymi.

14. MOTACILLA fusca capite cinereo, pectore ochreo-testaceo; iridibus croceis.

Prunella. Gefn.

Passer stultus. Aldr.

Austr. Braunnellerl, Prunnellerl.

Habitat passim in sylvis & hortis autumno. Victitat insectis, baccis, seminibus.

15. Mo-

5. MOTACILLA testacea subtus subcinerea pileo obscuro.
Linn. Fn. Suec. 229.

Atricapilla f. Ficedula. *Aldr. ornith. l. 17. t. 36. Jonst. ornith. t. 45. Willughb. ornith. 162. Raj. av. 79. n. 8.*

Austr. Schwarzlattl.

Habitat ubique in sylvis, nemoribus, & hortis ac fruticetis.

Victitat insectis, baccis.

6. MOTACILLA fronte, torque, pectore, & alarum macula albis: vertice tergo, & cauda nigris.

Atricapilla tertia. *Aldr.*

Austr. Meerschwarzlattl, Baumschwalbl.

Habitat in nemoribus in cavis arboribus nidulans.

Victitat insectis, baccis.

OBSERVATIO. Fæmina a mare tota facie distincta est, cinerea artubus fuscis ubi mas nigricat. Figura tabulæ primæ Faunæ Suecicæ non convenit cum Synonymis & definitione clarissimi Linnæi; videtur numerus 229. a pictore tabularum numeri 230. loco appositus fuisse, convenit nostræ descriptio Linnæana sub numero 230. data. Cæterum (ni fallor) descripsit hanc aviculam, iconemque dedit Aldrovandus sub nomine ficedulæ nec dum in atricapillam mutatæ; Aldrovandi, & Jonstoni per plures annos jam carenti quidquam certi statuere denegatur.

7. FICEDULA toto corpore testaceo-cinereo, pectore & superciliis pallidioribus.

Ficedula cannabina. *Willughb.*

Austr. großer Spottvogel.

Habitat in nemoribus passim.

Victitat insectis baccis.

8. MOTACILLA subtus albida, supra fusca.

Curucca prima, quam lucarni, & circa lacum Verbanum baccafigos, seu ficedulas vocant. *Gesner.*

Austr. braune Grasmucke, Fleiner Spottvogel.

Habitat ubique in hortis, nemoribus, & fruticetis.

Victitat insectis, baccis.

9. MOTACILLA supra cinereo-fusca, gula pectoreque albis, capite cærulescente.

Curucca tertia. *Gesn.*

Austr. blaue Grasmuck, Weißbartl, Fleiner Dorngraul.

Habitat in dumetis.

Victitat insectis seminibus, baccis.

20. *MOTACILLA* grisea alis nigro cinereoque undulatis. *Linn. Fn. Suec. 232.*

Passer troglodytes. Gesn. av. 651. Willughb. ornith. 164. t. 42. Raj. av. 80.

Passer troglodytes Bellonii. Aldr. ornith. l. 17. c. 4.

Austr. Schneekönig, Rönickerl, Zaunschlupferl.

Habitat passim in nemoribus, & fruticetis; hyeme ubique ad domos in sepibus, & inter fasces, ac ligna. Nidificat sub terra præsertim Viennam inter & Schwechat in ripis viæ regie.

Victitat insectis.

21. *MOTACILLA* remigibus secundariis exteriori margine flavis, medio nigris. *Linn. Fn. Suec. 255.*

Parus sylvaticus. Gesn. av. 643.

Regulus. Aldr. ornith. l. 17. c. 1.

Passerculus troglodytes. Jonst. orn. t. 42.

Regulus cristatus. Willughb. ornith. 163. t. 41. Raj. av. 79. n. 9.

Austr. Goldhannel.

Habitat autumnno ubique in arboribus, æstate in sylvis majoribus.

Victitat insectis, baccis.

22. *MOTACILLA* cinereo virescens, subtus flavescens superciliis luteis. *Linn. Fn. Suec. 236.*

Regulus alius non cristatus. Aldr. ornith. l. 17. c. 2.

Regulus non cristatus. Willughb. ornith. 164. t. 42. Raj. av. 80. n. 10.

Austr. Schmittl.

Habitat in nemoribus danubialibus, alibique in sylvis passim.

Victitat insectis.

ANNOTATIO. Rogantur ornithologi in describendis avibus, præsertim motacillis magnitudinem exactam addere non ædignentur.

P A R V S.

1. *PARVS* capite nigro, temporibus albis, nucha lutea. *Linn. Fn. Suec. 238.*

Parus major. Gesn. av. 640. Bellon. icon. 95. a. Aldr. ornith. l. 17. c. 13.

Fringillago s parus major. Willughb. ornith. 174. Raj. av. 73. n. 3.

Austr.

Austr. Kohlmeise.

Habitat ubique in sylvis, nidulatur ut congenere in cavitatibus arborum.

Victitat insectis, nucibus amygdalis, parvis aviculis &c. cibum frustatim decerptum devorat, sicut omnes hujus generis.

PARVS capite cristato. Linn. Fn. Suec. 239.

Parus cristatus. Gesn. av. 642. f. med. Willughb. ornith. 175. t. 43. Raj. av. 74. n. 6.

Austr. Schopfmeise.

Habitat in sylvis majoribus passim.

Victitat insectis, nucibus.

PARVS remigibus cærulefcentibus: prima margine exteriore alba; vertice cæruleo. Linn. Fn. Suec. 240.

Parus cæruleus. Bellon. icon. 96. a. Gesn. av. 641. Willughb. ornith. 175. Aldr. ornith. l. 17. c. 17.

Austr. Blaumeise.

Habitat ubique in sylvis.

Victitat iisdem.

PARVS capite nigro: vertice albo, dorso cinereo, pectore albo. Linn. Fn. Suec. 241.

Parus ater. Gesn. av. 641. Aldr. ornith. l. 17. c. 19. Willughb. ornith. 175. t. 43. Raj. av. 73. n. 2.

Austr. Speermeise, Kreuzmeise.

Habitat passim in sylvis.

Victitat iisdem.

PARVS capite nigro, temporibus albis; dorso cinereo. Linn. Fn. Suec. 242.

Parus palustris. Gesn. av. 642. Willughb. ornith. 175. t. 43. Raj. av. 73. n. 3.

Austr. Hundmeise.

Habitat ubique in nemoribus danubialibus, alibique inter arbores & in fruticetis juxta aquas.

Victitat iisdem.

PARVS vertice albo, cauda corpore longiore. Linn. Fn. Suec. 243.

Parus caudatus. Gesn. av. 642. non fig. Willughb. ornith. 176. t. 43. Raj. av. 74. n. 8.

Parus caudatus s. Monticula. Aldr. ornith. 17. c. 15.

Austr. Belzmeise, Pfannenstiel.

Habitat passim in sylvis montanis, in fine autumnii ubique in sylvis, & pomariis.

Victitat insectis.

OBSERVATIO. An Pari ad corvos referri debent? cum rostrum hujus generis fortissimum, & revera cultratum sit, basique setis tectum; ac alimenta frustatim devorentur & prima species præsertim unacum fringillis vel congeneribus minoribus cavæ inclusa easdem enecet, & cerebro illarum victitet, voxque garrula observetur; modusque volandi idem. Nec obstare videtur linguæ, si quæ datur differentia, siquidem alias multæ anatum species ob linguæ apicem integrum vel trilobum separari deberent; nec rostrum subulatum; quod in corvis plerisque pariter subulæ crassioris figuram refert. Quemadmodum corollæ vel alterius partis magnitudo diversum plantæ genus neotericis non ponit Botanicis.

H I R V N D O.

1. **HIRVUNDO** rectricibus excepto pari intimo alba macula notatis. *Linn. Fn. Suec. 244.*
Hirundo domestica. Gesn. av. 548. Aldr. ornith. l. 17. c. 16. Willughb. ornith. 155. t. 39. Raj. av. 71. n. 1.
Austr. Haußschwabe.
Habitat ubique in domibus intra tectum, in cubilibus, & stabulis nidulans.
Victitat culicibus, muscis & præsertim apibus, araneis.
2. **HIRVUNDO** dorso nigro cærulescente, rectricibus immaculatis. *Linn. Fn. Suec. 245.*
Hirundo sylvestris. Gesn. av. 564.
Hirundo agrestis. Jonst. ornith. 117.
Hirundo agrestis s. rustica Plinio dicta. Aldr. ornith. l. 17. c. 7.
Hirundo agrestis plinii s. rustica. Willughb. ornith. 155.
Hirundo rustica s. sylvestris. Raj. av. 71. n. 2.
Austr. Speyerl.
Habitat passim juxta domos, sub margine tecti extra domum summo parieti nidum affigens.
Victitat iisdem.
3. **HIRVUNDO** nigra tota, gula albicante. *Linn. Fn. Suec. 246.*
Apus. Gesn. 166. Aldr. ornith. l. 17. c. 19. Jonst. ornith. 119. t. 42.
Hirundo apus. Willughb. ornith. 156. t. 39. Raj. av. 72. n. 4.
Austr. Speyer, grosse Thurnschwabe.
Habitat in turribus, templis, arcibus, murisque præaltis.
Victitat iisdem.

4. *HIRUNDO* cinerea, gula abdomineque albis. Linn. Fn. Suec. 247.

Hirundo riparia f. *Drepanis*. Gesn. av. 656.

Drepanis f. *Riparia*. Aldr. ornith. l. 17. c. 8.

Hirundo riparia. Jonst. ornith. t. 42. Willughb. ornith. 156. t. 39. Raj. av. 71. n. 3.

Austr. Gestetten = Schwalbe.

Habitat ubique in abruptis littoribus, vel arenosis præcipitiis juxta fluvios; cavitates horizontales profundas effodiens, ac in illis nidum construens.

Viçtitat iisdem.

5. *HIRUNDO* cauda integra, ore setis ciliato. Linn. Fn. Suec. 248.

Strix, *Caprimulgus*, *Fur nocturnus*. Bellon. icon. 23. a.

Caprimulgus *Ægothelus*. Gesn. av. 242.

Caprimulgus. Jonst. ornith. 53. t. 20. Willughb. ornith. 70. t. 14. Raj. av. 26. n. 1.

Austr. Mückenstecher, Nachtrabl.

Habitat ubique de nocte volitans.

Viçtitat potissimum culicibus, phalænis: caprarum tamen & vaccarum ubera exugere creditur.

PRATINCOLA.

1. *PRATINCOLA*.

Austr. Brachvogel.

Habitat in pratis vastissimis ultra Leytæpontum vulgo aufdenen Heidwiesen, & circa lacum Nischiteriensem sitis.

Viçtitat insectis.

Avem hanc a nomine (quantum recordor) præter Aldrovandum sub nomine hirundinis marinæ descriptum, & depictam ad quod ne genus reducerem diu hæsitavi, nec inveni. Ob caudam bifurcatam, alas longissimas, modumque volandi ab immortali Aldrovando ad hirundines relatum fuisse judico, verum rictu illo amplo, quî characterem genericum harum fere solus constituit destituta, tibiisque altioribus donata est. Femorum seminudorum, digitique pedum postici brevioris respectu ad Scolopaces pertinere videtur; quod nec rostrum & cauda, nec modus volandi, nec ala admittunt. Rostro compresso maxilla superiore apice adunco, figuraque corporis seu habitu obiter consideratis cum *Procellaria* cele-

leberrimi Linnæi convenit; sed nec nares cylindro ro-
stro parallelo eique adnato donatæ, nec pedes palmati
sunt. Novum itaque genus requirit: cum in pratis
potissimum habitet Pratincolam nominavi.

DESCRIPTION. *Magnitudo figuræ seu Turdi viscivori. Ro-*
strum ad latera parum compressum, maxilla superiore
apice adunco: nigrum ad basin vero coccineum: *ver-*
tex, *collum*, *dorsum* & *alæ* rufo-brunei coloris; *Gula*
dilute testacea linea nigra ab oculis per aures extensa
cingitur. Pars colli anterior ex testaceo ad cinereum
vergit, donec idem color ad pectus perveniens sensim
evanescat, *pectore* in *sterno*, & *abdomine* albentibus. *Urr-*
bopyghii pars anterior cum dorso concolor, pars posterior
alba. *Rectricum* tectrices superiores bruneæ. *Remiges* &
rectrices fuscæ; pennæ sub alis rufæ. *Cauda* bifurcata.
Femora seminuda, quæ ut & *pedes* plumbei coloris sunt,
digiti antici tres membrana connexi, non tamen pal-
mati: posticus unus prioribus duplo minor.

Ergo character genericus Pratincolæ erit: *Rostrum* ad latera
parum compressum maxilla superiore apice adunco;
femora seminuda; *pedes* tetractyli postico anticis duplo
minore; *cauda* bifurca. *Alæ* longissimæ complicatæ cau-
dam fere eminentes.

CLASSIS III.

PISCES.

DE his interim monendum habeo, pace celeberrimorum
ichthiologorum Linnæi, & Artedii, quos ad cineres us-
que veneror, pinnarum radios ad distinguendas species
multum quidem conferre, non tamen sufficere, sed ac
petala corollæ in plantis numero variare. Nec iridis
pinnarumque ruborem constantem esse, verum ut fla-
vedinem corporis vel saporem secundum aquas quas in-
habitant mutari.

PLAGIURI.

Hujus Ordinis nullum in Austria reperivi.

CHON-

CHONDROPTERYGII.

ACIPENSER.

ACIPENSER corpore tuberculis obstituto; rostro obtuso; oris diametro rostri longitudinem superante.

Huso. Gesn.

Austr. Häuse.

Habitat in danubio pondus 300. & 350. librarum germanicarum subinde excedens.

SERVATIO. Ordo officulorum in dorso 13. lateralium 43. quo majorem nactus fuerit piscis longitudinem eo magis in dorso evanescunt ossea illa tubercula, ita ut in maximis haud amplius sint conspicua.

ACIPENSER rostro obtusiusculo ordinibus quinque squamarum ossearum: intermedio officulis decem.

Tücka vel Tocka. Gesn. Antacæi species ejusdem parali. 5.

Austr. Tück.

Habitat in danubio pondus 50. vel 60. librarum raro superans.

3. ACIPENSER rostro acuto corpore tuberculis spinosis aspero.

Acipenser corpore tuberculis spinosis aspero. Linn. Fn. Suec. 271.

Acipenser. Gesn. aqu. 2.

Sturio. Aldr. pisc. 517. 526. Willughb. ichth. 239. Raj. pisc. 112.

Austr. Schirf.

Habitat in danubio minus frequens.

PETROMYZON.

PETROMYZON pinna dorsali secunda angulata. Linn. Fn. Suec. 273.

Petromyzon unico ordine denticulorum minimorum in limbo oris, præter inferiores majores. Art. gen. 64. Syn. 89. Sp. 99.

Lampetra parva & fluviatilis. Rond. pisc. 2. p. 202. Gesn. aqu. 598. 706. Willughb. ichth. 104.

Lampetra fluviatilis Gesneri. Aldr. pisc. 81.

Austr. Neunaugen.

Habitat in limosis Danubii, Leythæ, Fischæ aliorumque fluminum

minum & rivulorum, longitudine sui corporis spithamam raro excedit.

Parit Martio.

2. PETROMYZON pinna dorsali secunda lineari, labio oris superiore pone labato. *Linn. Fn. Suec. 274.*

Petromyzon corpore annuloso, appendicibus utrinque duabus in margine oris. *Art. gen. 64. Syn. 90.*

Lampetra cæca seu oculis carens. *Willugb. ornith. 107. Raj. pisc. 36.*

Austr. Uhlen.

Habitat in fundo limoso Danubii, Fischæ, & Leythæ.

BRANCHIOSTEGI.

Hujus ordinis nullus in Austria habitat.

ACANTHOPTERYGII. COTTUS.

1. COTTUS alepidotus glaber, capite diacantho. *Linn. Fn. Suec. 279. Art. gen. 48. Syn. 76. Sp. 82.*

Cottus. *Rondelet. pisc. 2. p. 202.*

Cottus fluviatilis capitatus. *Gesn. pisc. 401.*

Cottus fluviatilis f. capitatus. *Aldr. ichth. 613.*

Gobius capitatus. *Fonst. pisc. t. 29. f. 11.*

Gobio fluviatilis capitatus. *Willugb. ichth. 137.*

Austr. Roppe.

Habitat passim in rivis, & fluviis limpidissimis arenoso solo gaudens, & inter saxa vivens. Præsertim in rivulis circa Moosbrunn, & in Fischæ circa Schwanendorff. Subinde quoque in danubio. Longitudine corporis digitum haud excedit.

Parit Aprili.

P E R C A.

1. PERCA pinnis dorsalibus distinctis: secunda radiis sedecim. *Linn. Fn. Suec. 284.*

Perca lineis utrinque sex nigris, pinnis ventralibus rubris. *Art. gen. 39. Syn. 66. Sp. 74.*

Perca fluviatilis. *Rondelet. pisc. 2. p. 196. Gesn. pisc. 698.*

Perca fluviatilis major. *Aldr. ichth. 622.*

Perca

Perca major. *Fonst. pisc. 146. t. 28.*

Austr. Verschling, Warschieger, & dum paludosa inhabitat ac inde flavet Goldpersche vocatur.

Habitat passim in fluviiis, rivulis, lacubus, piscinis, & paludibus. Pondus duarum librarum raro excedit.

Parit Aprili.

BSERVATIO. Clarissimus Linnæus in Syst. natur. edit. Stockh. 6. ord. 4. §. 127. n. 1. observavit pinnam dorsif primam 14. ossiculorum. Secundam 16. pectorales 14. ventrales 6. ani 12.

in diversis pinnas diverso modo constitutas inveni, nimirum

in una Pinna dorsif prima erat aculeorum 14. secunda radiorum 16. ut Linnæanæ.

in alia prima aculeorum 14. secunda radiorum 12.

in alia prima aculeorum 13. secunda radiorum 15.

in alia prima aculeorum 13. secunda radiorum 14.

omnibus autem constabant

Pinne pectorales radiis 12. inermibus.

— ventrales radiis 6. primo aculeato, cæteris quinque inermibus ramosis.

Pinna ani radiis 9. primis duobus aculeatis cæteris septem inermibus ramosis.

DIFFERT hæc species a quarta & quinta pinnis dorsalibus distinctis: prima macula nigra ultimum inter & penultimum aculeum notata, iride constanter crocea; aculeis omnibus rectis. Distinguitur a secunda, & tertia pinnis ventralibus & ani armatis.

PERCA pinnis dorsalibus distinctis secunda radiis viginti tribus. *Linn. Fn. Suec. 285.*

Perca pallide maculosa, duobus dentibus maxillaribus utrinque majoribus. *Art. gen. 39. Syn. 62. Spec. 76.*

Lucio-perca. *Gesn. paralip. 28. 1288. Willughb. ichth. 295. Raj. pisc. 98.*

Schilus s. *Nagemulus Germanorum.* *Aldr. ichth. 667.*

Austr. Schiel.

Habitat in danubio, & in fossis arcis Trautmansdorffensis quas fluvius Leytha transit, unde hoc anno dicto flumini communis. Pondus 8. vel 10. librarum raro 15.

Parit Aprili.

BSERVATIO Pinnarum dorsalium prima aculeis 14. rectis; secunda radiis 23. ramosis.

Pinnæ pectorales radiis 12. ad 16.

Pinnæ ventrales inermes radiis 6. ramosis.

Pinna ani inermis officulis seu radiis 14.

DIFFERT a quarta & quinta pinnis dorsalibus distinctis, prima aculeis rectis armata, a præcedente pinnis ventralibus & ani inermibus facieque diversa. A tertia per dentes primores duos prominentes in utraque maxilla, & pinna dorsali secunda omnino inermi.

3. **PERCA** pinnis dorsalibus distinctis, secunda officulis viginti primo aculeato.

Zingel vel Zingl. *Gesn. paralip.* 29.

Austr. Zingl.

Habitat in danubio pondus duarum raro trium librarum superans.

OBSERVATIO Pinnarum dorsalium prima aculeis 13. rectis.

Secunda officulis viginti primo maximo aculeato cæteris inermibus.

Pinnæ pectorales inermes radiis 12.

Pinnæ ventrales inermes radiis quinque ramosis.

DIFFERT a secunda officulo secundæ pinnæ dorsalis aculeato, corpore cylindraceo, dentibusque æqualibus. A prima pinnis ventralibus anique inermibus, a quarta & quinta pinnis dorsalibus distinctis, aculeis rectis. Meminit hujus quoque Jonstonus sub aspero dum eandem Zindel vel Zingel dicit, hujus tamen opera ad manus nunc Vienna exulis non sunt.

4. **PERCA** pinnis dorsalibus coadunatis radiis viginti septem: aculeatis quindecim. *Linn. Fn. Suec.* 286.

Perca fluviatilis minor. Aldr. ichth. 624. *Fonst. pisc.* 28.

Austr. Pfaffenstauß, Mozwölz.

Habitat ubique in fluviis, lacubus, & piscinis, longitudine corporis digitum haud excedit.

OBSERVATIO Pinnarum dorsalium primam in una aculeorum 15. secundam radiorum 11. in alia vero primam aculeorum 14. secundam 12. observavi.

Pinnas pectorales inermes radiorum 12.

— ventrales officulorum sex primo aculeato.

Pinnam ani officulorum 7. duobus prioribus aculeatis, posterioribus quinque inermibus ramosis.

DIFFERT a prima pinnis dorsalibus coadunatis aculeisque subarcuatis, a secunda & tertia insuper pinnis ventralibus, & ani armatis, a quinta seu sequente ore magis obtuso; aculeis in pinna dorsi paucioribus & robustioribus, corporeque latiore.

5. **PER-**

PERCA pinnis dorsalibus coadunatis radiis triginta & uno, aculeatis octodecim.

an? Cernua. *Linn. Syst. natur. edit. Stockh. 6. ord. 4. §. 127.*

Spec. 4. cum hac quoad aculeos in pinna dorsi convenit.

Austr. Schrasen, Schrazen.

Habitat in danubio, nec in aliis fluviiis hactenus reperiui.

Pondus quinque unciarum excedit, dum spithamam longitudine sui corporis attingit.

OBSEVATIO. Pinnæ dorsi coadunatæ in prima aculei 18. subarcuati, in secunda radii 13. inermes ramosi.

Pinnæ pectorales inermes officulis 14.

Pinnæ ventrales officulis 6. primo aculeato cæteris quinque inermibus.

Pinna ani radiis 7. duobus prioribus aculeatis, reliquis quinque inermibus.

Pinna caudæ radiis 18.

DIFFERT a prima pinnis dorsalibus coadunatis aculeisque subarcuatis fortioribus, a secunda & tertia insuper pinnis ventralibus, & ani armatis, a quarta ore magis acuto ad luciopercam accedente, aculeis pluribus, & respectu magnitudinis subtilioribus, ac lineis utrinque in dorso, lateralibusque duabus nigris rectis a capite ad caudam extensis.

MALACOPTERYGII.

M V R Æ N A.

MVRÆNA unicolor maxilla longiore. *Linn. Fn. Suec. 290*
Art. gen. 24. Syn. 39. Spec. 66.

Anguilla. *Rondel. pisc. 2. p. 198. Gesn. pisc. 40. Aldr. ichth. 544. Jonst. pisc. 114. t. 24. f. 7.*

Austr. Hal.

Habitat rarissime in Danubio, vel fluvio Marga dicto, passim vero in Austriæ superioris lacubus & fluviiis unde viva Viennam fertur. Pondus quinque vel sex librarum raro superans.

G A D V S.

GADVS dorso monopterygio, cirrhis maxillæ superioris duabus, inferioris quatuor. *Linn. Fn. Suec. 291.*

*Silurus cirrh*is quatuor in mento. *Art. gen.* 82. *Syn.* 110.
Spec. 107.

Silurus. *Rondelet. pisc.* 2. p. 180. *Gesn. pisc.* 867. 872. 1047.

Glanis. *Aldr. ichth.* 569. *Fonst. pisc.* t. 27. f. 8.

Austr. Schöden.

Habitat in Danubio, & Leytha. *Pondus* 300. *librarum subinde superans.*

Parit dum ligustrum floret.

2. *GADUS* dorso dipterygio, ore cirrato maxillis æqualibus.

Linn. Fn. Suec. 292. *Art. gen.* 22. *Syn.* 38.

Silurus cirro unico in mento. *Art. Spec.* 107.

Lota. *Rondelet. pisc.* 2. p. 164. *Raj. pisc.* 68.

Lota gallis dicta, Scinsia s. Potariffa. *Gesn. pisc.* 599.

Lota Rondeleti. *Aldr. ichth.* 648.

Mustela fluviatilis & lacustris. *Aldr. ichth.* 577.

Mustela fluviatilis lota. *Willugh. ichth.* 125.

Mustela fluviatilis. *Raj. pisc.* 67.

Austr. Malrutte, Nutte.

Habitat in fluviis præsertim Leytha, & Fischä, alibique in omnibus purioribus: pondus duarum vel trium librarum raro superat; contigit tamen unum hujus speciei Gadum 7. librarum, alterum quinque ad arcem Schlofshoof captum fuisse.

Parit Decembre.

E S O X.

1. *ESOX* rostro plagioplateo. *Linn. Fn. Suec.* 304. *Art. gen.* 14.
Syn. 26. *Sp.* 53.

Lucius. *Rondel. pisc.* 2. p. 188. *Gesn. pisc.* 500. *Aldr. ichth.* 630. *Fonst. pisc.* t. 29. f. 1. *Willugh. ichth.* 236. *Raj. pisc.* 12.

Austr. Hecht.

Habitat ubique in fluviis, lacubus, piscinis, & rivis, ac paludibus: pondus 17. & 20. librarum superat.

Parit desinente Martio, & initiante Aprili, ova hujus piscis comesta catharsin, emesinque excitant.

S A L M O.

1. *SALMO* dorso brunneo maculis nigris, lateribus ventreque albis.

Austr. Huch.

Habitat in Danubio, in fluviis Thraun, & Thrasen in Oeno, aliis-

aliisque inter montes fluentibus. Pondus 15. 20. & subinde 50. librarum.

OBSERVATIO. Pinna dorsi prima in æquilibrio posita officulorum 14. secunda in extremo dorso adiposa officulis carens. Pinnæ pectorales officulis 16. Pinnæ ventrales 10. Cauda bifurca officulis 20. Quem examinavi valde juvenis erat, an in adultis pinnæ aliter se habent?

2. SALMO maculis nigris brunneo cinctis: pinna pectorali punctis sex. *Linn. Fn. Suec. 308.*

Salmo latus maculis rubris nigrisque, cauda æquali. Art. gen. 12. Syn. 24. Spec. 51.

Trutta salmonata. Willugh. ichth. 193. Raj. pisc. 63.

Austr. Saxforelle.

Habitat in lacubus Austriæ superioris, in Styriæ, & Carinoliæ, ac Carinthiæ fluviiis, unde Viennam fertur.

3. SALMO maxilla inferiore longiore, maculis rubris. *Linn. Fn. Suec. 309. Art. gen. 12. Syn. 23. Spec. 51.*

Trutta fluviatilis. Rondel. pisc. 2. p. 169. Jonst. pisc. t. 16. f. 1. Willugh. ichth. 199. Raj. pisc. 65.

Trutta fluviatilis rondeletii. Gesn. pisc. 1102.

Trutta fluviatilis rondeletii. Gesneri Aldr. ichth. 589.

Austr. Forelle.

Habitat in omnibus fere amnibus limpidissimis inter montes fluentibus, hinc in valle Breinina, circa Novem Ecclesias, Scotto-Viennam, Neobergam, ad Waltersdorff & Schwanendorff in Fische, in rivis vallis Klam &c.

C O R E G O N V S.

1. COREGONVS maxilla superiore longiore plana, pinna dorsi officulorum quatuordecim. *Art. gen. 10. Syn. 19. Spec. 37.*

Albula nobilis, Gesn. pisc. 33. Jonst. pisc. t. 46. f. 1. Raj. pisc. 60.

Lavaretus allobrogum. Willugh. ichth. 183. Raj. pisc. 61.

Aust. Reinanfl.

Habitat in danubio.

2. COREGONVS maxilla superiore longiore, pinna dorsi officulorum viginti trium. *Linn. Fn. Suec. 314. Art. gen. 10. Syn. 20. Spec. 41.*

Thymus. Rond. pisc. 2. p. 187.

Thymallus s. Thymus. Gesn. pisc. 978.

Thymallus. Aldr. ichth. 594. Jonst. pisc. t. 26. f. 3. 4. 5. & 31. f. 6. Willugb. ichth. 187. Raj. pisc. 62.

Austr. Wsch.

Habitat passim in amnibus inter montes fluentibus, præsertim retro Scotto - Viennam, & Neobergam, nec non in Fischach circa Oberwaltersdorff, & Schwanendorff, ac Fischamentam. Pondus 2. vel 3. librorum raro superans.

Parit secundum anni constitutionem in fine Martii, Aprili, vel initio Maji.

CYPRINVS.

I. CYPRINVS maxillis æqualibus cirrhis quatuor, ossiculo tertio pinnatum dorsi anique uncinatis.

Cyprinus cirrhis quatuor; ossiculo tertio pinnarum dorsi anique uncinatis. Linn. Fn. Suec. 317. Art. gen. 4. Syn. 3. Sp. 25.

Cyprinus. Rondel. pisc. 2. p. 150. Gesn. pisc. 309. 164. Aldr. ichth. 637. Jonst. pisc. t. 29. f. 3. 4. 6. Willugb. ichth. 245. Rai. pisc. 115.

α. Carpio. Linn. Syst. natur. edit. Stockh. 6. ord. 5. §. 129. Spec. 6.

Austr. Karpfe.

β. Rex cyprinorum Gron. Linn. Syst. natur. edit. Stockh. 6. ord. 5. §. 129. Spec. 20.

Austr. Spiegl-Karpfe.

γ. Cyprinus ossiculo secundo subinde pinnarum dorsi anique uncinato, seu ferrato.

Austr. Seepinfl.

Habitat α. passim in fluviis, lacubus, & piscinis. β. in Danubio aliisque fluviis varius. γ. in lacu Nischiteriensi potissimum. α. Pondus viginti aliquot librarum sæpe attingit. β. trium vel quatuor librarum pondus subinde superat, γ. raro duarum librarum pondus. Parit Junio.

OBSERVATIO. β. linea lateralis nigra duos digitos lata utrinque a capite ad caudam extensa squamis carens. γ. Caput respectu corporis parvitatem improporcionatum, ossiculum secundum pinnarum dorsi anique subinde pone uncinatum.

γ. Pinna dorsi 21. vel 22. radiorum, primo minimo, secundo plerumque simplici, tertio potissimum (subinde tamen secundo) crasso pone uncinato, seu ferrato, cæteris bifurcatis.

Pinnae

Pinnae pectorales radiis 14. bifurcatis.

Pinnae ventrales radiis 8. bifurcatis.

Pinna ani radiis 8. primo minimo simplici. Secundo potissimum crasso pone uncinato, cæteris bifurcatis.

Pinna caudæ ossiculis 22. f. 24.

Omnium trium varietatum maxillæ æquales; cirrhi subtiliores quam sequentis duo ad latera maxillæ superioris, duo at angulus oris nimirum utrinque unus.

CYPRINVS maxilla superiore longiore, cirrhis quatuor; ossiculo tertio pinnae dorsi tantum uncinato.

Barbulus. *Arc. gen. 11. Linn. Syst. natur. Pisc. ord. 5. §. 129.*

Num 2.

Austr. Garbe.

Habitat passim in fluviis præsertim in Danubio, Fische, & Leyta. Pondus subinde 13. & ultra, librarum.

Parit Aprili vel Majo secundum anni constitutionem.

OBSERVATIO. Maxilla superior longior protuberantia carnosaf nasiformi, cirrhi quatuor crassi; duo in apice rostri, duo ad angulos oris nimirum utrinque unus.

Pinna dorsi ossiculorum 10. tertio pone uncinato.

Pinnae pectorales ossiculorum 18. & aliquot fibrarum.

Pinnae ventrales ossiculorum 9.

Pinna ani ossiculorum 8. nullo uncinato.

Ova hujus piscis comesta choleram causant.

CYPRINVS pinna ani radiis viginti septem, pinnis fuscis. *Linn. Fn. Suec. 318.*

Cyprinus pinnis omnibus nigrescentibus; pinna ani ossiculorum viginti septem. *Art. gen. 6. Syn. 4. Spec. 22.*

Cyprinus latus f. Brama. *Rondel. pisc. 2. p. 154. Raj. pisc. 116. Gesn. pisc. 316. 317. 565.*

Cyprinus latus. *Aldr. ichth. 641. Jonst. pisc. 165. t. 19. f. 5.*

Austr. Gareisfl.

Habitat passim in lacubus, piscinis, fluviis, & paludibus pondus unius vel unius & semis libræ raro superat.

Parit Aprili vel Majo secundum anni constitutionem.

CYPRINVS pinna ani ossiculis sedecim; maxilla inferiore longiore incurva; pinnis pectoralibus ventrales non attingentibus.

Cyprinus pinna ani ossiculorum quindecim, maxilla inferiore incurva. *Linn. Fn. Suec. 319.*

Cyprinus maxilla inferiore longiore cum apice elevato, pinna ani ossiculorum quindecim. *Art. gen. 6. Syn. 14. Spec. 14.*

Asp. Suec. *Linn. Syst. natur. Pisc. ord. 5. §. 129. n. 21. ubi pinnam ani officulorum 16. etiam celeberrimus Linnæus dicit.*

Austr. *Schied.*

Habitat in fluviis præsertim in Danubio, & Leytha. Pondus 7. 8. & 9. librarum sæpe attingit.

Parit plerumque Martio.

OBSERVATIO. inveni Pinnam dorsi radiorum 11. ut clarissimus Linnæus *Syst. natur. pisc. ord. 5. §. 129. n. 21.*

Pinnas pectorales ego officulorum 14. & aliquot fribas cartilagineas imbricatas ille 18.

Pinnas ventrales 9. ille 10.

Pinnam ani 16. primo minimo secundo adnexo ille totidem, in aliis numeravi 15.

5. CYPRINUS pinna ani officulis triginta; maxilla inferiore longiore incurva; pinnis pectoralibus longissimis ventralium basin apice tangentibus.

Austr. *Sichling.*

Habitat in Danubio.

DESCRIPTIO. Maxilla inferior superior longior, incurva apice protuberante; maxilla superior brevior emarginata. Oculi maximi, oculos omnium hujus generis specierum magnitudine superantes.

Pinna dorsi radiorum 10.

Pinnæ pectorales longissimæ ventralium basin apice tangentibus officulorum 15.

Pinnæ ventrales radiorum 9.

Pinna ani officulorum 30.

Pinna Caudæ forcipata officulorum 24.

6. CYPRINUS pinna ani officulis undecim, cauda integra.

Linn. Fn. Suec. 321.

Cyprinus mucosus totus nigrescens extremitate caudæ aequali. *Art. gen. 4. Syn. 5. Sp. 27.*

Tinca. Rondel. pisc. 2. p. 157. Gesn. pisc. 984. Aldr. ichth. 646. Willughb. ichth. 251. Raj. pisc. 117.

Austr. *Schlein*, & dum in paludosis habitat, ac inde flavet *Goldschlein*.

Habitat passim in fluviis, piscinis, lacubus, paludibus lutosis. Pondus 3. vel 4. librarum raro superat.

Parit Aprili vel Majo secundum anni constitutionem.

7. CYPRINUS pinna ani officulorum viginti, linea laterali recta. *Linn. Fn. Suec. 322.*

Cyprinus latus alius. *Aldr. ichth. 644. Jonst. pisc. 165. t. 27. f. 12.*

Charax

Charax. *Gesn. pisc.* 222. 166.

Carassius simpliciter dictus. *Willughb. ichth.* 249. *Raj. pisc.* 116.

Austr. Zoblpleinzi, Braren.

Habitat ubique in piscinis, rivis, & fluviis lutosi. Pondus raro ultra libram semis.

Parit Aprili.

1. CYPRINUS pinna ani officulorum quadraginta. *Linn. Fn. Suec.* 323.

Cyprinus admodum latus, & tenuis pinna ani officulorum quadraginta. *Art. gen.* 3. *syn.* 12. *Sp.* 23.

Ballerus *Rondel. pisc.* 2. p. 154. *Fonst. pisc.* 165. t. 27. f. 7. *Raj. pisc.* 117. *Aldr. ichth.* 645.

Piscis Blicka Germanorum, qui Alburnus lacustris dici potest. *Gesn. pisc.* 24.

Austr. Scheib & Pleinzen.

Habitat in Danubio, Leytha, aliisque fluviis. Pondus 3. 4. 6. & subinde 7. librarum.

Parit Aprili.

2. CYPRINUS pinnæ ani radiis quatuordecim, pinnis omnibus rubris. *Linn. Fn. Suec.* 324.

Cyprinus iride, pinnis omnibus, caudaque rubris. *Art. gen.* 3. *syn.* 4. *spec.* 9.

Rotaug id est Erythrophthalmos Germanis dictus, Bramis adfinis. *Willughb. ichth.* 249.

Rotaug. *Raj. pisc.* 116.

Austr. Rothauge.

Habitat passim in fluviis, & paludibus. Pondus libræ semis sæpius, raro libræ unius.

Parit Aprili.

OBSERVATIO. Pinnam dorsi hujus piscis Clarissimus Linnæus *Syst. natur. edit. Stockh.* 6. *pisc. ord.* 5. §. 129. num. 18. observavit radiorum 11. ego in uno 9.

in alio 10.

in alio 13.

in alio 14.

in tribus aliis 12.

Pinnam ani clarissimus Linnæus ibidem radiorum 14. ego in uno officula 12. in tribus aliis 13. numeravi.

Nec minus pinnarum & iridis colore variat, plerumque quidem iris pinnæque rubent, sæpius tamen pinnæ albæ sunt, & iris flavet.

10. CYPRINUS pinna ani radiis undecim, pinnis albertibus.
Corpore oblongo teretiufculo; tuberculo in maxilla superiore mobili.

An Cyprinus pinnæ ani radiis undecim, pinnis albertibus. *Linn. Fn. Suec. 325.*

an Cyprinus oblongus, iride argentea, pinnis albertibus. *Art. gen. 5.?*

Austr. Hasl.

Habitat in fluvio Leythæ præsertim. Pondus libræ semis ad summum attingens.

Parit Majo.

OBSERVATIO. Pinna dorsi ossiculorum in pluribus 10. in aliis tamen 9. primo & secundo simplici cæteris ramosis alba.

Pinnæ pectorales 18. ad testaceum vergentes.

Pinnæ ventrales albæ in aliquibus ad testaceum, in aliis ad rubescentem colorem vergentes ossiculis 12.

Pinnæ ani in pluribus ossiculorum 11. in aliis 10. alba ad rubrum vergens.

Pinna caudæ alba ossiculorum 19.

Iris argentea in aliis flavescens, Corpus Rutili, Caput Erythrophthalmi vel characis Gesneri. Squamæ piscis Id.

11. CYPRINUS pinna ani ossiculis tredecim rubra *Linn. Fn. Suec. 320.*

Cyprinus iride sublutea, pinnis ventralibus anique rubris.
Art. gen. 5. syn. 14. spec. 6.

Id Suecis. *Linn. Syst. natur. edit. 6. Stockh. pisc. ord. 5. §. 129. n. 17,*

Austr. Merling, Erssing, Bradfisch.

Habitat in Danubio, Fischæ, Leythæ. Pondus 4. ad 5. libras 8.

Parit Aprili.

12. CYPRINUS rostro nasiformi maxillis imberbibus abdomine interne nigro.

An Cyprinus pinnæ ani radiis viginti quatuor nasiformi. *Linn. Fn. Suec. 326. ?*

Wimba. *Linn. Syst. natur. edit. Stockh. 6. pisc. ord. 5. §. 129. n. 25?*

Austr. Räßling, Weißfisch.

Habitat in Danubio, Fischæ, Leythæ, alibique in fluviis vulgatissimus. Pondus ad summum duarum librarum attingit.

Parit Aprili vel Majo, secundum anni constitutionem.

OBSERVATIO. Rostrum nasiforme, & abdomen intus nigrum a congeneribus satis distinguunt, præterea a Cyprino secundo differt maxillis imberbibus.

Pinna dorsi ossiculorum 12. membranacea pellucida alba apice nigro.

Pinnae pectorales ossiculorum 16. rubentes.

Pinna ani ossiculorum in alio 13. in alio 18. rubra.

Pinnae ventrales ossiculorum 11. rubrae.

Cauda bifurcata inferius rubra.

3. CYPRINUS pinnae ani radiis duodecim rubicundis. *Linn. Fn. Suec. 329.*

Cyprinus iride pinnisque ventris, ac ani plerumque rubentibus. *Art. gen. 3. syn. 10. spec. 10.*

Rutilus seu Rubellus fluviatilis. *Gesn. pisc. 320. Willughb. ichth. 262. Raj. pisc. 122.*

Rutilus Gesneri. *Aldr. ichth. 621.*

Rutilus fluvialis *Gesn. Jonst. pisc. 130. t. 26.*

Austr. Mtl.

Habitat ubique in fluviis. Pondus subinde quinque librarum. Parit Aprili.

4. CYPRINUS pinnae ani radiis viginti. *Linn. Fn. Suec. 330.*
Cyprinus quincuncialis pinna ani ossiculorum viginti. *Art. gen. 6. syn. 10. sp. 17.*

Alburnus Rondel. *pisc. 2. p. 208.*

Alburnus Ausonii. *Gesn. pisc. 23. Aldr. ichth. 6. 28. Willughb. ichth. 263. Raj. pisc. 123. Jonst. pisc. 146. t. 29. f. 13.*

Austr. Spißlauben, Schneidersfischl.

Habitat ubique in fluviis, paludibus, & piscinis.

Parit Majo.

NATUR hujus varietas linea laterali caerulea utrinque a capite ad caudam extensa digitum indicem longitudine sui corporis nunquam excedens. Ab Austriae Reislaupe nuncupata hæc ubique cum priore habitat.

5. CYPRINUS pinnae ani radiis novem, iridibus rubris. *Linn. Fn. Suec. 331.*

Cyprinus biuncialis, iridibus rubris, & pinna ani ossiculorum novem. *Art. gen. 4. syn. 13. sp. 30.*

Cobitis fluviatilis. *Mars Danub. 4. p. 24. t. 9. f. 1.*

Austr. Gressling.

Habitat ubique in fluviis & rivulis. Longitudine sui corporis digitum nunquam vel raro excedit.

OBSERVATIO. Iris in nostratibus nunquam rubra, cæterum descriptio Linnæana illi convenit. Marfilii piscis noster est.

Pinnam dorsalem inveni in aliquibus radiis 8 dichotomis, in aliis 10; in aliis tribus 9.

Pinnam ani in aliis radiis 9. in aliis 7.

C O B I T I S.

1. COBITIS tota glabra maculosa corpore subtereti. Linn. Fn. Suec. 332.

Cobitis barbatula. Rondelet. pisc. 2. p. 204. Aldr. ichth. 618. Jonst. pisc. t. 26. f. 22.

Cobitis fluviatilis barbatula. Gesn. pisc. 404. Willugb. ichth. 255. Raj. pisc. 124.

Austr. Grunzel.

Habitat ubique in rivulis purioribus. Longitudo digiti.

2. COBITIS aculeo bifurco infra utrumque oculum. Linn. Fn. Suec. 333. Art. g. 2. 2. Syn. 5. Sp. 4.

Cobitis aculeata, S. altera. Rondelet. pisc. 2. p. 204.

Cobitis aculeata. Gesn. pisc. 404. 482. Jonst. pisc. t. 26. f. 21.

Cobitis Barbatula aculeata. Willugb. ichth. 205. Raj. pisc. 124.

Cobitis aculeata Rondeletii. Aldr. ichth. 617.

Tœnia cornuta. Jonst. pisc. 46. f. 1. Willugb. ichth. 266.

Austr. Steinbeisl.

Habitat ubique in rivulis, præsertim in rivulo Steinbachl & in cavernis subterraneis ad originem ejus sitis. Longitudo digiti.

V M B R A.

1. UMRA.

Austr. Hundsfisch, Türkischer Gröfßling.

Habitat in paludibus, & præsertim in cavernis subterraneis circa Leytæpontum.

DESCRIPTIO. Facies tincæ; magnitudo digiti, color niger. Corpus squamis tectum. Maxilla inferior longior: dentes subulati in maxillis palato; membrana branchiostega officulis 6. Pinna dorsi officulis 16. Pinnae pectorales officulis 12. Pinnae ventrales officulis 7. Pinna ani officulis septem. Pinna caudæ integra officulis 14.

Pisciculus hic ad Malacopterygios pertinet: pinnae enim omnes radiis ossibus omnibus inermibus suffulciuntur.

- a CYPRINO, differt quia hujus membrana branchioſtega offi-
culis tribus, noſtræ 6. conſtat: dentesque Cypri-
nus tantum ad ventriculi oriſcium, umbra in ma-
xillis, palato habet.
- a GADO pinna dorſi unica.
- a CORYPHÆNA quia hujus membrana branchioſtega offi-
culorum quinque, umbræ offi-
culorum 6. nec pinna dor-
ſi a capite ad caudam extenſa, ſed in medio quaſi
dorſo ſita eſt, nec quartam ejus partem occupat.
- a PLEVRONECTE cujus membrana branchioſtega offi-
culis 7. noſtræ 6. conſtat, nec oculi umbræ in eodem
latere ſunt.
- a CLYPEA membrana enim branchioſtega in hac offi-
culorum 8. in noſtra offi-
cularum 6. nec abdomen acutum
ferratum, ſed integerrimum cypriniforme.
- a SALMONE cujus membrana branchioſtega offi-
culorum X. vel Xij eſt; pinna vero adipoſa, quæ in umbra
offi-
culis ſuffulta reperitur, nec corpus maculoſum,
ſed nigrum; nec dentes in lingua ſed in maxillis
& palato tantum ſunt.
- ab OSMERO, cujus membrana branchioſtega offi-
culorum 7. vel 8, umbra 6 eſt. Nec pinna ut in Oſmero
adipofa, nec dentes in lingua.
- a COREGONO hujus membrana branchioſtega offi-
culorum 8. vel 10. Umbra 6. nec pinna ut in Coregono
adipofa, nec dentes minimi vix prominentes, ſed
ſubulati ac eminentes.
- ab ESOCe in hoc enim membrana branchioſtega offi-
culorum 14. S. 12. in umbra 6. pinna hujus in extre-
mo dorſo, noſtræ in medio quaſi dorſo, nec den-
tium ſeries in palato & maxilla ſuperiore, ut in il-
lo duas lineas ſed duos ſemicirculos ac in gado
conſtituunt.
- 10. ECHENEIS dici poteſt, in hac enim membrana branchio-
ſtega offi-
culorum circiter 9. in umbra 6. nec caput
noſtræ planum ſtriis tranſverſis aſperis, ſed cypri-
niforme.
- 11. ab EXOCÆTO, cujus membrana branchioſtega offi-
culorum 10. huius 6. nec pinnae pectorales longitudine
corporis, ſed breves ac in cyprinis vel ſalmonibus.
- 12. ab ARGENTINA cujus membrana branchioſtega offi-
culorum 10. umbra 6. nec anus caudæ vicinus, nec
dentes in lingua.

13. a **COBITE** cujus membrana branchiostega ossiculorum 5. hujus 6. nec primum ossiculum latius, sed reliquis simile; nec cirri ad os conspicui.
14. a **STROMATEO** præter reliqua quia in hoc pinnae ventrales absunt, dorsales vero longitudine dorfi, in umbra dorsalis nec quartam dorfi partem occupat, nec ventralibus caret.
15. a **GYMNOTO** cui pinnae ventrales dorsalesque desunt, quibus umbra ornatur.
16. ab **ANARHICA** nam in hoc pinnae ventrales absunt, in umbra adsunt nec nostræ cauda quadrata.
17. nec **AMMODYTES** nominari potest, quia in hoc membrana branchiostega ossiculorum 10. nostræ 6. iste pinnis ventralibus caret, umbra gaudet.
18. nec **MURÆNA**, cujus membrana branchiostega ossiculorum 10. nostræ 6. nec foramina narium tubulosa in apice rostri umbra habet.
19. nec **ANABLEPS** vocari potest, nam hujus pinna unica in extremo dorso, in umbra pectorales, ventrales, dorfi, ani, caudæ conspiciuntur.
20. nec **SYNGNATUS** nam in hoc branchiorum lamina unica, in umbra membrana branchiostega ossiculorum 6. nec maxillæ ejus a lateribus clausæ.
- Novum** igitur genus; quod cum cavernas subterraneas luce carentes potissimum inhabitet *Umbram* vocavi; cujus character genericus erit: *Membrana branchiostega ossiculorum sex. Dentes in maxillis palato. Oculus in utroque latere unus, pinnae ventrales duæ, dorfi unica ossiculis suffulta in medio fere dorfi sita nec a capite ad caudam extensa.*



Hæc pauca sunt Naturalia, quæ hætenus in Austria inferiore observare, & describere licuit. Plures enim species tacere teneor necessaria librorum suppellectile destitutus; inter volatilia autem plures Scolopacum, Anserum, & passerum species omittere debui, cum a distantibus venatoribus, tardius missas antequam depinxissem vel fuerint putrefactæ, vel illarum exuvias (indita quamquam nicotiana, fantonico, & aloë) attamen decoraverint dermestes; utpote quos, ut nunc edoctus sum, arsenicum solum alumine usto mixtum arcet. Nec Amphibia, insecta, & mineralia Austriaca tradere hucusque ausus sum a locupletissima Bibliotheca S. C. M. SUE, in qua ex singulari IMPERATRICIS versus studia amore omnibus litteratis contentis libris frui conceditur exulans, & panem quotidianum praxi clinica, ac longinquis itineribus inter rusticos conquirere coactus: præsertim dum me in hoc studio longe maiorem eadem colligere scivi. Plura tamen Naturalia in Austria degenda, ne dicam in vastissimis regnis Celsissimæ & augustissimæ IMPERATRICI nostræ studiorum RETAVRATRICI subjectis invenienda essent, si solum tudere, historiæque naturali operam navare liceret. Nulla etenim nos urget necessitas exterarum provincias ut petamus, sola Austriæ vicina Hungaria illique adjacens cum montibus Carpathicis, Transylvania, Bohemiam, Moraviamque taceo, historiæ naturalis studiosis largissimum adhuc campum suppeditant. Ex hoc & contrariis astris derelicto, si majora sperare nefas est, quædam saltem eruere, ac ab oblivione vindicare impoterum concedetur. Interim viros ex scientia magnos humillime obsecro, meo (cui & doctrina, & bibliotheca, & reditus hætenus defunt) ingenio profunda illorum perspicacia metiendo, ac ex primo hocce labore arguendo benigne procedere non dedignentur, senten-

tentiamque sequentem a Clarissimo Linnæo Faunæ Sue-
cicæ ex Quintiliano præpositam mente pervolvant:
Quæ præsentī opusculo defunt suppleat ætas ; non
enim differendum est tyrocinium in senectutem. Nam
quotidie crescit metus , majusque fit semper quod au-
furi sumus ; Et dum deliberamus, quando incipiendum,
incipere jam serum fit, quare fructum studiorum vi-
ridem & adhuc dulcem promi decet, dum & ve-
nia, & spes est, & paratus favor, &
audere non dedecet.



INDEX PLANTARVM.

A.			Alchimilla minima. Hall.
			Rupp. 34
A Bies	-	277	ALISMA. Linn. - 105
Abrotanum	242.	243	Alkekengi. Officin. - 54
Abfinthium	-	244	Alliaria. - 195
Abutilon. Dodon.	-	205	ALLIVM. Linn. 90. 91
Acacia. Raj.	-	212	Alni effigie. Baub. 141. 142
ACANTHVS. Linn.	-	186	Alnus. - - 272
Accipitrina. Riv. Rupp.	-	194	ALOE. Linn. - 99. 100
ACER. Linn. -	287.	288	ALOPECVRVS. Linn. 17
Acetosa C. Baub.	103.	104	ALSINE. Linn. - 85.
Acetofella officin.	-	127	Alsine. 35. 36. 124. 125. 126
ACHILLEA. Linn.	-	257	- 130
Acinos. Riv. Rupp.	-	178	Alsinella. Dill. - 35
ACONITVM. Linn.	-	153	ALTHÆA. Linn. - 205
Aconitum.	-	163	Althæa. - - 205
Acopa. Moris.	-	43	Alysson. Tournef. Rupp. 187
ACORVS. Linn.	-	101	- 191
Acorus adulterinus. Baub.	13		ALYSSVM. Linn. - 190
Officin.	13		Amanita. Dill. - 303
ACTÆA. Linn.	-	148	AMARANTHVS. Linn. 273. 274
Adhatoda. Tournef.	-	6	Amaranthus cristatus. Cam. 59
ADONIS. Linn.	-	158	AMARYLLIS. Linn. 89
Egilops. Dill.	-	23	AMNI. Linn. - 71
- C. Baub.	-	23	AMYGDALVS. Linn. 139
EGOPODIVM. Linn.	-	81	Anacampseros. Tournef. 127
ESCVLVVS. Linn.	-	106	ANAGALLIS. Linn. 44
ETHVSA. Linn.	-	77	Anagallis. Clus. Cam. Baub. 44
AGARICVS. Linn.	303.	304	Ananas. Tournef. - 88
AGAVE. Linn.	-	100	ANASTATICA. - 187
Agnus castus. Officin.	-	186	Anblatum. Touruef. 183
Agrifolium. Lob.	-	34	ANCHVSA. Linn. - 38
AGRIMONIA. Linn.	-	132	Anchusa. Tabern. - 38
AGROSTEMMA. Linn.	-	128	ANDROSACE. Linn. 41
ACROSTIS. Linn.	-	18	ANEMONE. Linn. - 154
AIRA. Linn.	18.	19	Anemonoides. Dill. Boër-
AJUGA. Linn.	-	164	haav. 155
Alaternus. Clus.	-	57	ANETHVM. Linn. 79. 80
ALCEA. Linn.	-	205	ANGELICA. Linn. 75
Alcea	205. 206. 207		Angelica. Tournef. - 73
ALCHEMILLA. Linn. Baub.	33		Anguria. - 279
			Cc Ani-

INDEX PLANTARVM.

Anisum. Riv. Rupp. Officin.	81	Astragalus.	214. 220
Anonymos. Clus.	- 59	ASTRANTIA. Linn.	69
ANTHEMIS. Linn.	256	ATHAMANTA. Linn.	72. 73
ANTHERICVM. Linn.	95	ATRIPLEX. Linn.	287
ANTHOXANTHVM. Linn.	9	Atriplex baccifera. Raj.	2
ANTIARRHINVM. Linn.	184	Atriplex. Baub.	62. 63. 64
	185	ATROPA. Linn.	53
ANTHYLLIS. Linn.	210. 211	Aucuparia. Riv. Rupp.	141
Aparine. C. Baub. Dodon.	31	AVENA. Linn. & Officin.	23
APHANES. Linn.	34	Auricula urfi. Clus.	42
APIVM. Linn.	81	AZALEA. Linn.	45
APOCYNVM. Linn.	60	Azedarach. Dodon.	115
Aquifolium. Lob.	34		
AQVILEGIA. Linn.	153	B.	
ARABIS. Linn.	197		
ARBVTVS. Linn.	116	Baccharis. - -	247
ARCTIVM. Linn.	235	Balaustia. C. Baub.	138
ARENARIA. Linn.	125. 126	BALLOTA. Linn.	174
Arenaria. Rupp.	27	Balsamina.	263
ARGEMONE. Linn.	150	Barba Capræ.	143. 144
Argentina. Dodon.	146	Barba Jovis.	211
ARISTOLOGIA. Linn.	267	Barbarea.	195
Armoracia. Riv. Rupp.	190	Bardana.	235
ARNICA. - -	253	Beccabunga. Officinarum.	5
ARTEMISIA. Linn.	243. 244	Been album. Officin.	122
Artemisia. -	243. 244	Belladonna. Tournef. Rupp.	53
ARVM. Linn.	- 268	BELLIS. Linn.	254
Aruncus. Linn.	- 143	Bellis cærulea. C. Baub.	27. 28
ARVNDOS. Linn. Scheuchz.		BERBERIS. Linn.	102
Baub.	24	BETA. Linn.	65
ASARVM. Linn.	131	BETONICA. Linn.	168
ASCLEPIAS. Linn.	60	BETVLA. Linn.	271
ASPARAGVS. Linn.	96	BIDENS. Linn.	241
ASPERVGO. Linn. Tournef.	40	BISCVTELLA. Linn.	191
ASPERVLA. Linn. Dodon.		Bistorta. C. Baub.	111
C. Baub.	29	Blattaria. Rupp. Dodon.	52
Asperula. Rupp.	29. 30	BLITVM. Linn.	2
ASPLENIVM. Linn.	291	Blitum.	64. 274
ASTER. Linn.	250	BOLETVS. Linn.	304
Aster 250. 251. 252. 253.		Boletus. Tournef. Mich.	305
	258	BORRAGO. Linn. Baub.	
ASTRAGALVS. Linn.	220. 221	Officin.	40
		Bo-	

INDEX PLANTARVM.

Botrys. <i>Dodon.</i>	63	CARDAMINE. <i>Linn.</i>	192. 193
BRASSICA. <i>Linn.</i>	198. 199	Cardiaca. <i>Fuchs. Rupp.</i>	175
Briza. <i>Linn.</i>	20	CARDVVS. <i>Linn.</i>	236. 237
BROMELIA. <i>Linn.</i>	88	CAREX. <i>Linn.</i>	270. 271
BROMVS. <i>Linn.</i>	22	CARLINA. <i>Linn.</i>	240
Brunella. <i>Baub.</i>	180	CARPINVS. <i>Linn.</i>	276
BRYONIA. <i>Linn.</i>	280	Carvi. <i>Officin.</i>	80
BRYVM. <i>Linn.</i>	294. 295	CARVM. <i>Linn.</i>	80
Bryum.	293	Caryophyllata.	147. 148
Buglossum. <i>Tournef.</i>	37	Caryophyllus.	27. 120. 121.
<i>Baub.</i>	38. 40. 41.		122. 123. 124
Bugula. <i>Riv. Rupp.</i>	164	Cassida. <i>Tournef. Rupp.</i>	180
Bulbonac. <i>Rupp.</i>	192	Castanea.	276
BUPHTHALMVM. <i>Linn.</i>	258	Cataputia.	134
BUPLEVRVM. <i>Linn.</i>	69. 70	Cataria. <i>Tournef. Dodon.</i>	167
Bursa pastoris.	189	CAVCALIS. <i>Linn.</i>	70. 71
BVTOMVS. <i>Linn.</i>	114	Caucalis. <i>Linn. C. Baub.</i>	70
Buxus. <i>Linn.</i>	271	CELOSIA. <i>Linn.</i>	59
BYSSVS. <i>Linn.</i>	302	CENTAVREA. <i>Linn.</i>	259. 260
		Centaurium minus. <i>Baub.</i>	
		<i>Dodon.</i>	67
C.		Cepa. <i>C. Baub.</i>	92
CACALIA. <i>Linn.</i>	241	CERASTIVM. <i>Linn.</i>	129
CACTVS. <i>Linn.</i>	137. 138	Cerasus.	139. 140
Calamus aromaticus. <i>Offic.</i>	101	CERATOPHYLLVM. <i>Linn.</i>	274
Calceolus. <i>Riv. Rupp.</i>	266	Cereus.	137
Calamintha. <i>Officin.</i>	178	Cerefolium. <i>Riv. Rupp.</i>	77. 78
CALENDVLA. <i>Linn.</i>	261	CERINTHE. <i>Linn. C. Baub.</i>	39
CALTHA. <i>Linn.</i>	163	Cervaria. <i>Riv. Rupp.</i>	72
CANNA. <i>Linn.</i>	1	Cervicaria. <i>Dodon.</i>	47
CANNABIS. <i>Linn.</i>	282	Cervi spina. <i>Riv. Rupp.</i>	56
Cannabis spuria. <i>Riv. Rupp.</i>		Ceterach. <i>Officin.</i>	291
	172. 173	Chærefolium. <i>Dodon.</i>	77
Cann - Acorus. <i>Tournef.</i>	1	CHÆROPHYLLVM. <i>Linn.</i>	78
Canna Indica. <i>Riv. Clus.</i>	1	Chærophylum. <i>Tournef.</i>	77. 78
CAMPANVLA. <i>Linn. C. Baub.</i>		Chamæcistus. <i>Clus. Baub.</i>	45
	45. 47. 48.	Chamædrys.	166
CAPSICVM. <i>Linn.</i>	56	Chamæmelum.	256. 257
Cantabrica. <i>Clus.</i>	45	Chamænerion. <i>Rupp.</i>	107
Caprifolium. <i>Dodon.</i>	50	Chamæpitys. <i>Dod.</i>	165
Cardamindum. <i>Tournef.</i>		<i>Clus.</i>	179
<i>Rupp.</i>	106	Chamærhododendros. <i>T.</i>	45
		Cc 2	CHA-

INDEX PLANTARVM.

CHARA. Linn.	301	Coma aurea. Boerhaav.	242
Charantia. Dodon.	278	COMARVM. Linn.	148
CARTHAMVS. Linn.	240	CONFERVA. Linn.	301
CHEIRANTHVS. Linn. 195. 196		CONIVM. Linn.	72
CHELIDONIVM. Linn.	149	Consolida media. Baub.	164
CHENOPODIUM. Linn. 62. 63.		Consolida regalis. Cam.	152
64. 65		CONYZA. Linn.	247
Chenopodio - Morus.		Conyza.	252
Boerhaav.	2	CONVOLVVLVS. Linn. 45. 46	
CHONDRILLA. Linn.	230	CONVALLARIA. Linn. 96. 97	
Chondrilla. Rupp. Tournef.	231	Corallo - fungus. Vaill.	306
Christophoriana. Tournef.		Coralloides. Dill. 297.	300
Clus.	149	Tournef.	306
CHRYSANTHEMVM. Linn.	255	CORIANDRV. 77	
CHRYSOCOMA. Linn.	242	CORNVS. Linn.	32
Chrysocome. Dill.	242	Cornus. C. Baub.	32
CHRYSOSPLENIVM. Linn.	117	Corona imperialis. Dodon.	93
CICER. Linn.	217	CORONILLA. Linn.	219
CICHORIVM. Linn.	234	Coronopus. C. Baub.	32
CICVTA. Linn.	76	CORTVSA. Linn. Clus.	43
Cicuta. Dodon.	72	CORYLV. Linn.	276
Cicutaria. Riv. 76. Baub.	78	Cotinus. Dodon.	82
Cinara.	239. 240	Cotonea. Lob.	143
CIRCÆA. Linn.	3	Cotoneaster. Baub.	142
Cirsium 235. 236. 237. 238. 239		COTYLEDON. Linn.	126
CISTVS. Linn.	151	Cracca. Riv. Rupp. 215. 216.	
Citrullus.	279		217
CITRV. Linn.	226	Crassa. Riv. Rupp.	61.
CLAVARIA. Linn.	306	CRATÆGV. Linn. 140. 141	
CLEMATIS. Linn. 156. 157		CREPIS. Linn.	233
CLINOPODIUM. Linn.	176	CROCVS. Linn.	11
CLYPEOLA. Linn.	191	Officinarum	11
Cneorum. Clus.	110	Cruciata.	30. 286
CNICVS. Linn.	238	CVCYBALVS. Linn.	122
COCHLEARIA. Linn. 189. 190		CVCVMIS. Linn.	279
COFFEA. Linn.	49	CVCVRBITA. Linn. 278. 279	
Coggygia. Clus.	82	Cunila. Linn.	169
COIX. Linn.	270	CVPRESSVS. Linn.	277
COLCHICVM. Linn.	105	CVSCVTA. Linn.	34
Colocasia.	268	Cyanus.	259
Colocynthis.	279	CYCLAMEN. Linn. C. Baub.	
LVTEA. Linn.	212	Officin.	43
		Cy-	

INDEX PLANTARVM.

Cynapium. Riv. Rupp.	77	ECHINOPS. Linn.	234
CYNARA. Linn.	239. 240	Echinomelocactus.	137
Cynocrambe. Cam.	283	Echinophora. Riv. Rupp.	70. 71
CYNOGLOSSVM. Linn.	38	Echioides. Riv. Rupp.	37. 40. 41
Cynoglossum. Hall. C. Baub.	37	ECHIVM. Linn. Baub.	41
Cynoforchis.	264. 265	Echium Scorpioides. C. Baub.	36. 37
CYNOSVRVS. Linn.	21	ELÆAGNVS. Linn.	33
Cyperelia. Rupp.	102	Elaterium. Riv. Rupp. Offic.	278
CYPERVS. Linn.	14	Elatine. Riv.	184
Cyperus. Tournef.	15	Eleoselium. Dodon.	81
CYPRIPEDIVM. Linn.	266	Elichrysum.	245. 246
CYTISVS. Linn.	218	ELVELA. Linn.	305
Cytisus.	211	Embolus.	308
D.		Emerus. Tournef.	219
D ACTYLIS. Linn.	20	EMPETRVM. Linn.	281
D APHNE. Linn.	109	Endivia.	234
DATVRA. Linn.	52	EPILOBIVM. Linn.	107
DAVCVS. Linn.	71	Epithymum. Baub.	34
DELPHINIVM. Linn.	152	EQUISETVM. Linn.	289. 290
DENTARIA. Linn.	192	ERICA. Linn.	108. 109
DIANTHVS. Linn. 120. 121. 122		ERIGERON. Linn.	247
Diapensia. Cam.	69	Erigerum. Dodon.	248
DICTAMNVS. Linn.	115	ERIOPHORVM. Linn.	15
DIGITALIS. Linn.	185	Eruca.	194. 195. 199
Digitalis. Tournef.	7	ERVVM. Linn.	217
DIPSACVS. Linn. C. Baub.		ERYNGIVM. Linn.	68
Dodon.	28	ERYSIMVM. Linn.	195
DORONICVM. Linn.	254	Erysimum.	194. 195
Doronicum.	251. 253. 254.	Esula.	133. 134. 135
Dorycnium.	224	EVONYMVS. Linn.	57
DRABA. Linn.	187	EVPATORIUM. Linn.	242
Draba. Clus. 188. Dodon.	190.	Eupatorium.	132
Dill. 191. C. Baub.	197	EUPHORBIA. Linn.	133. 134.
DRACOCEPHALVM. Linn.	179		135
Dracontium.	268	EUPHRASIA. Linn.	181
DRYAS. Linn.	148		
Drymopogon. Riv. Rupp.	143	F.	
Dulcamara. Dodon.	54		
E.			
E bulus. Fuchs.	83	F aba	217
Ecboium. Riv.	6	Fabaria. Officin.	126
		Fagopyrum. Tournef.	112. 113

INDEX PLANTARVM.

[illegible]

INDEX PLANTARVM.

HOLCVS. *Linn.* 286
 HOLOSTEVM. *Linn. Tab.* 26
 Holosteum. *Tabern.* 129
 HORDEV. *Linn.* 25
 Horminum. *Baub. 8. Clus. 8. Riv. 9.*
 HUMVLVS. *Linn.* 282
 HYACINTHVS. *Linn.* 97. 98
 HYOSCYAMVS. *Linn.* 53
 HYPERICVM. *Linn.* 226. 227
 HYPNV. *Linn.* 295. 196
 HYPOCHÆRIS. *Linn.* 233
 HYSSOPVS. *Linn.* 167

I.

Jacea. 259. 260
 Jacobæa. 249. 251. 261
 Jalappa. *Tournef.* 51
 JASMINVM. *Linn.* 2
 IBERIS. *Linn.* 190
 ILEX. *Linn.* 34
 IMPATIENS. *Linn.* 263
 IMPERATORIA. *Linn.* 79
 Imperatoria. *Tournef.* 75. 76
 INVLA. *Linn.* 251. 252. 253
 IPOMOENA. *Linn.* 46
 IRIS. *Linn.* 12. 13
 ISATIS. *Linn.* 200
 ISOPYRV. *Linn.* 162
 JVGANS. *Linn.* 275
 Jujuba. *C. Baub.* 57
 Juncago. *Tournef.* 105
 JUNCVS. *Linn.* 101
 Juncus. *Baub.* 14. 15
 JUNIPERVS. *Linn.* 284
 JUSTITIA. *Linn.* 6

K.

Kali. *C. Baub.* 65
 Knawel. *Riv. Rupp. Raj.* 119

L.

Laburnum. *Riv. Rupp.* 218
 LACTVCA. *Linn.* 229. 230
 Lachryma Jobi. *Clus.* 270
 Ladanum. *Riv. Rupp.* 172
Dill. 172. 173
 Lagopus. 222
 LAMIV. *Linn.* 171
 Lamium. *Riv.* 173
 Lampsana. *Dodon.* 234
 Lapathum. *Baub.* 102. 103
 Lappula. *Riv. Rupp.* 37
 LAPSANA. *Linn.* 234
 Larix. 276
 LASERPITIV. *Linn.* 74
 LATHRÆA. *Linn.* 182
 Lathyrus. 134
 LATHYRV. *Linn.* 214. 215
 LAVANDVLA. *Linn.* 168
 Lavendula. 168
 Laureola. *C. Baub. Offic.* 109
Dodon. 110
 Laurocerasus. *Tourn. Cl.* 139
 LAVRV. *Linn.* 113
 Ledum. *Clus.* 116
 LEMNA. *Linn.* 268. 269
 Lens. 217
 LEONTODON. *Linn.* 231
 Leontopodium. 246
 LEONVRVS. *Linn.* 175
 Leonurus. *Breyn.* 175
 LEPIDIUM. *Linn.* 188
 Leucanthemum, 255. 256
 Leucojum. 196
 Levisticum. *Riv. Rupp. Offic.* 75
 Libanotis. 72. 74
 LICHEN. *Linn.* 297. 298. 299.
 330
 Lichen. *Dill.* 297
 Lichenoides. *Dill.* 297. 298.
 299. 300

INDEX PLANTARVM.

LIGUSTICVM. <i>Linn.</i>	75	MALVA. <i>Linn.</i>	205. 206
Ligusticum. <i>Tournef.</i>	74	Malus. <i>C. Baub.</i>	143
LIGVSTRVM. <i>Linn.</i>	3	MARCHANTIA. <i>Linn.</i>	296
Lilac. <i>Tournef.</i>	3	Mariscus. <i>Hall.</i>	14
Lilio - asphodelus. <i>Clus.</i>	100	Marrubiastrum. <i>Tournef.</i>	169
Lilio - Narcissus. <i>Dill.</i>	90	171. <i>Riv. Rupp.</i>	174
LILIVM. <i>Linn.</i>	93	MARKVBIVM. <i>Linn.</i>	174
Lilium convallium. <i>Baub.</i>	96	Martagon. <i>Rupp.</i>	93
Limonium. <i>Mor. 85. J. Baub. 86</i>	86	Marum. <i>Rupp. 165. Riv.</i>	166
Linagrostis. <i>Tournef.</i>	16	Mastichina. <i>Boerhaav.</i>	166
Linaria.	184	MATRICARIA. <i>Linn.</i>	256
Lingua cervina. <i>Officin.</i>	291	Matrisylva. <i>Officinarum vid.</i>	
Linofyris. <i>Riv. Rupp.</i>	59	ASPERVLA. <i>Linn. I</i>	
LINVM. <i>Linn.</i>	86. 87	MEDICAGO. <i>Linn.</i>	224. 225
LITHOSPERMVM. <i>Linn. 37. 38</i>	38	MELAMPYRVM. <i>Linn.</i>	182
Locusta. <i>Baub.</i>	11	Melanthium.	153. 154
LOLIVM. <i>Linn.</i>	24	MELIA. <i>Linn.</i>	115
Lolium. <i>Moris.</i>	25	MELIANTHVS. <i>Linn.</i>	186
LONICERA. <i>Linn.</i>	50	MELICA. <i>Linn.</i>	19
LOTVS. <i>Linn.</i>	223. 224	Melica.	286
Lotus.	221	Melilotus. <i>Officin.</i>	221
LVNARIA. <i>Linn.</i>	191. 192	MELISSA. <i>Linn.</i>	178
LVPINVS. <i>Linn.</i>	211	Melissophyllum. <i>Riv. Rupp.</i>	179
Lupulinum. <i>Riv. Rupp.</i>	223	MELITTIS. <i>Linn.</i>	179
Lupulus.	282	Melo.	279
Luteola. <i>Tournef.</i>	132	Melocactus. <i>C. Baub.</i>	137
LYCHNIS. <i>Linn.</i>	128. 129	MENTHA. <i>Linn.</i>	169. 170
Lychnis. 119. 120. 122. 123.	128. 129.	MENYANTHES. <i>Linn. Tournef.</i>	
LYCOPERDON. <i>Linn.</i>	306	<i>Riv. Rupp.</i>	43
Lycopesicon. <i>Rupp. Tournef. 54. 55</i>	55	MERCVRIALIS. <i>Linn.</i>	283
LYCOPODIVM. <i>Linn.</i>	292	MESEMBRIANTHEMVM.	
LYCOPSIS. <i>Linn.</i>	40	<i>Linn.</i>	143
LYCOPVS. <i>Linn. Tournef. 7</i>	7	MESPILVS. <i>Linn.</i>	142
LYSIMACHIA. <i>Linn. C. Baub. 44</i>	44	Mespilus.	141
LYTHRVM. <i>Linn.</i>	131. 132	Meum. <i>Riv. Rupp.</i>	73
M.		MILIVM. <i>Linn.</i>	18
Majorana.	177	Milium. <i>Baub. Officin.</i>	17
Mala infana. <i>Dodon.</i>	55	Millefolium.	257
		MIRABILIS. <i>Linn.</i>	51
		MNIVM. <i>Linn.</i>	293
		Mollugo. <i>C. Baub.</i>	30
		Molucca. <i>Riv. Rupp.</i>	176
		Mo-	

INDEX PLANTARVM.

MOLVCCELLA. Linn.	176
Moly. Rupp.	90
MOMORDICA. Linn.	278
Monophyllum. Raj.	97
Morocarpos. Rupp.	2
MORVS. Linn.	273
MVCOR. Linn.	307
MVSA. Linn.	285
Muscari. Rupp.	98
Muscipula. Rupp.	122. 123
MYAGRVM. Linn.	187
MYOSOTIS. Linn. 36. 37. Rupp.	Dill. 36
Myosotis. Tournef.	129
MYRIOPHILLVM. Linn.	274
Myrrhis. Riv. Rupp. Baub.	78
MYRTVS. Linn.	138

N.

Napellus.	153
Narcisso - leucojum.	
Tournef.	88
NARCISSVS. Linn.	89
Nasturtium.	193. 194
Nemorosa. Rupp.	155. 156
NEPETA. Linn.	167
NERIVM. Linn.	59
NICOTIANA. Linn.	53
NIGELLA. Linn.	153. 154
Nigellastrum. Dodon.	128
Nummularia. Riv. Rupp.	
Officin.	44
Nux metella. Cam.	52
NYMPHÆA. Linn.	150

O

OCIMVM. Linn.	179. 180
Ocymastrum verrucari-	
um. Baub.	4
Ocymum. Baub.	179. 180

Odontites. Dill. Riv. Rupp.	181
OENOTHERA. Linn.	107
OLEA. Linn. Baub. 3.	
Onagra. Tourn. Riv. Rupp.	107
ONONIS. Linn.	210
ONOPORDON. Linn.	239
OPHIOGLOSSVM. Linn.	290
OPHRIS. Linn.	265
Opulus. Tournef. Rupp.	83
Opuntia.	138
ORCHIS. Linn. 253. 264. 265	
Orchis	265. 266.
Oreoselinum. Riv. Rupp.	
Officin.	73
Oreoselinum. Tournef.	72
ORIGANVM. Linn.	176. 177
ORNITHOGALVM. Linn.	94. 95
ORNITHOPVS. Linn.	220
Ornus. Dodon.	141
OROBANCHE. Linn.	186
OROBVS. Linn.	213. 214
Orvala. Dodon.	9
OSMVNDA. Linn.	290
Ossea. Lonic. Riv. Rupp.	32
Osyris. Clus.	242
Osyris. Dodon.	65
OTHONNA. Linn.	261
Otites. Rupp.	123
OXALIS. Linn.	127
Oxalis. J. Baub.	104
Oxyacantha. Dodon.	141

P.

Padus.	139
Paliurus. Dodon.	57
Palmata.	265
PANICVM. Linn. Clus.	17
PAPAVER. Linn.	149
PARIETARIA. Linn.	286
PARIS. Linn.	113
PARNASSIA. Linn.	85
Pal.	

INDEX PLANTARVM.

Passerina. Rupp.	110	Plantago. Linn. C. Baub.	
PASSIFLORA. Linn. 266.	267	Officin.	31
PASTINACA. Linn.	79	Pneumonanthe. Tabern.	66
Pentaphylloides. Tournef.		Poa. Linn.	19
J. Baub. 146.	148	Poa. Linn.	21. 22
Pentaphyllum. 146. 147.	148	Podagraria. Riv. Rupp.	81
Percepier. Dill.	34	POEONIA. Linn.	152
Perfoliata. Riv. Rupp. Offic.	59	POLIANTHES. Linn.	97
Periclymenum. Baub.	50	POLYGALA. Linn.	208
PERIPLOCA. Linn.	60	Polygaloides. Dill.	208
Perfica. C. Baub.	139	Polygonatum. Rupp.	96
Perficaria. Rupp. Baub. III.	112	Baub.	97
Petasites.	248	POLYGONVM. Linn. III.	112
Petum. Riv. Rupp.	53		113
PEUCEDANVM. Linn. 73.	74	Polygonum. C. Baub.	112
PEZIZA. Linn.	305	Polium.	166
PEDICULARIS. Linn.	183	POLYPODIUM. Linn.	292
Phalangium. Tournef. Baub.	95	POLYTRICHVM. Linn.	292
PHALARIS. Linn. Offic.	16	Polytrichum. Officin.	291
PHALLVS. Linn.	305	Populago. Tournef.	163
PHASEOLVS. Linn. 212.	213	POPVLVS. Linn.	282. 283
PHILADELPHVS. Linn.	138	Porrum. Dod. C. Baub. 90.	91.
Phillyrea. Dodon.	3		92. 93
PHLEVM. Linn.	17	PORTVLACCA. Linn.	131
PHLOMIS. Linn.	175	POTAMOGETON. Linn. 34.	35
Phoenix. J. Baub. Dodon.	24	Potamogeton. C. Baub. 34.	35
Phylica. C. Baub.	56	Tournef.	35
Phyllitis.	291	POTENTILLA. Linn. 146.	147
PHYSALIS. Linn.	53	POTERIVM. Linn.	275
PHYTEVMA. Linn.	49	PRENANTHES. Linn.	230
PHYTOLACCA. Linn.	130	Priapeja.	53
Picea.	277	PRIMVLA. Linn.	42. 43
PICRIS. Linn.	228	PRVNELLA. Linn.	180
Pilosella. Officin.	232	PRVNVS. Linn.	139. 140
PIMPINELLA. Linn. 80.	81	Pseudo-Acacia. Riv. Tournef.	
Pimpinella sanguisorba.	275	Boerhaav.	212
Pimpinella sanguisorba.		Pseudo-Marrubium palu-	
C. Baub. & Officin.	32	stre. Riv.	7
PINGVICVLA. Linn.	7	Pseudo-Marum. Riv.	165
PINVS. Linn.	276	Psyllium. C. Baub. & Offic.	32
PISVM. Linn.	213	Ptarmica.	257
PLANTAGO. Linn.	31	PTERIS. Linn.	290

Pu-

INDEX PLANTARVM.

ulegium. <i>Dodon.</i>	170	SACCHARVM. <i>Linn.</i>	16
VL MONARIA. <i>Linn.</i>	38. 39	<i>Officin.</i>	16
ulfatilla. <i>Linn.</i>	154. 155	SAGINA. <i>Linn.</i>	35. 36
VNICA. <i>Linn.</i>	138	Sagitta. <i>Dodon.</i>	274
YROLA. <i>Linn.</i>	116. 117	SAGITTARIA. <i>Linn.</i>	274
YRVS. <i>Linn.</i>	142. 143	SANTOLINA. <i>Linn.</i>	242
		Salicaria. <i>Tournef.</i>	131. 132
		SALIX. <i>Linn.</i>	280. 281
		SALSOLA. <i>Linn.</i>	65
		SALVIA. <i>Linn.</i>	8. 9. <i>Baub.</i> 8.
		<i>Officin.</i>	8
		SAMBVCVS. <i>Linn.</i>	83. 84
		SAMOLVS. <i>Linn.</i>	49
		Sampfucus. <i>C. Baub.</i>	166
		SANGVISORBA. <i>Linn.</i>	32
		SANICVLA. <i>Linn.</i>	69
		Sanicula. <i>C. Baub.</i>	43
		SAPONARIA. <i>Linn.</i>	119
		SATVREJA. <i>Linn.</i>	166. 167
		SATYRIVM. <i>Linn.</i>	265
		SAXIFRAGA. <i>Linn.</i>	117. 118. 119
		SCABIOSA. <i>Linn.</i>	28. <i>Baub.</i> 29
		SCANDIX. <i>Linn.</i>	77
		SCIRPVVS. <i>Linn.</i>	14. 15
		Scirpus. <i>Tournef.</i>	14. 15
		Scirpo - Cyperus. <i>Mich.</i>	15
		SCHEVCHZERIA. <i>Linn.</i>	104
		SCHLERANTHVS. <i>Linn.</i>	119
		Schoenoprasum. <i>Dodon.</i>	93
		SCHOENVS. <i>Linn.</i>	14
		Sclarea. <i>Boerhaav.</i>	9
		Scordium.	165
		Scorpiurus. <i>Hall. Helv.</i>	36
		SCORZONERA. <i>Linn.</i>	227. 228
		SCROPHVLARIA. <i>Linn.</i>	185
		SCVTELLARIA. <i>Linn.</i>	180
		SECALE. <i>Linn.</i>	25
		SEDVM. <i>Linn.</i>	126
		Sedum. <i>C. Baub.</i>	41
		Sedum. <i>Linn.</i>	118. 119. 126. 127. 136
		SELINVM. <i>Linn.</i>	72
		Selinum.	73

SEM-

INDEX PLANTARVM.

<i>SEMPERVIVUM.</i>	<i>Linn.</i>	136	<i>STACHYS.</i>	<i>Linn.</i>	173
<i>SENECIO.</i>	<i>Linn.</i>	248. 249. 250	<i>Stachis.</i>	<i>Riv. Rupp.</i>	171. 174
<i>SERAPIAS.</i>	<i>Linn.</i>	266		<i>Moris.</i>	176
<i>Serpyllum.</i>		177	<i>STAPELIA.</i>	<i>Linn.</i>	61
<i>SERRATULA.</i>	<i>Linn.</i>	235	<i>Staphisagria.</i>	<i>Dodon. Baub.</i>	152
<i>SESELI.</i>	<i>Linn.</i>	79	<i>STAPHYLEA.</i>	<i>Linn.</i>	84
<i>Seseli.</i>	<i>Riv. Rupp.</i>	73	<i>Staphylodendron.</i>	<i>Rupp.</i>	84
<i>Seseli.</i>	<i>Dodon. Officin.</i>	74. B. 75	<i>Staphylinus.</i>	<i>Riv. Rupp.</i>	71
<i>SIDA.</i>	<i>Linn.</i>	205	<i>STATICE.</i>	<i>Linn.</i>	85. 86
<i>SIDERITIS.</i>	<i>Linn.</i>	169	<i>STELLARIA.</i>	<i>Linn.</i>	124
<i>Sideritis.</i>		168. 172	<i>Stellaris.</i>	<i>Dill.</i>	94
<i>Silaum.</i>	<i>J. Baub.</i>	73. Boerb. 75	<i>STELLARIA.</i>	<i>Linn.</i>	110
<i>SILENE.</i>	<i>Linn.</i>	123	<i>STIPA.</i>	<i>Linn.</i>	23
<i>Siler.</i>	<i>Dodon.</i>	73. Clus. 74	<i>Stoebe.</i>	<i>Riv. Rupp.</i>	247
<i>SINAPIS.</i>	<i>Linn.</i>	199	<i>Stœchus citrina.</i>	<i>Officin.</i>	246
<i>Sisarum.</i>	<i>Riv. Rupp.</i>	76	<i>Stramoneum.</i>		52
<i>SISYMBRIUM.</i>	<i>Linn.</i>	193	<i>Strychnodendros.</i>	<i>J. Baub.</i>	54
<i>SIVM.</i>	<i>Linn.</i>	76	<i>Succisa.</i>	<i>C. Baub.</i>	28. 29
<i>Sium.</i>	<i>C. Baub. Dodon.</i>	77	<i>Sumach.</i>	<i>C. Baub.</i>	82
<i>Smilax.</i>		45. 97	<i>Symphytum.</i>	<i>C. Baub.</i>	39
<i>Sol.</i>	<i>Rupp.</i>	258. 259	<i>SYMPHYTUM.</i>	<i>Linn. Baub.</i>	
<i>SOLANVM.</i>	<i>Linn.</i>	54. 55.		<i>Officin.</i>	39
<i>SOLDANELLA.</i>	<i>Linn. C. Baub.</i>		<i>SYRINGA.</i>	<i>Linn. 3. Baub.</i>	3
	<i>Officin.</i>	43			
<i>SOLIDAGO.</i>	<i>Linn.</i>	250. 251	T.		
<i>Solidago.</i>		249. 250. 251			
<i>SONCHVS.</i>	<i>Linn.</i>	228. 229	T AGETES.	<i>Linn.</i>	254
<i>SORBUS.</i>	<i>Linn.</i>	141	<i>Tamariscus.</i>	<i>Rupp.</i>	84
<i>Sorbus.</i>		141	<i>TAMARIX.</i>	<i>Linn.</i>	84
<i>Sorghum</i>		286	<i>TANACETVM.</i>	<i>Linn.</i>	243
<i>SPARGANIVM.</i>	<i>Linn.</i>	269	<i>Taraxacon.</i>	<i>Officin.</i>	231
<i>SPARTIVM.</i>	<i>Linn.</i>	208	<i>TAXVS.</i>	<i>Linn.</i>	284
<i>Spartum Austriacum.</i>	<i>Clus.</i>	23	<i>Tetrahit.</i>	<i>Dill.</i>	172
<i>Speculum veneris.</i>	<i>Raj.</i>	49	<i>TEVCRIVM.</i>	<i>Linn.</i>	165. 166
<i>SPERGULA.</i>	<i>Linn.</i>	130	<i>Teucrium.</i>	<i>Clus.</i>	5
<i>Spergula.</i>		27. 36. 125	<i>THALICTRVM.</i>	<i>Linn.</i>	157
<i>Sphondylium.</i>	<i>Riv. Rupp.</i>	74	<i>THESIUM.</i>	<i>Linn.</i>	59
<i>Spina cervina.</i>	<i>Dill.</i>	56	<i>THLASPI.</i>	<i>Linn.</i>	188. 189
<i>SPINACIA.</i>	<i>Linn.</i>	282	<i>Thlaspi.</i>		190
<i>SPIRÆA.</i>	<i>Linn.</i>	143	<i>THVJA.</i>	<i>Linn.</i>	277
<i>Split.</i>	<i>Riv. Rupp.</i>	207	<i>Thymbra.</i>	<i>Tournef.</i>	166
<i>Squamaria.</i>	<i>Riv. Rupp.</i>	183		<i>Dodon.</i>	167

T.

T AGETES. <i>Linn.</i>	254
T amariscus. <i>Rupp.</i>	84
T AMARIX. <i>Linn.</i>	84
T ANACETVM. <i>Linn.</i>	243
T araxacon. <i>Officin.</i>	231
T AXVS. <i>Linn.</i>	284
T etrahit. <i>Dill.</i>	172
T EVCRIVM. <i>Linn.</i> 165.	166
T eucrium. <i>Clus.</i>	5
T HALICTRVM. <i>Linn.</i>	157
T HESIVM. <i>Linn.</i>	59
T HLASPI. <i>Linn.</i> 188.	189
T hlaspi.	190
T HVJA. <i>Linn.</i>	277
T hymbra. <i>Tournef.</i>	166
<i>Dodon.</i>	167
T hy-	

INDEX PLANTARVM.

hymelæa. <i>Tournef.</i> 109. 110	VERBENA. <i>Linn.</i> 7. <i>Baub.</i> 7.
HYMVVS. <i>Linn.</i> 177	<i>Officin.</i> 7
ILIA. <i>Linn.</i> 150	Verbesina. <i>Rupp.</i> 241
ithymalus. 133. 134. 135. 136	VERONICA. <i>Linn.</i> 4. <i>Offic.</i> 4
ORDYLIVM. <i>Linn.</i> 70	VIBURNVM. <i>Linn.</i> 83
ORMENTILLA. <i>Linn.</i> 147	VICIA. <i>Linn.</i> 215. 216. 217
rachelium. <i>Clus.</i> 48	Victorialis longa. <i>Clus.</i> 90
RAGOPOGON. <i>Linn.</i> 227	Victorialis rotunda. <i>Offic.</i> 12
ragoselinum. <i>Tournef.</i> 80. 81	VINCA. <i>Linn.</i> 59
RAPA. <i>Linn.</i> 33	Vincetoxicum. <i>Dodon.</i> 61
REMELLA. <i>Linn.</i> 301	VIOLA. <i>Linn.</i> 261. 262
ribulus aquaticus. <i>Baub.</i> 33	Virga sanguinea. <i>Dod. Dill.</i> 32
richomanes. 291	Viscaria. <i>Riv. Rupp.</i> 128
RIENTALIS. <i>Linn.</i> 105	VISCVM. <i>Linn.</i> 282
RIFOLIUM. <i>Linn.</i> 221. 222	VITEX. <i>Linn.</i> 186
	VITIS. <i>Linn.</i> 58
rifolium fruticans. <i>Dodon.</i> 3	Vitis idæa. <i>Clus.</i> 116
rifolium palustre. <i>C. Baub.</i> 44	Ulmaria. <i>Tournef. Rupp.</i> 144
riglochin. <i>Linn.</i> 105	ULMVVS. <i>Linn.</i> 65
RITICVM. <i>Linn.</i> 26	Unifolium. <i>Rupp. Dill.</i> 97
ROLLIVS. <i>Linn.</i> 162	URTICA. <i>Linn.</i> 271
ROPÆOLVM. <i>Linn.</i> 106	Usnea. <i>Dill.</i> 300
uber. <i>Math.</i> 306	Vulneraria. <i>Boerhaav.</i> 210
VLIPA. <i>Linn.</i> 94	Vulvaria. <i>Dalech.</i> 64
VRRITIS. <i>Linn.</i> 197	VVVLARIA. 94
Vurritis. <i>Tournef.</i> 195. 197	Uvularia. <i>Officin.</i> 285
<i>Rupp.</i> 198	
Vufai. <i>Clus.</i> 93	X.
VSSILAGO. <i>Linn.</i> 248	
YPHA. <i>Linn.</i> 269	XANTHIVM. <i>Linn.</i> 273
	XERANTHEMVVM. <i>Linn.</i> 246
	Xiphion. <i>Tournef.</i> 13
	Xylosteum. <i>Dodon. Riv. Rupp.</i> 50
V.	
Vaccaria. <i>Dodon.</i> 120	Y.
VACCINIYM. <i>Linn.</i> 108	
VALANTIA. <i>Linn.</i> 286	YVCCA. <i>Linn.</i> 98
VALERIANA. <i>Linn.</i> 10	
<i>Riv.</i> 10. <i>Clus.</i> 10. <i>Baub.</i> 10	Z.
<i>Officin.</i> 10	
VERATRVM. <i>Linn.</i> 285	
VERBASCVM. <i>Linn.</i> 51. 52	ZEAA. <i>Linn.</i> 269
Verbascum. <i>C. Baub.</i> 42	ZIZYPHVS. <i>Dodon.</i> 57
	ANI-

A N I M A L I A.

A.

Al	-	-	387	Baumbachl	-	336
Al = Rutte	-	-	388	Baumlaufferl	-	337
ACIPENSER	-	-	383	Baumschwalbl	-	377
Affe	-	-	309	Belgmeise	-	379
ALAVDA	-	-	362	Bergkun	-	357
Alcedo	-	-	375	Bernicla	-	339
Alster	-	-	335	Biber	-	315
Altl	-	-	395	Birkhan	-	356
Amarl	-	-	360	Eisenente	-	341
Ammering	-	-	370	Blaues Geyerl	-	330
AMPELIS	363.	364.	364	Blaufuß	-	325
Amsel	-	-	360	Blaukröpf	-	375
ANAS	338.	339.	340.	Blaumeise	-	379
			342.	Blaurager	-	346
Anguilla	-	-	387	Bock	-	320
Anser	-	-	338	Bonafus	-	322
Aper	-	-	318	Bos	-	322
Aquila	-	-	325	Brachhennl	-	354
Arabische Gans	-	-	339	Brachschnepf	-	350
ARDEA	345.	346.	347.	Brachvogel	-	381
Afch	-	-	390	Bradfish	-	394
Asinus	-	-	318	Bräfler	-	371
Asio	-	-	323	Braren	-	393
Asp.	-	-	392	Braunellerl	-	376
Atricapilla	-	-	377	Braunkopfige Eifente	-	342
Auen = Nachtigall	-	-	376	Brauner Nilon	-	327
Auer = Hahn	-	-	356	Brauner Moosgeyer	-	328
Auer = Sch	-	-	322	Brauner Räger	-	346
Avis nivalis	-	-	372	Brauner Rohrgeyer	-	328
Avosetta	-	-	349	Brauner Waldgeyer	-	326
				Brein vogel	-	362
				Bubalus	-	322
				Bubo	-	324
				Buhu	-	323
				Büffloch	-	322
				Buteo	-	329
				Buteo apivorus	-	331

B.

Bach = Amsel	-	374			
Bach = Stelze	-	374			
Bär	-	310			
Balbusardus	-	325			
Ballerus	-	393			
Barbulus	-	391			
Barbe	-	391			

C.

CAMELUS	-	318
CANIS	-	312

A N I M A L I A.

Tanaribogl	-	368	Dorngreul	363.	377.
Taninichen	-	315	Dornheher	-	363
CAPRA	-	319	Drampelthier	-	318
Capreolus	-	319	Drepanis	-	381
Caprimulgus	-	381			
Carduelis	-	366	E.		
Carpio	-	390	Echinus	-	313
Caryocatactes	-	334	Eichhorn	-	314
CASTOR	-	315	Eichfagl	-	314
CASVARIUS	-	354	Eisente mit weissen Flecken	-	341
Catus	-	310	Eisente mit weisser Platen	-	342
Cenchramus	-	371	EMMERIZA	370.	371.
Certhia	-	337	Emmerling	-	370
CERVVS	-	319	Eqvvs	-	317.
CHARADRIVS	-	354	Erdsessel	-	316
Charax	-	393	ERINACEVS	-	313
Chlorio	-	360	Esel	-	318
Chloris	-	368	ESOX	-	388
Choras	-	309			
Cinclus	-	374	F.		
Clangula	-	341	FALCO	325. 326. 3 7.	328.
Cobitis	-	396		329. 330. 331.	332
Coccothraustes	364.	365	Falk	-	328. 329
COLVMBIA	-	358	Fasan	-	356
COREGONVS	-	389	Feldlerche	-	362
Cornix	-	333.	Feldspaz	-	370
CORVVS	333.	334.	FELIS	-	310. 311
COTTVS	-	384	Felis	-	310
Coturnix	-	357	Fiber	-	315
Cricetus	-	317	Ficedula	-	377
Cristöfl	-	375	Fink	-	367
Creutzmeise	-	379	Fischer	-	345
Creutzvogel	-	365	Fischotter	-	312
Cygnus	-	338	Fledermauß	-	314
CYPRINVS	390.	394	Forelle	-	389
CVCVLVS	-	337	FRINGILLA	365. 366.	367.
Cuniculus	-	315		368. 369.	370
D.			Fringillago	-	378
Dachs	-	313	Froschgeyerl	-	331
Dama	-	319	Fuchs	-	313
Dohle	-	334	FVLICA	-	357. 358
Dambirsich	-	319			

G. GA.

A N I M A L I A.

G.							
GADVS	-	387.	388	Hase	-	-	315
Gaiß	-	-	320	Haselhun	-	-	356
Galbula	-	-	360	Hause	-	-	383
GALLVS	-	-	355	Haußbrothschweiffel	-	-	376
Gallopavo	-	-	355	Haußschwalbe	-	-	380
Gamse	-	-	320	Haußspatz	-	-	370
Gamsengeyer	-	-	326	Hecht	-	-	388
Ganß	-	-	339	Henne	-	-	355
Gareißl	-	-	391	Hircus	-	-	320
Gelber Kirschvogel	-	-	360	Hirngrillerl	-	-	368
Gestettenschlager	-	-	375	Hirsch	-	-	319
Gestettenschwalbe	-	-	381	HIRVND	-	380.	381
Glanis	-	-	388	Hohlfranz	-	-	335
Gobio	-	-	384	Hohltaube	-	-	358
Goißer	-	-	350	Homo	-	-	307
— türkischer	-	-	350	Horneule	-	-	323
— kleiner	-	-	350	Hortulana	-	-	371
Goldammering	-	-	370	Hortulanus	-	370.	371
Goldhant	-	-	378	Huech	-	-	388
Graßl	-	-	369	Hund	-	-	312
Graßmucke	-	-	377	Hundsfisch	-	-	396
Grefling	-	-	395	Hundsmeiße	-	-	379
Grieffhennl	-	-	354	Huso	-	-	383
Grundl	-	-	396	Hyæna	-	-	313
Grünling	-	-	368	HYSTRIX	-	-	314
Grünspecht	-	-	335			I.	
Grus	-	-	345	Ibex	-	-	321
Grygallus	-	-	356	Igel	-	-	313
Gryllus	-	-	368	Iltis	-	-	311
Gugelfahraus	-	-	360	Indian	-	-	355
Gulo	-	-	311	ISPIDA	-	-	337
Gümpel	-	-	365	Junco	-	-	375
Gyrfalco	-	-	329	JYNX	-	-	336

H.				K.			
Haasl	-	-	394	Kakatu	-	-	333
Haliætus	-	-	325	Kamel	-	-	318
Hämpfling	-	-	368	Karpfe	-	-	390
Hamster	-	-	317	Käse	-	-	310
Han	-	-	355	Kauglein	-	-	324
Hanefferl	-	-	368	Kernbeiß	-	-	365

A N I M A L I A.

Riwiß	-	-	353	LVTRA	-	-	312
Rehner	-	-	363	Lur	-	-	311
Rönicferl	-	-	378	Lynx	-	-	311
Rohlmciße	-	-	379				
Roppe	-	-	384		M.		
Rothlerche	-	-	352	Mandlfrau	-	-	334
Rothantl	-	-	343	Marder	-	-	311
Rran	-	-	333	Martes	-	-	311
Rranabeter	-	-	361	Mauerspecht	-	-	336
Rranich	-	-	346	Maulwurf	-	-	314
Krähe	-	-	333	Mauß	-	-	316
Krautvogel	-	-	362	Maußgeyerl	-	-	331
Krickantl	-	-	343	Meles	-	-	313
Krietsch	-	-	317	MELEAGRIS	-	-	355
Krößler	-	352.	353	MERGVVS	-	343.	344
Krumschnabl	-	-	365	Merops	-	-	337
Küniglhas	-	-	315	Merula	-	360.	374
Künickertl	-	-	378	Meerganß große	-	-	339
Kuckuck	-	-	337	Meerheher	-	-	334
				Meerkatze	-	-	309
	L.			Meerrache	-	-	343
Lagopus	-	-	356	Meerschwalbe	-	-	337
Lampetra	-	383.	384	Meerschwarzplattl	-	-	377
LARVS	-	-	345	Meerschwein	-	-	315
Lavaretus	-	-	389	Meerspaz	-	-	371
Larforelle	-	-	389	Meerstiglig	-	-	372
Leo	-	-	310	Meerzeisel	-	-	369
Leopart	-	-	310	Milon rother	-	-	326
LEPVS	-	-	315	Milvus	-	-	326
Ligurinus	-	-	366	Mistler	-	-	361
Linaria	-	368.	369	Monedula	-	-	334
Löfflente	-	-	342	Morphos	-	-	325
Löfflganß	-	-	338	MOTACILLA	373.	374.	375
Löwe	-	-	310		376.	377.	378
Lota	-	-	388	Moosgeyer	-	-	329
LOXIA	-	364.	365	Mooskub große	-	-	348
Lucius	-	-	388	— mittelmaßige	-	-	347
Lucio - perca	-	-	385	— kleine	-	-	348
Ludllerche	-	-	362	Mooschnepf	-	-	352
Lupus	-	-	312	Mohrente	-	-	342
Lupus cervarius	-	-	311	Mückenstecker	-	-	381
Luscinia	-	-	375	Murmelt hier	-	-	317

D d

Mv.

A N I M A L I A.

MURÆNA	-	387	Passer alpino Lapponicus	372
MVS	-	316	PAVO	355
MVSTELA quadr.	-	311	PELECANVS	345
Mustela quadr.	-	312	Pelecanus	338
Mustela piscis	-	388	PENDVLVS	373
			Penelope	342
N.			PERCA 384. 385. 386.	387
Nachteule	-	324	Perdix	357
Nachtigall	-	376	Perlhan	355
Nachtrabe	-	347. 381	Peruquetl	332. 333
Näßling	-	394	Perschling	365
Natterwindl	-	336	Petrocosyphos	360
Nerfling	-	394	PETROMYZON	338
Neunaugen	-	383	Pfaffenlaß	386
Nicomis	-	367	Pfannenstiel	379
Nimmersatt	-	345	Pfau	355
Nisus	-	332	Pferd	317
Noctua	-	324	PHASIANVS	356
NUMENIVS	350. 351.	352	Pica	334. 335
Nußbeisser	-	365	PICVS	335. 336
Nußheber	-	335	Platea	338
			Pluvialis	354
O.			PRATINCOLA	381
Ochß	-	322	Prunella	376
Oenanthe	-	374. 375	Prunellerl	376
Onocrotalus	-	345	PSITTACVS	332
Oriolus	-	360	Pohlische Gangß	339
Oritulan	-	371	Putorius	311
ORTYGOMETRA	-	349	Pygargus	326
OTIS	-	354	Pyrrhula	365
Otter	-	312		
Ocus	-	323		
OVIS	-	321	Q.	
			Querquedula	342
			Quecker	367
P.				
Palumbus	-	358	R.	
Pantherthier	-	310	Rab.	333
Paperl	-	332.	— indianischer	332
Pardalis	-	310	Rager blauer	346
Pardus	-	310	— rother	346
PARVS	-	378. 379	— weisser	346
Passer	-	369. 370	Rangifer	319

Nabe

ANIMALIA.

Mähe	-	-	316	Schirf	-	-	383
Mauchfuß	-	-	329	Schlein	-	-	392
Mehhun	-	-	357	Schleyerauffe	-	-	324
RECVRVIROSTRA	-	-	348	Schleyercule	-	-	324
Regulus	-	-	378	Schmelvogel	-	-	362
Meh	-	-	319	Schmittl	-	-	378
Reinankl	-	-	389	Schneegans	-	-	338
Renntbier	-	-	319	Schneegeyer	-	-	329
RHINOCEROS	-	-	317	Schneehennl	-	-	356
Ringlamsel	-	-	360	Schneekönig	-	-	378
Ringltaube	-	-	359	Schopfmeise	-	-	379
Mohramering	-	-	371	Schrafen	-	-	387
Mohrgeyer kleiner	-	-	330	Schwalbe	-	380.	381
Mohrhennl	-	357.	358	Schwalbenschweif	-	-	340
Mohrspaz	-	370.	373	Schwan	-	-	338
Mohrtrummel	-	-	348	Schwanengans	-	-	338
Mohrvogel	-	-	375	Schwarzplattl	-	-	377
Motheuge	-	-	393	Schwarzspecht	-	-	335
Mothsfüßler	-	-	353	Schwein	-	-	318
Motheamsel	-	-	339	SCIVRVS	-	-	314
Mohrköpf	-	-	376	Scolopax	-	351.	352
Mohrwolf	-	-	386	Seidenschweif	-	-	363
Rubecula	-	-	376	Sichling	-	-	392
Rubicilla	-	-	365	Silurus	-	-	388
Rupicapra	-	-	320	SIMIA	-	-	309
Ruticilla	-	-	376	SITTA	-	-	363
Rutilus	-	-	395	Sorex	-	-	317
Rutte	-	-	388	Sparverius	-	-	332
				Spaz	-	-	369
	S.			— türkischer oder persischer			373
SALMO	-	388.	389	Speeralster	-	-	364
Sandlauffertl	-	-	353	Speermeise	-	-	379
Schaaf	-	-	322	Sperber	-	-	332
Schaden	-	-	388	Spener	-	-	380
Schauflente	-	-	342	Spenerl	-	-	380
Scheer	-	-	314	Spinus	-	-	366
Scheibpleinkzen	-	-	393	Spitzeyer	-	-	330
Schied	-	-	392	Spitzlaube	-	-	395
Schiel	-	-	385	Spitzmauß	-	-	317
Schildhan	-	-	356	Spottvogel	-	-	377
— Henne	-	-	356	Springl	-	-	332
Schilus	-	-	385	Stachelschwein	-	-	314

A N I M A L I A .

Starl	-	-	362	Trutta	-	-	389
Staudenragerl	-	-	348	Ischiadittl	-	-	324
Steinadler	-	-	325	Ischockerl	-	-	334
Steinauffe	-	-	325	Ischötscherl	-	-	369
Steinbeißel	-	-	396	Zuckantl	-	-	344
Steinbock	-	-	321	Zuck	-	-	383
Steinemmerling	-	-	371	Zucka	-	-	383
Steinheber	-	-	334	Zürkische Ente	-	-	339
Steinröthl	-	-	360	TURDVS	-	360.	361
Steinchwäher	-	-	375	Zurkeltaube	-	-	359
Stiglis	-	-	366	Turcur	-	-	359
Stockamsel	-	-	361				
Stockente	-	-	341			V.	
Stockschneepf	-	-	351	Vanellus	-	-	353
Storch	-	-	348	VESPERTILIO	-	-	314
— schwarzer	-	-	348	Uhlen	-	-	384
Strauß	-	-	354	Vielfraß	-	-	311
Strepsiceros	-	-	322	Vitiflora	-	-	374
STRIX	323.	324.	325	Viverra	-	-	311
STRUTHIO	-	-	354	Ulula	-	-	323
Sturio	-	-	383	UMBRA	-	-	396
STVRNVS	-	-	361	Bögelgenerl	-	-	331
SVS	-	-	318	UPVPA	-	-	337
				Urogallus	-	-	356
				URSVS	-	-	310
				Vulpes	-	-	313
						W.	
				Wachtel	-	-	357
				Wachtelkönig	-	-	349
				Waldauff	-	-	325
				Waldauffel	-	-	322
				Walddroscherl	-	-	361
				Walddgener	-	-	329
				— brauner	-	-	326
				Waldblerche	-	-	362
				Walbnachtigall	-	-	376
				Waldbrothschweißl	-	-	376
				Walbschneepf	-	-	351
				Walbsarl	-	-	334
						Wald=	

T.

W.

Wald=

A N I M A L I A.

Kalbskuehl	-	-	309	Wildtaube	-	-	359
Kannenweber	-	-	332	Wimba	-	-	394
Kassernadel	-	-	374	Windwachtel	-	-	332
Kassernadel	-	-	316	Wolf	-	-	312
Kassernadel	-	-	349	— indianischer	-	-	313
Kassernadel	-	-	385				
Kassernadel	-	-	361				
Kassernadel	-	-	394	Zackel	-	-	322
Kassernadel	-	-	336	Zackel	-	-	361
Kassernadel vid. Kuckuck	-	-		Zackel	-	-	378
Kassernadel	-	-	337	Zackel	-	-	378
— indianischer	-	-	333	Zackel	-	-	366
Kassernadel	-	-	312	Zackel	-	-	361
Kassernadel	-	-	371	Zackel	-	-	320
Kassernadel	-	-	338	Zackel	-	-	386
Kassernadel	-	-	310	Zackel	-	-	393
Kassernadel	-	-	318	Zackel	-	-	363



E R R O R E S.

Qui absente Authore præsertim in prima duo folia
irrepperunt.

Pag. I	Lin.	12 mono-	lege	bi
4	—	13 Ammruth	—	Amm. ruth.
5	—	30 f. Alpe	deleatur.	
6	—	5 chamædyfolia,	—	chamædryfolia.
9	—	2 stylo	—	stylis.
11	—	19 alpen	—	alpem.
19	—	30 obturis	—	obtus.
20	—	27 lato	—	lati.
	—	26 verru	—	versu.
	—	36 erectisunum	—	erectis ad unum.
22	—	23 gluminis	—	glumis.
23	34 &	35 dioscoridis	—	Dioscoridis
	—	5 donax	—	Donax.
24	—	12 quirinis	—	quinis.
28	—	1 pyrenaria	—	pyrenaica.
179	—	13 inveni monte	—	inveni in monte
	—	17 expertissimi	—	expertissimi

Reliquos B. L. corrigere rogatur.

mt of 5.8

